

MÉMOIRES

DE

LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DU DÉPARTEMENT DU DOUBS.

TROISIÈME SÉRIE. — CINQUIÈME VOLUME.

1859—1860.

BESANÇON,
IMPRIMERIE DE DODIVERS ET C^e,
Grande-Rue, 42.

—
1861.



INTRODUCTION A L'ÉTUDE DES POLYPIERS FOSSILES

Par M. E. de FROMENTEL

Docteur en médecine, membre de la Société géologique de France, etc.

(Séances des 10 avril et 8 mai 1858.)

De toutes les parties que renferme la Paléontologie, une des plus intéressantes et cependant des moins répandues, est celle qui comprend l'histoire des Zoophytes ou Polypiers fossiles. La forme élégante de ces animaux, les lois singulières qui président à leur existence et à leur développement, l'importance au point de vue stratigraphique qu'acquièrent les Polypiers dans les différentes couches terrestres qu'ils caractérisent, auraient dû rendre depuis longtemps leur étude précieuse pour le géologue comme pour le naturaliste, si la confusion qui a régné dans la terminologie, les erreurs occasionnées par le mauvais état des fossiles et le défaut d'une bonne classification n'avaient rendu pendant longtemps cette étude extrêmement difficile et contraint la plupart des géologues à l'abandonner avant d'avoir pu l'approfondir.

Depuis un siècle on a publié beaucoup d'ouvrages sur les Zoophytes ; quelques-uns sont faits avec soin et ont apporté d'utiles matériaux à l'histoire des Polypiers, mais malheureusement chaque auteur a presque toujours suivi, non-seulement une marche à part, mais encore une nomenclature spéciale et une terminologie particulière. De là est venue la confusion étrange qui a régné si longtemps dans cette branche de la paléontologie ; de là aussi la répugnance des géologues pour cette science et le triste oubli où elle restait plongée, alors que les autres parties de l'histoire des animaux fossiles prenaient dans ces derniers temps un développement extraordinaire.

Malgré les excellents ouvrages des zoophytologistes modernes, et surtout ceux de MM. Milne-Edwards et J. Haime, qui ont essayé de rendre à l'étude des Zoophytes l'importance qu'elle aurait toujours dû avoir, la Zoophytologie est loin d'être au niveau du reste de la Paléontologie. La cause doit en être attribuée aux faits que nous avons déjà signalés, mais aussi à la rareté des ouvrages des auteurs que nous avons cités, à leur insuffisance par suite des découvertes nombreuses qui sont faites dans cette partie encore peu explorée de la Paléontologie, et enfin au défaut d'un traité élémentaire qui, donnant d'une manière claire et précise la description des parties constituantes des Polypiers, le nom par lequel chacune de ces parties est désignée, l'importance qu'elles acquièrent pour les divisions en familles, en

genres et en espèces, puisse guider d'une manière certaine le naturaliste au milieu des ténèbres qui enveloppent encore en partie l'étude des Polypiers fossiles.

Comme ce travail est surtout destiné aux personnes qui s'adonnent à la géologie, nous ne nous occuperons ici que de l'étude des parties pierreuses des Polypes, du *sclerenchyme*, comme les ont appelées MM. Milne-Edwards et J. Haime, que nous aurons souvent occasion de citer, car ces parties sont les seules qui aient laissé des traces certaines dans les différents étages qui composent la croûte terrestre. Après avoir jeté un coup-d'œil rapide sur l'histoire de la Zoophytologie, nous analyserons anatomiquement les différentes parties qui constituent le Polypier, nous étudierons chaque organe en lui assignant le nom qu'il porte déjà ou qui lui convient le mieux ; puis nous examinerons les bases sur lesquelles reposent les grandes divisions des familles et des genres et la détermination des espèces ; enfin nous donnerons une classification de tous les genres de Polypiers fossiles suivant la méthode dichotomique employée avec tant de succès pour la botanique, et dont le mérite principal est de faciliter les recherches et d'arriver promptement à une détermination.

Nous pensons que ce travail ne sera pas sans quelque utilité, et que les géologues qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas essayé d'aborder l'étude des Polypiers, nous sauront gré de leur avoir ouvert une voie facile, et montré

la marche à suivre pour arriver à la connaissance de ces fossiles appelés à jouer un jour un rôle important dans la détermination des Etages géologiques.

Gray, ce 22 mai 1857.

INTRODUCTION A L'ÉTUDE DES POLYPIERS FOSSILES.

I.

L'histoire des zoophytes se divise en deux époques principales : la première, ou *Epoque mythologique*, comprend tous les siècles qui se sont écoulés depuis le jour où ces êtres attirèrent pour la première fois l'attention des naturalistes, jusqu'au moment où, cessant d'être regardés comme des végétaux, ils prirent place parmi les êtres animés. La seconde, ou *Epoque historique*, commence à la découverte de Bernard de Jussieu et s'étend jusqu'à nos jours.

Nous ne voulons pas donner ici une histoire détaillée de la marche et des progrès de la Zoophytologie ; d'autres s'en sont occupés avec succès, et on trouvera dans les auteurs contemporains tous les détails qu'on peut désirer. Le but que nous nous proposons est simplement d'embrasser d'un coup d'œil rapide l'ensemble des faits, de rappeler quelques noms généralement oubliés et de redresser quelques erreurs qui se sont transmises jusqu'à ce jour.

1^{re} Époque. Les premiers observateurs, frappés de la forme arborescente de quelques polypiers, de l'admirable régularité de leurs calices, de leur ressemblance avec certaines fleurs, ne virent dans le développement de ces animaux que le résultat de la végétation et leur donnèrent le nom de *plantes marines*.

L'analogie qui existe entre les plantes et les polypes devait, à une époque où l'on était loin de rechercher et de connaître les parties anatomiques de ces êtres, conduire nécessairement les naturalistes à l'erreur dans laquelle ils sont restés pendant tant de siècles. Ils voyaient les polypes bourgeonner comme les végétaux et produire des branches qui se couvraient de fleurs régulières et enrichies des couleurs les plus vives et les plus

variées; comme chez les végétaux, chacune de ces fleurs leur paraissait donner naissance à une graine qui, s'arrêtant sur un corps résistant, y prenait racine, s'y développait, et reproduisait des arbrisseaux et des fleurs semblables à celles qui l'avaient engendré. Ailleurs ils voyaient des prolongements émanés de la base des polypes qui, de même que les rhizomes de nos plantes traçantes, allaient loin de la souche première donner naissance à un être nouveau et en tout semblable au premier; enfin, pour que rien ne manquât à l'analogie, ils pouvaient encore remarquer que certains polypes, comme quelques végétaux, avaient le pouvoir de se reproduire par bouture, et qu'une branche de corail, par exemple, séparée de l'arbrisseau, pouvait donner naissance à une touffe arborescente nouvelle. Ces observations, les premières sans doute qui durent être faites, étaient tellement en harmonie avec les lois connues de la végétation, l'analogie de développement, de floraison, de reproduction était tellement frappante que le fait le plus simple, le plus rationnel, le seul qui devait conduire naturellement à la connaissance de l'animalité des polypes, échappa aux esprits les plus éclairés, nous voulons parler du *mouvement volontaire*, acte qui sépare nettement le règne végétal des êtres animés.

Les polypiers furent donc d'abord considérés comme des productions végétales et décrits sous le nom de plantes marines. On leur reconnaissait bien, il est vrai, une nature particulière, mais on expliquait facilement par leur séjour au fond de la mer les différences qui les faisaient distinguer des plantes terrestres. Telle fut la manière de voir d'Aristote, de Pline, de Dioscoride, de Césalpin, etc., qui, traversant les siècles, fut adoptée par les auteurs du moyen-âge, Albert le Grand, Wootton (1552), etc., et arriva presque sans altération jusqu'au commencement du 18^e siècle. Cependant, vers le milieu du 16^e siècle déjà, Belon (1553) et Rondelet (1558), puis Mathias de Lobél avaient fait d'intéressantes observations et ajouté de nouvelles connaissances à l'histoire des Zoophytes. Plus tard encore, Gesner et Aldrovande donnèrent des descriptions assez bonnes de quelques plantes marines, et en 1700, Tournefort publia un mémoire dans lequel il expliquait la différence des plantes terrestres et des plantes marines et la manière de vivre

de ces dernières. Boccone, Ray, Geoffroy ne soupçonnèrent pas davantage l'animalité des Polypes que Rumpf (1705) semble cependant avoir déjà entrevue. Quelques naturalistes ne regardaient même pas les Polypiers comme des plantes, car Guizon et Woodward pensaient que ces productions n'étaient que le résultat de la coagulation des sels contenus dans l'eau de la mer.

Dès 1699, Imperati avait déjà constaté sur les branches du corail l'existence de petits corps rayonnés et *doués de mouvement*; mais en 1706, le comte de Marsigli, qui fit les mêmes observations, ne profita pas de cette remarque, il prit les Polypes pour de véritables fleurs, et n'hésita pas à ranger le corail dans « la classe des végétaux munis de fleurs octopétales, » d'où il naissait un fruit globuleux fécondé par un suc âcre et » laiteux. »

La Géologie qui, à cette époque, commençait à ouvrir à l'histoire naturelle un horizon nouveau et riche en précieuses découvertes, semblait venir elle-même confirmer l'opinion des naturalistes sur la nature végétale des Polypiers. Les géologues, trouvant dans les couches terrestres qu'ils exploraient des fossiles ayant une grande analogie de forme avec les Zoophytes qui vivent actuellement dans les mers, pensèrent que ces fossiles étaient des pétrifications de *plantes marines*. Puis, apercevant dans les mêmes gisements, mélangées avec ces Polypiers branchus, des têtes d'Encrines dont le calice régulier et la forme pétaloïde du sommet rappelle assez bien la figure d'une fleur, ils crurent que ces fossiles étaient réellement des fleurs de plantes marines pétrifiées, de même qu'ils prirent pour les fruits de ces plantes des corps globuleux comme des oursins, des pointes d'oursin, des spongiaires, etc.

Tel était l'état des connaissances en Zoophytologie, quand Peissonnel (1723), voulant vérifier les faits avancés par le comte de Marsigli, s'embarqua à Marseille avec des pêcheurs de corail. Il étudia les Polypiers dans l'eau de la mer et hors de leur élément, et constata que les prétendues fleurs observées sur le corail n'étaient en réalité que des « insectes » qui vivaient sur ce corps pierreux où ils avaient leurs loges; qu'ils étaient doués de mouvements volontaires, et que le suc blanchâtre que l'on exprimait en pressant sur l'extrémité des tiges du corail, n'était

pas autre chose que la partie intestinale de l'animal qu'on faisait sortir de sa loge.

Peissonnel écrivit à Réaumur le résultat de ses observations ; sa lettre fut lue à l'Académie, mais ne produisit pas l'effet qu'il pouvait en attendre. L'animalité des Zoophytes ne fut pas une vérité admise, aussi le travail de Peissonnel intitulé : *Traité du corail, etc., etc.*, ne fut jamais imprimé et est encore conservé à l'état de manuscrit à la bibliothèque du Muséum de Paris.

Soit qu'il ne fut pas convaincu, soit partialité, Réaumur n'adopta pas les idées de Peissonnel, et publia un mémoire où il combat l'opinion de ce naturaliste sans le citer, et où il explique la manière dont les coraux peuvent végéter. Linné et la plupart des auteurs de cette époque partagèrent la manière de voir de Réaumur ; aussi quand Peissonnel, en 1727, proposa son système des Plantes marines, loin de voir ses idées admises, il ne trouva que des contradicteurs. Les uns nièrent d'une manière formelle l'animalité des fleurs du corail, comme Shaw qui, dans la relation de ses voyages en Afrique (1738), soutint que les corps que l'on aperçoit sur le corail n'étaient que les racines de cette plante qui disparaissaient quand elles étaient retirées de la mer. Les autres, tout en admettant que les corps rayonnés du corail étaient réellement des animaux, prétendirent que ces animaux étaient des parasites qui vivaient aux dépens du corail et creusaient leurs loges dans les tiges de cette plante. Ce fut même la seule objection sérieuse qui fut faite au système de Peissonnel, et celui-ci, soit découragement, soit faute de preuves positives, devait laisser à un autre la gloire de répondre à cette objection et de démontrer la nature purement animale du Polypier.

Ce qui prouve clairement que le corail resta encore longtemps sans être classé parmi les animaux, c'est ce que Réaumur écrivait dans son 6^e volume de l'*Histoire des insectes*, page 74 : « Mais après avoir accordé que ces prétendues fleurs » n'étaient réellement que de petits animaux, que pouvait-il en » résulter ? Il semble que la seule conséquence qu'on était en » droit d'en tirer est que comme les tiges de différentes plantes » terrestres sont couvertes les unes de pucerons, les autres de » gallinsectes, les autres de galles, de même l'écorce des

» plantes marines était remplie d'insectes qui aimaient à s'y
» loger : qu'on ne devait pas plus regarder ces derniers comme
» les ouvriers des corps sur lesquels ils se trouvent en si grand
» nombre, qu'on regarde les autres comme des plantes aux-
» quelles nous les voyons attachés. La grande difficulté, celle
» sur laquelle j'ai le plus insisté et qui me paraissait insoluble,
» c'était d'expliquer comment les insectes pouvaient construire
» les corps pierreux sur lesquels on les trouvait; comment de
» pareils corps pouvaient résulter de plusieurs de leurs cellules
» ou coquilles réunies, et c'est cette difficulté que Peissonnel a
» laissée dans tout son entier et par rapport à laquelle il était
» impossible d'entrevoir alors aucun dénouement. »

Ajoutons encore, pour confirmer ce que nous avons avancé, que dix-neuf ans après la découverte de Peissonnel, il parut un ouvrage anonyme de Paléontologie, publié à La Haye en 1742 et intitulé : *Mémoires pour servir à l'histoire des pétrifications*, etc., renfermant des planches qui contiennent environ vingt figures toutes consacrées aux fleurs et aux fruits des plantes marines. A peu près à la même époque, le chevalier de Baillou affirma avoir fait quantité d'observations sur les coraux et n'avoir jamais remarqué les animaux de Peissonnel ni la semence de Marsigli; et d'Argenville soutint que le résultat de ses expériences lui démontrait la nature purement végétale du corail.

2^e *Epoque*. Pendant que l'animalité du corail niée par les uns, admise par les autres, était un sujet de discussion dans la science, Trembley faisait, en 1732, une découverte qui devait influer d'une manière efficace sur la solution que cette question devait avoir. Les Polypes d'eau douce dont il est fait mention dès 1703 dans les *Transactions philosophiques*, par Leuwenhœk, attirèrent l'attention de Trembley de la Société royale de Londres. Ce savant étudia avec soin ces singuliers animaux, il en décrivit avec exactitude la forme, les habitudes, la génération, et, le premier, fit connaître la merveilleuse propriété qu'ont ces animaux de donner naissance à autant d'êtres semblables et complets qu'il y a de sections de leur corps. Les expériences de Trembley firent penser à Bernard de Jussieu qu'il devait y avoir une grande similitude entre les Polypes d'eau douce et les animaux du corail; aussi après

avoir répété avec Adanson et Réaumur les expériences du savant anglais, il entreprit un voyage dans le but d'étudier lui-même et sur place les animaux des plantes marines. Il partit (1741) avec Blot, alors médecin à Caen, qui devint plus tard professeur de botanique en cette ville, et suivit avec lui les côtes depuis Honfleur jusqu'au-dessous de Bayeux. Il reconnut que les expansions membraneuses que l'on aperçoit sur les différentes plantes marines, sont réellement des animaux qui s'épanouissent ou rentrent en entier dans des cellules qui leur servent de loges, et que plusieurs espèces de ces prétendus végétaux, qui ont en effet la forme extérieure d'une belle plante, ne sont qu'un assemblage de loges de Polypes.

Le système de Peissonnel se trouva ainsi vérifié; mais Bernard de Jussieu ne se contenta pas de constater l'animalité des plantes marines; il fut le premier qui ait réellement prouvé que les coraux sont le résultat des fonctions vitales des animaux qui s'y trouvent, et que les loges calcaires ou cartilagineuses qui les contiennent, sont produites par un travail organogénique dont on trouve les matériaux dans les animaux eux-mêmes. Il appliqua à ces animaux le nom de *Polypes*, et depuis cette époque les coraux quittèrent définitivement le règne végétal pour prendre rang parmi les animaux. Linné et Réaumur furent des premiers à reconnaître la vérité, et c'est à ce dernier que l'on doit le nom de Polypier, par lequel il désigna la partie calcaire ou cornée des Zoophytes, nom qui depuis fut conservé dans la science.

C'est donc à Bernard de Jussieu, et non à Peissonnel, comme on a coutume de le dire, qu'est due la découverte de l'animalité des coraux. Celui-ci, en effet, ne fit que constater un fait déjà connu depuis longtemps et indiqué avant lui par Imperati et le comte de Marsigli, à savoir que les fleurs du corail étaient douées de mouvement : il ajouta seulement que ces corps étaient des animaux; mais, comme l'a bien dit Réaumur, la difficulté principale était de démontrer que la substance pierreuse des coraux était le résultat d'un travail vital, que cette enveloppe n'était ni une loge creusée dans un corps étranger, ni un dépôt fortuit qui se ferait autour d'un animal, mais un tissu propre, élaboré par le Polype lui-même, et c'est à Bernard de Jussieu seul que revient l'honneur de cette découverte.

Une fois que les Polypiers eurent pris place parmi les êtres animés, ils furent l'objet de l'étude d'un grand nombre de naturalistes. Nous n'entrerons pas ici dans des détails historiques minutieux : d'autres ont déjà traité cette partie avec érudition, et on trouvera dans le Dictionnaire de M. C. d'Orbigny tous les détails que l'on pourra désirer sur ce sujet. Nous nous contenterons seulement ici de mentionner les travaux qui, à différentes époques, ont fait faire des progrès sérieux à la Zoophytologie.

Les premiers auteurs qui se sont occupés des Zoophytes, tels que Donati, Hill, Pallas, Roques de Maumont, Th. Klein, etc., ont plutôt enrichi la Zoophytologie de nouveaux éléments qu'ils n'ont fait progresser la science elle-même. Wallerius, trop peu connu et encore moins cité, divisa les Corralloïdes en onze classes, suivant leurs formes extérieures, et sa classification est de toutes celles de cette époque, celle qui a le plus de rapport avec les classifications modernes, bien qu'il ait écrit avant le 19^e siècle. Nous devons encore citer, avant de quitter le siècle dernier, les travaux des Ellis, Forskael, Cavolini, Muller, qui ne firent guère plus avancer la science que leurs prédécesseurs, bien que chacun de leurs ouvrages soit enrichi de découvertes nouvelles.

Avec le 19^e siècle commencèrent des études plus profondes sur les Polypiers, et bien que ces êtres n'aient pas encore été, à cette époque, séparés des Bryozoaires, des Spongiaires, etc., on trouve déjà des notions assez précises sur leurs formes et leur constitution organique. Mais pendant que les grands travaux d'Esper (1806), de Savigny (1815) et de Lamarck (1816) jetaient de vives lumières sur l'histoire des Zoophytes, une hérésie se glissait dans la science et semblait vouloir y jeter de profondes racines.

Oubliant la belle découverte de Jussieu et le mémoire dans lequel ce savant développe la manière dont les Polypes construisent leur tissu calcaire, Lamarck ne vit plus dans le Polypier qu'une couche calcaire déposée par les eaux de la mer autour des Polypes, comme le ferait une source incrustante, et n'ayant pas plus de rapport avec l'animal, que les loges d'un guépier n'en ont avec les insectes qui les habitent. Il nia donc complètement le développement vital du Polypier, et ne voulut

voir aucune trace d'organisation dans ces tissus si réguliers, si élégants et cependant si variés. L'autorité de Lamarck était grande parmi les Zoophytologistes, aussi sa manière de voir fut-elle adoptée par les auteurs mêmes les plus célèbres qui le suivirent, Lamouroux et Cuvier. M. de Blainville lui-même, dans son *Manuel d'actinologie*, estimé à si juste titre, n'a pas essayé non plus de combattre cette opinion, et ce ne fut qu'en 1834-38 que MM. Ehrenberg et Milne-Edwards commencèrent à démontrer la fausseté des vues de Lamarck.

C'est à cette époque aussi que les Polypiers furent enfin séparés des autres productions avec lesquelles ils étaient confondus. Déjà M. de Blainville, dans sa *Classification des Zoophytes*, en avait exclu avec raison les Corallines qu'il regardait comme des végétaux, mais il y comprenait les Echinodermes, les Spongiaires, les Infusoires, etc. Schweigger avait aussi éliminé les végétaux Coralloïdes, mais avec eux il supprima les Echinodermes, et ne comprit sous le nom de Zoophytes que les Polypes, les Infusoires et quelques Bryozoaires. Mais c'est réellement M. Ehrenberg qui, pour la première fois dans ses *Etudes sur les Polypes de la mer Rouge*, sépara nettement les Polypes des Spongiaires, des Bryozoaires et de tous les autres êtres étrangers avec lesquels ils étaient encore confondus.

Sa classification, quoique étant bien supérieure à toutes celles qui avaient paru précédemment, n'était pas sans présenter encore de nombreuses imperfections. Les travaux successifs de M. Milne-Edwards, en 1836-37-38, et ceux qu'il fit paraître plus tard en collaboration avec J. Haime, élevèrent la Zoophythologie au niveau des autres branches de l'histoire naturelle, et les études remarquables qu'ils firent sur la structure et l'organisation des Polypiers, leur fournirent les bases d'une classification naturelle que nous aurons à discuter plus loin.

Les premiers auteurs qui se sont occupés des Zoophytes fossiles existaient vers le commencement du 18^e siècle, tels que Colonna, Buttners, etc., qui donnèrent des figures assez grossières de quelques Polypiers fossiles. Vers le milieu du même siècle parurent les travaux de Pennant, de Lhwyd, de Fougé, de Guettard, qui étudièrent les Zoophytes des terrains anciens et décrivirent une assez grande quantité de fossiles nouveaux.

Dans les premières années de notre siècle, DeFrance étudia aussi un grand nombre de polypiers fossiles; et, en 1826, parut le grand ouvrage de Goldfuss, dont la première partie est entièrement consacrée aux Spongiaires, aux Polypiers et aux Bryozoaires. Cet ouvrage, remarquable par la perfection des planches qu'il renferme, est loin d'avoir la valeur scientifique qu'on a bien voulu lui prêter, et il a plutôt fait reculer la science qu'il n'a servi à son progrès.

MM. Lonsdale et M'Coy ont donné de bonnes descriptions des Polypiers des terrains anciens et secondaires, et M. Michelin a publié, de 1840 à 1847, une *Iconographie zoophytologique* qui renferme la description d'une grande quantité de Polypiers fossiles des divers terrains de la France, et qui est encore aujourd'hui consultée avec fruit par tous ceux qui s'occupent de zoophytologie.

Les travaux les plus complets, ceux qui ont réellement le plus contribué aux progrès de la Zoophytologie géologique, appartiennent à MM. Milne-Edwards et J. Haime. Leurs études sur les Polypiers fossiles d'Angleterre, leur monographie des Polypiers paléozoïques, leurs différents mémoires sur l'organisation et la structure des Polypiers, outre les descriptions détaillées qu'ils renferment, sont encore accompagnés de planches d'une exécution parfaite et où les caractères des Zoophytes sont admirablement indiqués.

M. A. d'Orbigny a publié les noms d'un grand nombre de Polypiers dans son *Prodrome de Paléontologie*, mais ces noms ne sont accompagnés que de quelques mots qui ne peuvent en aucune façon faire reconnaître ces fossiles. Aussi, sous ce rapport, il a plus nui à la science qu'il ne lui a été utile, en encombrant l'histoire des polypiers fossiles d'un grand nombre de noms nouveaux qui seront longtemps encore une source d'erreur et de confusion.

Nous devons encore, avant de terminer, mentionner le Mémoire de M. Reuss, qui contient la description d'un grand nombre de Polypiers des terrains crétacés, et le travail que nous venons de faire paraître récemment sur les Polypiers fossiles de l'Etage Néocomien inférieur.

II.

ANATOMIE DES POLYPIERS.

On nomme *Polypiers*, en paléontologie, des corps qui ont été parties constituanes de certains animaux rayonnés appelés *Polypes* et qui ont encore des représentants à l'époque actuelle. Les *Polypes* sont de tous les animaux doués de mouvements ceux qui ont l'organisation la plus simple : ils affectent généralement la forme d'un cône ou d'un tube plus ou moins allongé. La partie extérieure du corps des *Polypes* est formée par un tissu assez résistant ayant quelque analogie avec le derme des animaux supérieurs. Ce tissu se prolonge jusqu'à la partie supérieure qu'on nomme *la bouche*, et là il se réfléchit et se transforme en une membrane muqueuse qui descend dans l'intérieur de l'animal, se termine en cul-de-sac et constitue le tube gastrique. La partie qui se trouve entre le derme et le tube gastrique est tapissée par une membrane séreuse qui, dans beaucoup de cas, se réfléchit en feuillets verticaux et forme une espèce d'étoile à l'intérieur du *Polype*. Ces feuillets, qui font office de mésentères, logent les organes de la reproduction et les fibres musculaires qui servent à faire mouvoir les parties molles du corps des *Polypes* et les tentacules dont la bouche est garnie.

Dans les *Polypes* à polypier, la tunique externe est la partie qui, se chargeant d'éléments calcaires, se transforme en un tissu pierreux tout particulier auquel on a donné le nom de *Sclérenchyme*. Ce tissu ne ressemble ni aux os des animaux supérieurs, ni au têt des mollusques ; il est composé d'une série de nodules qui, en se soudant d'une manière plus ou moins intime, donnent naissance aux divers organes pierreux qui seuls ont laissé des traces dans les étages géologiques.

Le *Polypier* est simple ou composé : Dans le premier cas, l'animal dont il fait partie reste isolé et vit d'une vie tout à fait indépendante ; dans le second, les *Zoophytes* sont réunis plus ou moins intimement en colonie et se trouvent à peu près tous

dans les mêmes conditions d'existence. On réserve alors le nom de *polypier* à l'ensemble des animaux, et on donne le nom de *polypiérîte* à chaque individu pris séparément.

Les Polypes à polypier ont, les uns, le polypier extérieur, et alors les parties molles sont contenues dans une gaine testacée, comme cela se voit chez les Madréporaires, apores, poreux, etc.; les autres ont un polypier phytoïde et basilaire qui forme une espèce de tige simple ou ramifiée, à la surface de laquelle vit la colonie qui concourt à sa formation. Ces derniers polypiers que l'on trouve chez les Isis, les Gorgones, etc. ont très-peu de représentants à l'état fossile; aussi porterons-nous plus spécialement notre étude sur les premiers qui abondent dans les étages géologiques.

Nous ne suivrons pas MM. Milne-Edwards, et J. Haime, auxquels nous empruntons la plus grande partie des termes technologiques, dans les savantes recherches qu'ils ont faites sur le développement histologique du Polypier; le but de notre travail étant seulement de faciliter l'étude des Polypiers fossiles; nous nous bornerons à analyser anatomiquement les organes qui les composent alors que ces êtres nous paraissent arrivés à leur maximum de développement.

Le Polypier vaginal (1) affecte généralement la forme d'un tube ou d'un cône qui renferme les parties molles du polype. Ce tube est circonscrit par une lame sclérenchymateuse plus ou moins homogène et compacte que l'on nomme *muraille*. Nous appellerons organes internes toutes les parties qui sont renfermées dans la muraille, et organes externes toutes celles qui sont placées à l'extérieur. L'anatomie du Polypier se divise donc naturellement en trois parties :

La première comprend la muraille ou *organe mixte* ;

La seconde, tous les organes contenus dans la muraille ou *organes internes*.

La troisième, les parties placées à l'extérieur ou *organes externes*.

(1) Le mot *vaginal* a été employé par MM. Milne-Edwards et J. Haime pour désigner le polypier qui renferme le polype dans une gaine testacée, en opposition aux mots *Phytoïde* et *basilaire* appliqués au polypier interne des Antipathiens.

I. ORGANE MIXTE.

Muraille. Le Polype est, comme nous l'avons dit, contenu dans un tube ou cornet plus ou moins allongé et fermé à sa partie inférieure. Les parois de ce tube sont constituées par un tissu pierreux auquel on donne le nom de *Muraille* (τοιχος).

Lorsque le Polypier prend naissance, la *muraille* est tout à fait rudimentaire et représentée par un disque calcaire qui occupe la base de l'animal, mais à mesure que celui-ci se développe, la gaine testacée qui est destinée à le contenir, s'élève, grandit avec lui, et suit toutes les phases de son développement. Ce développement du polype ne suit pas toujours une marche ascendante régulière; souvent, après avoir progressé pendant quelque temps, l'animal reste stationnaire et ne reprend que plus tard son évolution en hauteur. Ces temps d'arrêts et de développements se font remarquer par des sillons et des bourrelets plus ou moins prononcés et qui correspondent aux époques de repos et de croissance de l'animal qu'elle renferme.

Il arrive quelquefois que le Polype, après avoir progressé pendant quelque temps en hauteur et en largeur, non seulement reste stationnaire, mais que, sous l'influence d'une cause qui nuit à son développement et au libre exercice de ses fonctions vitales, il diminue peu à peu en diamètre et se rétrécit de plus en plus, jusqu'au moment où, se retrouvant dans des conditions meilleures, il reprenne l'exercice de ses fonctions quelque temps suspendues et se développe de nouveau. Dans ce cas que l'on peut appeler pathologique, la muraille suit exactement les modifications apportées au Polype; elle se rétrécit avec lui, se développe quand il s'élargit de nouveau, et représente alors deux cônes réunis par leurs sommets. Nous avons donné le nom d'*étranglement* à cet accident que nous avons cru devoir signaler comme une chose purement fortuite, et qui ne doit jamais avoir une valeur, même spécifique, dans la détermination des fossiles.

La muraille peut se développer en hauteur seulement, sans que son diamètre varie, ou bien sa partie supérieure peut s'évaser à mesure qu'elle s'élève et affecter la forme d'un cône renversé. On rencontre quelquefois ces deux formes sur le même animal.

Le développement de la muraille peut se faire en largeur seulement. Elle s'étale alors horizontalement et prend la forme d'un disque plus ou moins régulier, comme cela se remarque dans les genres *Cyclolites*, *Discocyathus*, etc.

Lorsque le Polypier est simple, le bord supérieur de la muraille affecte toujours une forme ronde ou ovale, régulière ou non. La muraille peut encore rester cylindrique dans des Polypiers composés, alors que chaque polypiérite est isolé ou uni seulement à ses voisins par des organes externes, comme dans les genres *Stylina*, *Goniocora*, etc. Mais lorsque les polypiérites sont très-rapprochés, ils peuvent se souder intimement ensemble et les murailles présentent, dans ce cas, l'aspect de prismes polygonaux plus ou moins réguliers. Ex. : les genres *Isastræa*, *Astrocœnia*, etc.

La muraille peut être formée d'un feuillet compacte comme dans les *Zoanthaires Apores*, ou bien être criblée de trous comme on le remarque chez les *Zoanthaires Poreux*. Ces trous peuvent être disséminés au hasard ou être placés régulièrement comme on le voit dans le genre *Favosites*.

La muraille est quelquefois rudimentaire et représentée par des prolongements calcaires qui soudent les cloisons dans un certain point de leur surface ; elle semble même disparaître tout à fait dans quelque cas, chez les *Anabacia*, par exemple.

Quelques Polypiers ont deux murailles, l'une qui est cylindrique et intérieure s'appelle *columnnaire*, l'autre est extérieure, souvent soudée aux voisines, et par suite, polygonale et nommée *muraille pariétale*.

La cavité que circonscrit la muraille s'appelle *Loge* et la partie supérieure de la loge a reçu le nom de *calice*. Le calice peut affecter des formes très-différentes, il est rond, ovale, comprimé, ou polygonal. Lorsque les calices sont bien délimités par les murailles, ils ont le centre *distinct*, mais chez certains Polypiers qui se reproduisent par fissiparité, il n'y a plus de calice proprement dit, on ne voit plus de centre individuel ; celui-ci s'allonge en se pliant et donne lieu à des vallées sinueuses, comme on le remarque dans le genre *Mæandrina*. Les centres calicinaux sont, dans ce cas, *indistincts*.

II. ORGANES INTERNES.

1. CLOISONS. On donne le nom de cloisons (*septa*) à des lames verticales qui partent de la paroi interne de la muraille et se dirigent sur le centre du Polypier. Ces lames, qui forment dans le calice, une étoile plus ou moins régulière, divisent la loge en autant de parties que l'on nomme *chambres* ou *loges interceptales* pour les distinguer de la loge intramurale, ou loge proprement dite, qui comprend tout l'espace qui renferme le Polype.

Les cloisons sont ordinairement formées de deux feuillets tellement soudés ensemble qu'on ne peut les distinguer. Cependant dans la *Mussa fistulosa*, le *Rhipidogyra*, on aperçoit très-bien les deux feuillets en brisant les cloisons, et dans un genre unique, (*Dasmia*), on voit les cloisons formées de trois feuillets parfaitement distincts et réunis seulement vers leur partie externe.

Les cloisons sont quelquefois très-minces et d'autres fois très-épaisses. Dans ce dernier cas, leur partie interne, au lieu d'être atténuée comme dans la première, présente une surface aplatie plus ou moins étendue et garnie souvent de stries transversales.

Le bord libre des cloisons est dit *entier* lorsqu'il est terminé par une lame tranchante qui ne présente ni échancrures, ni dents. Dans certains cas il est au contraire épineux, dentelé et même quelquefois profondément échinulé. Cette différence dans la manière d'être du bord des cloisons a servi aux auteurs que nous avons déjà cités plus haut, à former de grandes divisions, non-seulement dans les genres, mais encore dans les familles, et nous nous voyons forcé nous-mêmes de nous servir de ce caractère autant pour ne pas détruire les riches travaux de nos devanciers, que parce que nous en manquons quant à présent de meilleur. Cependant, il faut bien l'avouer, ce caractère si facile à saisir sur les Polypiers vivants et sur ceux que l'on rencontre dans certains étages, est souvent détruit par l'usure du fossile, ou par l'effet même de la fossilisation. Aussi ne saurions-nous trop engager les personnes qui s'occupent de zoophytologie à ne recueillir, autant que possible, que des échantillons bien conservés et ne prendre pour types

d'espèces nouvelles, que des fossiles qui n'ont subi aucune altération.

Les cloisons, au lieu d'être formées par une lame parfaite, peuvent être criblées d'un nombre de trous plus ou moins larges, et considérables, et même dans quelques cas, comme cela se remarque dans le genre *Porarea*, les cloisons ne sont représentées que par des pointes garnies d'aspérités et placées en séries verticales.

Les cloisons sont généralement libres et indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne se soudent ni aux cloisons voisines ni à d'autres organes internes; mais, dans certains cas, les cloisons les plus jeunes s'infléchissent vers les plus anciennes et s'y soudent par leur partie interne. Cette disposition, très-fréquente dans certains genres et surtout dans quelques espèces, n'a pas encore assez attiré l'attention des zoologistes et pourra un jour servir de base à des distinctions génériques et spécifiques précises.

Le bord interne des cloisons peut se prolonger jusqu'au centre de la loge sans y rencontrer les cloisons correspondantes; elles laissent dans ce cas, au centre du calice, un espace vide qui a été nommé *espace columellaire*, et même *columelle creuse* (d'Orb.)

Souvent les cloisons se rencontrent au centre du calice et s'y unissent, les unes directement par leur bord interne (genre *Isastræa*), les autres au moyen de prolongements spiniformes; enfin, dans d'autres cas, elles vont à la rencontre d'autres organes que nous étudierons plus loin et s'y soudent d'une manière plus ou moins complète.

Chez quelques Polypiers les cloisons sont bien développées et dépassent le bord de la muraille, on les dit dans ce cas *débordantes*; chez d'autres elles sont peu développées et même représentées quelquefois par des stries plus ou moins saillantes et granuleuses qui descendent le long de la paroi interne de la muraille, comme dans le genre *Pyrgia*.

Les cloisons qui sont contenues dans le calice d'un polypier adulte ne se sont généralement pas développées toutes en même temps; on remarque des différences dans leur largeur et cette différence est ordinairement en rapport avec l'âge des cloisons. Lorsqu'un polypier prend naissance, on voit d'abord apparaître

à la fois un certain nombre de cloisons qui toutes ont la même largeur, et divisent la loge en chambres d'égale dimension. C'est à ces cloisons que l'on donne les noms de *cloisons primaires, principales ou grandes cloisons*.

MM. Milne-Edwards et J. Haime, dans leurs admirables travaux sur la structure et le développement des Polypiers (*Annales des sciences naturelles*; Paris, 1848-1849), n'admettent que deux types dans le développement des cloisons : le type hexaméral (six cloisons primaires) qui comprend les Zoanthaires Apores, Poreux, Tabulés, Tubulés, et le type tétraméral (quatre cloisons primaires) qui n'est représenté que par les Zoanthaires Rugueux. Aussi, chaque fois qu'ils ont rencontré un polypier qui, à sa naissance, n'offrait pas un nombre régulier de six ou quatre cloisons, ils ont été forcés, pour rester conséquents avec eux-mêmes, d'admettre une anomalie dans le développement de ses organes. Lorsque ces savants voient un polypier dont les calices ne présentent d'abord que trois ou cinq cloisons primaires, ils disent que une ou trois cloisons ont avorté ; si les cloisons primaires se présentent au nombre de huit ou dix, ils pensent que les six cloisons primaires étant développées, quatre ou deux cloisons avortent dans la série de six cloisons qui suit la première.

Cette hypothèse est en contradiction constante avec les faits les plus faciles à observer. Un grand nombre de polypiers fossiles, ceux surtout qui appartiennent à la formation Jurassique, présentent au moment de l'apparition des calices 3, 5, 7, 8, 10, cloisons primaires. Sur le même polypier composé, du genre *Stylina*, par exemple, où l'on peut étudier 50, 100 calices et plus, on voit que si ces derniers ont 8 cloisons principales, ces 8 cloisons se retrouvent dans tous les calices quel que soit leur âge et que ce n'est que rarement, dans un échantillon sur 20 peut-être, que l'on constate une légère anomalie dans le nombre des cloisons primaires, et encore cette anomalie se montre-t-elle dans un polypierite, alors que tous les autres ont le même type régulier. Les auteurs que nous avons cités ont évidemment pris l'exception pour la règle, mais leur théorie devait nécessairement les conduire à cette erreur.

Les polypiers fossiles sont loin de présenter un type régulier comme les polypiers vivants qu'ils ont plus particulièrement

étudiés. Les polypiers qui vivent dans les mers actuelles, appartiennent à une même époque et présentent un ensemble de caractères semblables ; mais ceux que nous trouvons au sein des couches terrestres, ont été contemporains d'époques bien différentes qui ont laissé des empreintes profondes sur les êtres qui les peuplaient alors et leur ont imprimé un cachet particulier qui doit les faire reconnaître.

Depuis que nous nous occupons de Zoophytologie, nous avons réuni et étudié un grand nombre de matériaux, nous avons pu reconnaître les différences qui séparent les Polypiers paléozoïques de ceux qui peuplent les époques jurassiques, crétacées, etc., et les observations que nous avons faites ne nous ont laissé aucun doute sur la multiplicité des types, dans le développement des cloisons. Nous ne pouvons donc plus admettre l'hypothèse de deux types seulement de cloisons pour les Polypiers fossiles, car nous avons reconnu à leur naissance, des calices qui présentaient 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10 cloisons primaires. Certains Polypiers, tels que les *Pleurostylina*, les *Pleurophyllia*, des *Cladophyllia* et quelques Polypiers des terrains anciens chez lesquels on remarque un développement considérable d'une grande cloison, peut-être ne commencent-ils par n'avoir d'abord qu'une seule cloison primaire, mais nous n'avons pas encore pu étudier le développement de ces fossiles d'une manière assez complète pour dissiper tous nos doutes à cet égard.

Nous donnerons donc le nom de *cloisons primaires* ou *grandes cloisons* à toutes les cloisons qui se développent en même temps et les premières dans la loge et qui, dans le Polypier adulte sont de même largeur et généralement les plus fortes.

Lorsqu'un Polypier se développe, les cloisons qui se sont montrées à sa naissance peuvent croître et s'élever avec lui sans augmenter en nombre, mais ce cas est extrêmement rare et le plus souvent le nombre des cloisons s'accroît à mesure que le polypier avance en âge, jusqu'au moment de son plus grand développement. L'augmentation du nombre des cloisons est généralement en rapport avec la forme de la muraille, lorsque celle-ci en s'élevant s'évase et augmente ainsi le diamètre de la loge, le nombre des cloisons s'augmente jusqu'à l'entier développement des Polypiers, comme on le remarque chez les

Montlivaultia, les *Pleurosmilia*, etc. Si, au contraire, la muraille, en s'élevant, affecte une forme cylindrique régulière, les cloisons ne se montrent qu'en nombre très-limité et ne forment qu'un, deux ou trois cycles au plus. Le genre *Stylina* offre cette particularité d'une manière frappante.

Les cloisons qui suivent les cloisons primaires ne se montrent pas au hasard dans les chambres, mais elles se développent selon certaines lois que nous allons examiner.

On donne le nom de *cycle* au nombre de cloisons qui, après leur apparition, divisent la loge ou les chambres en *chambres similaires*. Ainsi les cloisons du premier ordre qui, pour le type hexaméral que nous prendrons pour exemple, divisent la loge en six chambres égales, forment le *premier cycle*. Les cloisons qui se montrent ensuite et qui divisent les chambres primaires en six chambres secondaires égales, constituent le second cycle; il en est de même de la troisième série de cloisons qui apparaissant en nombre double des cloisons primaires, c'est-à-dire au nombre de 12, composent le troisième cycle.

Les cloisons qui se développent dans un Polypier à type hexaméral se montrent donc au nombre de six cloisons primaires, six secondaires et douze tertiaires lorsqu'il n'y a que trois cycles et leur nombre s'accroît suivant la progression 1, 2, 4; mais à partir du troisième cycle, les choses ne se passent plus aussi régulièrement, car les cloisons qui viennent ensuite ne se montrent plus en nombre double des précédentes, c'est à dire au nombre de 24, mais seulement au nombre de 12. Or comme les cloisons du troisième cycle ont divisé la loge en 24 chambres et que les cloisons du quatrième ordre ne se montrent qu'au nombre de 12, il en résulte qu'il y a 12 chambres qui ne contiennent pas de cloisons du quatrième ordre et qu'il faut, pour les remplir et compléter le quatrième cycle, l'apparition des cloisons du cinquième ordre qui, comme celles du quatrième ordre et des ordres suivants, ne se développent qu'au nombre de 12. Le quatrième cycle se composera donc des cloisons du quatrième et du cinquième ordre; le cinquième cycle des cloisons des 6^{me}, 7^{me}, 8^{me} et 9^{me} ordres, etc., etc. Or les cloisons des 4^{me}, 5^{me}, 6^{me}, 7^{me} ordres, et celles des ordres suivants apparaissent dans les différentes chambres suivant des lois qui ont été reconnues par MM. Milne-Edwards et

J. Haine et qui paraissent constantes. Nous ne suivrons pas les auteurs que nous venons de citer dans leurs savantes et difficiles appréciations, nous nous contenterons de donner ici un moyen facile et simple de trouver la place que doivent occuper les cloisons de quelque ordre que ce soit à partir du troisième cycle.

Afin de rendre plus compréhensible ce que nous allons dire, nous examinerons ce qui se passe dans une seule chambre primaire, c'est-à-dire dans l'espace compris entre deux cloisons primaires et les lois que nous aurons posées seront applicables à toutes les autres chambres primaires, quel que soit le type auquel appartienne le Polypier.

Si nous représentons par 1 les cloisons du premier ordre, 2 celles du second, 3 celles du troisième, 4 celles du quatrième et ainsi de suite, nous voyons que lorsque la chambre contient des cloisons du deuxième et du troisième ordre les cloisons sont disposées dans l'ordre suivant :

1, 3, 2, 3, 1.

Si maintenant, les trois premiers cycles étant formés, le travail organogénique du polypier continue, *les cloisons des ordres suivants prendront naissance entre les deux chiffres dont la somme forme le total moindre*. Ainsi $1 + 3 = 4$ étant plus petit que $3 + 2 = 5$, c'est entre les cloisons 1 et 3 que les cloisons du quatrième ordre se développeront, et les cloisons du cinquième ordre prendront naissance dans les chambres ternaires restées libres entre 2 et 3 et compléteront ainsi le quatrième cycle.

Celui-ci sera donc ainsi représenté :

1 4 3 5 2 5 3 4 1

On peut remarquer que les cloisons comprises entre 1 et 2 c'est-à-dire entre les primaires et les secondaires sont dans un ordre symétrique ; c'est ce qui arrive pour le développement de toutes les autres cloisons, de sorte que, en connaissant la série entre 1 et 2 on connaît la disposition des cloisons de toute la chambre primaire et, par conséquent, de tout le Polypier.

Le quatrième cycle étant connu, appliquons la loi que

nous venons de poser aux différents ordres de cloisons qui composent le cinquième cycle :

Totaux	5	7	8	7	7	8	7	5
	1	4	3	5	2	5	3	4

$1 + 4 = 5$ donnant le total moindre de tous les chiffres du quatrième cycle, c'est entre ces deux chiffres que nous plaçons le chiffre 6 qui représente les cloisons du sixième ordre. Mais ici une difficulté se présente, deux additions nous donnent le même total $4 + 3 = 7$ et $5 + 2 = 7$. Dans ce cas et toujours, *l'ordre de cloison qui va se développer prendra naissance entre les deux chiffres dont l'un est le plus faible de la série*. Ainsi 2 étant le chiffre le plus faible, c'est entre 2 et 5 que se placeront les cloisons du septième ordre. Puis, viendront les cloisons du huitième ordre qui prendront naissance entre 4 et 3 $= 7$, dont le total est moindre que $3 + 5 = 8$, et c'est entre ces derniers chiffres que se placeront les cloisons du neuvième ordre qui complètent le cinquième cycle.

Celui-ci sera donc ainsi représenté :

Totaux	5	7''	8	7'	7'	8	7''	5
	1, 6, 4, 8,	3, 9, 5,	7, 2,	7, 5,	9, 3,	8, 4,	6, 1	

En agissant comme nous venons de le faire on constituera le sixième cycle de la manière suivante :

Totaux	7	10	12'	11	12''	14	12'''	9	9	12
	1, 10, 6, 12,	4, 15, 8,	13, 3,	14, 9,	17, 5,	16, 7,	11, 2,	11, 7,	16, 5	etc.

Il est à remarquer que les additions qui donnent le même total sont formées par des chiffres différents qui ne se touchent pas immédiatement. Deux totaux semblables ne se trouvent donc jamais placés à côté l'un de l'autre, car les mêmes chiffres ne se répétant jamais entre 1 et 2, il ne peut se faire qu'un chiffre placé entre deux chiffres différents, puisse donner par son addition avec l'un d'eux, le même total qu'il donne avec l'autre. Il est donc toujours facile de trouver quand les sommes sont égales, quelle est l'addition qui renferme le chiffre le plus petit.

Afin de faire mieux comprendre comment les cycles sont composés et combien de cloisons et d'ordres ils renferment, nous terminerons ce que nous avons à dire sur le développement des cloisons en donnant le tableau de 7 cycles complets et en prenant pour exemple le type hexaméral qui est de beaucoup le plus fréquent.

TYPE HEXAMÉRAL.

ORDRES.	CLOISONS pour chaque ordre.	NOMBRE DES CLOISONS pour chaque cycle.
1 ^{er} CYCLE.		
1 ^{er} ordre	6	6... 1 ^{er} cycle.
2 ^e CYCLE.		
2 ^e ordre	6	12... 2 cycles complets.
3 ^e CYCLE.		
3 ^e ordre	12	24... 3 cycles complets.
4 ^e CYCLE.		
4 ^e ordre	12	36... 3 cycles 1/2.
5 ^e ordre	12	48... 4 cycles complets.
5 ^e CYCLE.		
6 ^e ordre	12	60... 4 cycles 1/4.
7 ^e —	12	72... 4 cycles 1/2.
8 ^e —	12	84... 4 cycles 3/4.
9 ^e —	12	96... 5 cycles complets.
6 ^e CYCLE.		
10 ^e ordre	12	108... 5 cycles 1/8.
11 ^e —	12	120... 5 cycles 1/4.
12 ^e —	12	132... 5 cycles 3/8.
13 ^e —	12	144... 5 cycles 1/2.
14 ^e —	12	156... 5 cycles 5/8.
15 ^e —	12	168... 5 cycles 3/4.
16 ^e —	12	180... 5 cycles 7/8.
17 ^e —	12	192... 6 cycles complets.

ORDRES.	CLOISONS pour chaque ordre.	NOMBRE DES CLOISONS pour chaque cycle.
7 ^e CYCLE.		
18 ^e ordre	12	204....
19 ^e —	12	216....6 cycles 1/8.
20 ^e —	12	228....
21 ^e —	12	240....6 cycles 1/4.
22 ^e —	12	252....
23 ^e —	12	264....6 cycles 3/8.
24 ^e —	12	276....
25 ^e —	12	288....6 cycles 1/2.
26 ^e —	12	300....
27 ^e —	12	312....6 cycles 5/8.
28 ^e —	12	324....
29 ^e —	12	336....6 cycles 3/4.
30 ^e —	12	348....
31 ^e —	12	360....6 cycles 7/8.
32 ^e —	12	372....
33 ^e —	12	384....7 cycles complets.

Ce que nous venons de dire pour le type hexaméral est applicable à tous les autres types, et quel que soit le nombre des cloisons primaires, les choses se passent toujours de la même façon dans les chambres primaires. Cependant on remarque quelquefois des anomalies dans le développement des cloisons, non, quant à leur nombre, mais quant à leur aspect. Ainsi dans un calice comprimé soit naturellement, soit par le fait de la pression des calices voisins, il peut arriver que certaines cloisons primaires ou secondaires soient plus ou moins atrophiées et restent plus petites que des cloisons voisines d'un ordre inférieur. Ce cas, qui se présente quelquefois et qui pourrait induire en erreur est assez rare, et il est généralement facile, en faisant des coupes à la base du Polypier, de reconnaître quelles sont les cloisons primaires et en quel nombre elles se sont développées. Dans le genre *Eup-sammia*, on remarque que les cloisons primaires ou secondaires ne sont pas toujours les plus développées et que celles des cycles inférieurs acquièrent une largeur quelquefois double de celles qui les ont précédées; cette disposition extrême

mement rare est limitée à quelques fossiles du genre que nous avons cité.

Il arrive assez fréquemment, chez les *Zoanthaires* Rugueux qu'une ou plusieurs cloisons avortent. Elles sont alors remplacées par une dépression qui occupe la place de la cloison qui manque. On donne à cette dépression le nom de *fossette septale*. La fossette septale occupe toujours la place d'une cloison principale comme dans le genre *Zaphrentis*, et elle peut remplacer trois et même quatre de ces cloisons, mais on n'observe jamais deux fossettes septales seulement dans le même calice. L'existence de ces fossettes qu'on ne remarque que dans les *Zoanthaires* du type tétraméral est pour nous la preuve certaine que les types triméral, pentaméral, etc., existent réellement, puisque nous voyons que chaque fois qu'une cloison avorte elle est remplacée par un sillon et nous ne voyons rien de pareil dans les genres du type pentaméral, bien que MM. Edwards et J. Haine rapportent ce type au type hexaméral en supposant qu'une des six grandes cloisons a avorté.

2. **COLUMELLE.** — Souvent il s'élève du centre du calice un corps arrondi ou aplati, de forme et de composition variable auquel on donne le nom de *Columelle* (*Columella*). Il existe deux espèces de Columelle, la Columelle vraie (*Columella propria*) et la fausse Columelle (*pseudo-columella*).

A. *Columelle vraie.* — La Columelle vraie peut-être constituée par une tige compacte, ronde ou comprimée, formée d'une seule pièce, qui, partant du fond de la loge, s'élève en même temps que les cloisons et vient faire saillie au fond du calice. Dans ce cas, la Columelle est dite *styliforme* (Exemple : *Turbinolia sulcata*, *Stylina grandiflora*). — Dans d'autres cas elle est formée par la réunion d'un nombre plus ou moins grand de baguettes réunies en faisceau et on l'appelle Columelle *fasciculaire*. Ces baguettes peuvent être libres, soudées entre elles, ou seulement réunies par des *trabicules*. Elles peuvent aussi avoir une direction simplement verticale, ou s'élever en se tordant entre elles comme les fils d'une corde (Exemple : *Caryophyllia Cyathus*). — La Columelle peut encore se présenter sous forme de lame mince et allongée. Elle

porte alors le nom de Columelle *lamellaire*. C'est ce qui arrive dans certains Polypiers fissipares, comme les *Aplosmilia*, et surtout dans ceux qui ont une forme méandroïde comme dans les genres *Rhipidogyra*, *Mæandrina*, etc. La lame columellaire peut être remplacée par des tigelles placées à la suite les unes des autres et quelquefois soudées ; la partie supérieure de la Columelle est représentée alors par une série de points ou par une lame dentée. Toutes ces Columelles peuvent être libres dans une étendue plus ou moins grande, mais généralement elles sont unies aux cloisons soit directement, soit au moyen de prolongements spiniformes émanés de celles-ci.

La columelle peut aussi être soudée à une cloison assez intimément pour qu'elle semble n'être qu'un renflement du bord interne de cette cloison. Ce cas se rencontre dans les genres *Pleurosmilia*, *Pleurostylina*, et dans quelques fossiles des Zoanthaires rugueux.

B. *Fausse Columelle*.— Nous avons vu que les cloisons peuvent rester libres par leur bord interne ou se rencontrer au centre du calice ; il peut arriver dans ce dernier cas que le prolongement des cloisons donne lieu à une masse plus ou moins épaisse à laquelle on donne le nom de *fausse Columelle*. Il y a plusieurs espèces de fausse Columelle :

1° Les cloisons en se rencontrant au centre du calice peuvent continuer à croître encore et à s'enrouler par leur bord interne avec les cloisons qui leurs sont opposées ou qui les avoisinent. Elles donnent ainsi lieu à une espèce de colonne centrale d'un aspect tout particulier et que nous appellerons *Columelle tortile* (*columella tortilis*).

2° Du bord interne des cloisons partent quelquefois de petites baguettes qui se redressent brusquement au centre du Polypier et donnent lieu à une fausse Columelle, à laquelle MM. Edwards et Haime ont donné le nom de *Columelle cloisonnaire* (*Columella septalis*).

3° Les baguettes, au lieu de se redresser, peuvent se diriger horizontalement au centre du Polypier, s'y diviser en une foule de ramuscules qui s'entrecroisent, se soudent partout où ils se rencontrent et forment au centre du calice une masse spongieuse à laquelle les auteurs que nous avons cités ont donné le nom de *Columelle pariétale* (*Columella parietalis*).

La Columelle est un organe constant dans les mêmes espèces, mais la délicatesse de sa constitution, la fragilité des tiges ou des lames qui la composent, déterminent souvent la rupture et la disparition de cet organe. Cependant avec un peu de soin et d'attention on peut parvenir à voir si la Columelle a existé ou non au fond d'un calice, car lorsque cet organe a été brisé, il laisse généralement, à moins que le fossile ne soit très altéré, des traces évidentes de sa rupture. La présence de la Columelle n'est jamais un caractère seulement spécifique, cet organe doit toujours servir à caractériser les genres.

3. **PALIS.** — Entre le bord interne des cloisons et la place columellaire on remarque dans certains genres de Polypiers des corps lamelleux qui, partant du fond de la loge, s'élèvent et grandissent en même temps que les cloisons et la Columelle. Ces organes, auxquels MM. Edwards et Haime ont donné le nom de *Palis* (palulus) sont situés sur le prolongement des cloisons et forment une ou plusieurs couronnes autour du centre du Polypier.

Les palis sont quelquefois libres et isolés, mais souvent ils sont soudés aux cloisons correspondantes et semblent n'en être que la continuation. Mais un examen attentif des cloisons montre qu'elles sont toujours séparées des palis par un sillon plus ou moins profond, et que les granulations qui se trouvent sur les faces latérales des cloisons ne font pas suite à celles qui couvrent la surface des palis. Les palis peuvent aussi être adhérents à la columelle, et, dans certains cas, n'être représentés que par des tigelles libres et qui forment dans le calice une couronne ponctuée.

Le nombre de palis et le nombre de couronnes qu'ils forment sont variables suivant les espèces, mais ils sont subordonnés au développement des cloisons dont ils semblent n'être que le complément. En effet, les palis sont d'autant plus larges et plus développés qu'ils correspondent aux cloisons les plus jeunes et les moins développées, et, au contraire, en face des grandes cloisons les palis se montrent presque à l'état rudimentaire. Nous allons indiquer successivement des lois qui président au développement des palis.

A. Lorsqu'il y a une seule couronne de palis, celle-ci correspond toujours au pénultième cycle cloisonnaire. Lorsqu'il y a deux couronnes, les palis sont placés au-devant des cloisons du pénultième et de l'antépénultième cycle. S'il existe trois couronnes, on voit qu'il existe aussi quatre cycles cloisonnaires et que les palis se sont développés en face des trois premiers cycles seulement.

B. La présence d'une couronne de palis devant un cycle indique qu'il doit être suivi d'un autre cycle plus jeune : ainsi, si la couronne de palis correspond aux cloisons primaires, il y a 2 cycles ; si la couronne correspond aux cloisons secondaires, il y a trois cycles, etc.

C. La présence d'une couronne de palis au devant de l'antépénultième cycle, n'implique pas toujours la présence de palis au devant des cycles plus anciens. Mais, au contraire, l'existence de palis, devant les premiers cycles, indique toujours qu'il s'en trouve devant les cycles inférieurs jusqu'au pénultième inclusivement. Ainsi, lorsqu'un Polypier qui possède 4 cycles, a des palis devant le 4^{er} cycle, on est certain d'en trouver devant le 2^{me} et le 3^{me}. Mais si un Polypier qui a plusieurs cycles possède des palis devant le pénultième cycle, il n'en possède pas nécessairement devant les autres cycles plus anciens. C'est ce qu'on remarque dans le *Placocyathus apertus* qui possède six cycles cloisonnaires et seulement deux couronnes de palis, placées devant le pénultième et l'antépénultième cycle.

D. Deux genres seulement montrent, comme exception à la règle générale, des couronnes de palis situées devant tous les cycles cloisonnaires. Ce sont les genres *Leptocyathus* et *Heterocyathus*.

Les palis, dont on constate souvent la présence dans une grande quantité de Polypiers simples de la famille des Turbinolides, sont, au contraire, assez rares parmi les Polypiers composés des Astréides. Souvent on a pris pour des palis des dents très-développées au bord interne des cloisons, et formant autour de la columelle une couronne saillante. Il arrive aussi, dans quelques cas, que le bord interne des cloisons s'est épaissi et comme renflé au centre alors que le reste de la cloison est mince; cet accident qui se montre dans quelques Stylines simule aussi assez bien une couronne de palis et a pu tromper les ob-

servateurs. Enfin, nous avons pu nous convaincre que, dans quelques fossiles dont les cloisons, bien développées, vont jusqu'au centre et se soudent souvent avec leurs voisines, il arrive fréquemment, par suite de la fossilisation, un épaississement notable de l'extrémité des cloisons là où elles se touchent, épaississement dont la forme régulière simule assez bien une couronne de Palis qui, en réalité n'existe pas.

4. SYNAPTICULES. Les trois premiers organes internes que nous venons d'étudier sont certainement les plus importants et constituent pour ainsi dire le squelette interne des Polypes. Les dernières parties que nous allons examiner, paraissent n'être que des annexes des premières, et cependant c'est à l'aide de ces organes que MM. Edwards et Haime ont établi de grandes coupes parmi les Madréporaires.

La loge qui contient les parties molles du Polype, peut rester ouverte dans toute sa hauteur, comme cela se remarque dans les Turbinolides et les Dasmides ; mais il arrive dans quelques Madréporaires que les granulations que l'on observe sur les faces latérales des cloisons s'allongent, donnent naissance à des corps coniques dont la base repose sur la surface latérale d'une cloison, et dont le sommet va s'unir avec le sommet d'un corps conique ou sur la face correspondante d'une cloison voisine. Ces corps qui remplissent les chambres d'une espèce de treillage semblable aux bâtons à perches d'une cage, ont reçu de MM. Edwards et Haime le nom de synapticules, et caractérisent la famille des Fungides.

La présence des synapticules qu'on observe si facilement dans les Polypiers vivants, est souvent difficile à constater sur les fossiles. En effet, la plupart des Zoanthaires ont les cloisons plus ou moins granuleuses, et ces cloisons sont quelquefois tellement rapprochées, que les grains de deux cloisons voisines sont en contact et peuvent simuler des synapticules. Souvent aussi les Polypiers fossiles sont remplis de substances étrangères provenant ou non de la fossilisation, qui comblent les loges et masquent complètement les caractères internes. Enfin dans des coupes horizontales, on peut encore confondre d'autres organes avec les synapticules ; les traverses, en effet, sont souvent fortement inclinées, et dans une coupe horizontale elles apparaissent sous forme de barreaux unissant les cloisons

et ressemblant assez aux synapticules. Le meilleur moyen, lorsqu'il reste du doute sur la nature des organes intercloisonnaires, de reconnaître ces organes, est de faire une coupe passant par le centre du polypier et d'arriver peu à peu, par l'usure d'une cloison, à reconnaître ce qui existe dans les chambres. Ce moyen est aussi le seul applicable à la recherche de l'existence des autres organes que nous allons examiner.

5. TRAVERSES. On remarque dans certains Madréporaires, surtout chez les Astréides, des lames assez minces, étendues dans un sens horizontal entre les cloisons et qui divisent les chambres de dehors en dedans, sans cependant les clore complètement. Ces organes qui unissent ensemble les cloisons, sont toujours imperforés et placés à des distances plus ou moins éloignées et souvent régulières. Les genres *Stylophora*, *Montlivaultia*, *Thecosmilia*, etc., montrent des traverses bien développées et souvent régulières. Ces organes sont probablement formés après le retrait du polype, alors que la muraille de celui-ci ayant grandi, les parties viscérales sont obligées de s'élever pour se mettre de niveau avec le bord calicinal. Cet effet se produit toutes les fois que le Polypier s'accroît par couches superposées, comme nous l'expliquerons plus loin, et se montre d'une manière évidente chez la plupart des Stylines.

Les traverses sont simples ou ramifiées. Les traverses simples sont les plus fréquentes; après celles-ci, les traverses bifurquées se montrent le plus souvent, et la bifurcation se fait généralement près du centre. Les traverses peuvent être très-éloignées, mais elles sont quelquefois tellement rapprochées, qu'elles forment une espèce de tissu vésiculaire, auquel on a donné un nom spécial. Ce cas se produit alors que le retrait des parties viscérales du polype se fait progressivement et lentement.

6. PLANCHERS. Lorsque les traverses se développent davantage, elles peuvent s'étendre sans interruption depuis la muraille jusqu'au centre, se souder complètement ensemble et fermer entièrement la loge qu'elles divisent en différents étages; on leur donne alors le nom de Planchers. Les planchers qui, comme les traverses, soutiennent la partie inférieure des parties molles du polype sont probablement le résultat d'une sécrétion épithéliale qui se détache de la partie inférieure de

la tunique dermique chaque fois que le polype s'élève dans la loge. L'étage supérieur est donc le seul qui soit occupé par le polype ; les étages inférieurs restent vides ou se remplissent par le développement de l'endothèque.

7. **ENDOTHEQUE.** On donne le nom d'*endothèque* à toute production calcaire organisée qui se développe dans les parties latérales et inférieures de la loge. L'endothèque n'est quelquefois formée que par des traverses nombreuses et très-rapprochées qui donnent naissance à un tissu réticulaire, spongieux qui remplit le fond de la loge et présente, dans une coupe verticale, un aspect feuilleté. Quand l'endothèque est compacte, elle paraît n'être qu'un développement de la paroi interne de la muraille et de la columelle, comme chez certaines *Oculinides*.

III. ORGANES EXTERNES.

Les organes que nous venons de passer en revue et qui ont servi à MM. Edwards et Haime à établir leurs Ordres, leurs Sous-Ordres et leurs Familles, sont donc, dans l'état actuel de la science, les plus importants, mais malheureusement les plus difficiles à reconnaître dans les Polypiers fossiles. Les organes externes qui, au contraire, sont généralement faciles à étudier, n'ont servi jusqu'à présent qu'à caractériser des genres et des espèces.

4. **CÔTES.** — On appelle *côtes* des productions en forme d'arêtes qui sillonnent verticalement la paroi externe de la muraille et qui généralement sont adossées aux cloisons. Le plus ordinairement les côtes suivent extérieurement la direction que les cloisons affectent à l'intérieur de la muraille, et elles peuvent, dans quelques cas, être tellement unies au bord externe des cloisons qu'elles paraissent en être la continuation et qu'elles cachent la partie supérieure de la muraille. Cependant il ne faut pas croire que le nombre des côtes soit toujours égal à celui des cloisons, car, si souvent il en est ainsi, souvent aussi le nombre des côtes est plus grand ou moindre que celui des cloisons, et les unes peuvent même exister sans les autres.

Les côtes peuvent être nettement séparées des cloisons par le bord supérieur de la muraille ; mais, comme nous l'avons déjà dit, elles sont quelquefois entièrement unies aux cloisons et semblent n'être que la continuation de celles-ci. Dans ce cas, elles cachent complètement la muraille, et comme on ne peut déterminer au juste où finissent les cloisons et où commencent les côtes, on désigne ces organes réunis par le nom de *rayons septo-costaux*. Si les rayons septo-costaux partent d'un centre calicinal pour aller, sans interruption, jusqu'au centre calicinal d'un autre polypierite, on leur donne le nom de *cloisons confluentes* et mieux rayons septo-costaux confluent. (Ex. : les genres *Thamnastræa*, *Dimorphastræa*, etc.)

Les côtes, dans quelques Polypiers, sont quelquefois armées de dents, d'épines ou de prolongements radiciformes. Dans d'autres cas, elles sont représentées par des séries de granulations, ou apparaissent sous forme de lames tranchantes et cristiformes. Enfin, elles sont quelquefois tout à fait rudimentaires et représentées par des stries qui sillonnent verticalement la muraille. Dans les espèces composées, les côtes sont quelquefois très-développées et servent à unir les différents polypierites pour former les Polypiers massifs et astréiformes.

Les côtes, malgré leur parenté évidente avec les cloisons, ne se montrent pas généralement en nombre égal à celui de ces dernières. Si, dans quelques cas, le nombre des cloisons l'emporte sur celui des côtes, le contraire arrive le plus ordinairement. Ainsi dans les Styliques, par exemple, alors qu'on observe 2 cycles de cloisons, il existe 3 cycles de côtes ; si l'on trouve 3 cycles de cloisons, on remarque ordinairement 4 cycles de côtes, soit que le dernier cycle de cloisons reste tout à fait rudimentaire ou qu'il ne soit pas encore développé. Les côtes les plus développées ne sont pas non plus toujours en rapport avec les cloisons les plus grandes, c'est même le contraire qui arrive ordinairement. Dans quelques cas rares, les côtes ne sont pas adossées aux cloisons, mais elles se développent dans leur intervalle ; les genres *Micrabacia* et *Stephanophyllia* offrent seuls cette anomalie. Enfin, le genre *Dasmia* présente la particularité d'une seule côte correspondant à 3 cloisons, et encore ces trois cloisons doivent-elles être considérées comme n'étant que les éléments d'une même cloison.

2. **EXOThÈQUE.** — MM. Milne-Edwards et J. Haime désignent sous le nom d'*Exothèque* tous les tissus organisés qui se trouvent placés en dehors de la muraille. Ces tissus ne sont réellement développés que dans les Polypiers composés, et ils servent à remplir les intervalles qui séparent les polypiérites. L'exothèque n'est quelquefois constituée que par des lames horizontales qui se forment entre les côtes et qui sont tout à fait analogues aux *traverses endothécales*; on les désigne sous le nom de *traverses exothécales*. Ces dernières ne doivent réellement porter ce nom que dans les Polypiers simples, et certains Polypiers composés où elles sont assez espacées pour être facilement distinguées. Mais lorsqu'elles sont très-rapprochées et unies plus ou moins intimement ensemble, elles constituent un tissu feuilleté, celluleux ou subcompacte que l'on désigne sous le nom de *cœnenchyme*.

L'Exothèque, au lieu d'être formée par un tissu celluleux ou feuilleté, peut être représentée par une production sclérenchymateuse tout à fait compacte et dans laquelle on ne reconnaît pas de trace d'éléments feuilletés. Ce tissu compacte, auquel convient surtout le nom de *cœnenchyme*, présente généralement à sa surface des granulations très-fines et disposées sans ordre. Les Oculiniens, les Stylophoriens, les Pachygyres, etc., présentent, à des degrés différents, les formes d'Exothèque que nous avons signalées.

L'Exothèque peut encore être perforée par un grand nombre d'ouvertures, le plus souvent irrégulières, et ressembler à un tissu spongieux, comme on le remarque dans certains Polypiers des Zoanthaires Poreux. D'autres fois sa surface est plus ou moins fortement échinulée ou couverte d'aspérités et d'épines.

Les éléments qui composent l'Exothèque forment quelquefois une masse celluleuse dans laquelle les polypiérites semblent être plongés; MM. Edwards et Haime ont donné à cette forme de l'appareil exothécal le nom de *Périthèque*.

3. **EPITHÈQUE.** — On donne le nom d'Epithèque à une production épithéliale qui, sous forme de membrane sclérenchymateuse plus ou moins développée, enveloppe la partie extérieure des Polypiers. L'Epithèque peut être directement appliquée sur la muraille et se confondre avec celle-ci; dans

d'autres cas, elle recouvre les côtes et reste plus ou moins éloignée de la muraille elle-même. L'Épithèque est forte et bien développée dans certains genres, comme dans les *Montlivaultia*, les *Pleurosmilia*, etc., et, dans ce cas, elle forme souvent des bourrelets transversaux très-prononcés; dans d'autres cas, elle est très-mince et assez semblable à une couche de vernis. L'Épithèque peut occuper la base seulement du Polypier ou le couvrir jusqu'au calice; il peut même arriver que cette membrane calcaire dépasse les bords de celui-ci. Dans les Polypiers composés et massifs, elle forme, à la partie inférieure, un plateau généralement plissé circulairement; il peut arriver cependant qu'elle s'élève jusque près des calices et recouvre, en certains points, les côtes, comme on le remarque pour le *Stylina gemmans* E. de From. Chez quelques Polypiers, particulièrement des terrains anciens, l'épithèque forme des prolongements plus ou moins saillants et radiciformes qui unissent entre eux les polypières ou qui servent à fixer le Polypier.

L'Épithèque étant la partie la plus externe du Polypier, il peut arriver que les Polypiers qui s'étalent sur un corps étranger et qui y adhèrent par une sécrétion épithéliale, se développent plus dans un point de cette surface que sur un autre, Or, dans ce point où l'action vitale devient plus grande, la sécrétion épidermique augmente rapidement, et il se forme des couches successives d'épithèques qui bientôt constituent une petite colonne sclérenchymateuse sur la surface de laquelle vivent les polypes qui lui ont donné naissance; c'est ainsi que se forment les Polypiers rameux, phytoïdes et basilaires qu'on rencontre dans les Gorgones, les Isis, le Corail, etc. Cette première colonne, une fois produite, une activité vitale plus considérable peut se développer sur un point de sa surface, et ce qui se passait à la base, a lieu sur ce point de la surface de la première tige, et une tige nouvelle prend naissance. On comprend facilement que, de cette manière, il peut se former des Polypiers affectant les formes les plus variées: les uns se disposent en éventail, d'autres en touffes; ceux-là s'étalent en rameux, ceux-ci sous forme de treillage, etc. — Les polypes qui donnent naissance à ces productions ne possèdent pas toujours des polypiers adhérents; quelquefois la partie inférieure s'allonge en forme de pointe, comme on le remarque chez les *Pennatulæ*,

et cette pointe, s'enfonçant dans le sable, sert à fixer la colonie.

STOLONS. — Chez quelques Polypiers qui se reproduisent par bourgeonnement, on aperçoit des prolongements plus ou moins larges émanant de la base, et sur lesquels de nouveaux calices se développent. Ces prolongements, auxquels on a donné le nom de *stolons*, sont évidemment le résultat d'une production épidermique et encroûtent généralement les corps sur lesquels se développent les Polypiers. Les Stolons peuvent rester à l'état mou et ne pas se charger d'éléments calcaires ; dans ce cas ils disparaissent sans laisser de traces fossiles ; mais chez quelques Polypiers les Stolons s'organisent à peu près comme les autres parties des Polypiers, et leur substance sclérénchymateuse résiste et passe comme le reste à l'état fossile.

IV.

REPRODUCTION ET MULTIPLICATION DES POLYPIERS.

1. **OVIPARITÉ.** — Les polypes à polypiers n'ont qu'un seul mode de reproduction : arrivés à une certaine époque de leur vie, ils laissent échapper par la bouche un œuf qui, détaché des ovaires, était tombé dans la cavité stomacale. Cet œuf, assez semblable aux germes des Spongiles, va se fixer sur un corps résistant, y adhère par un point de sa surface, tandis qu'au point opposé se développent peu à peu les éléments qui doivent entrer dans la composition du nouvel être. Tel est le mode de reproduction de tous les Polypiers, qu'ils soient simples ou composés.

La reproduction est donc l'action par laquelle les polypes se renouvellent en passant par toutes les phases de l'ovisme. La multiplication, au contraire, est le résultat du développement, sur l'espèce souche, d'individus semblables. Ce développement a lieu sous l'influence de deux propriétés, que nous étudierons bientôt et qui sont propres aux polypes : le *bourgeonnement* et la *fissiparité*.

L'œuf qui s'est fixé et qui commence son évolution, donne naissance à une petite colonne peu élevée d'abord, étalée, adhérente par la base et présentant à son sommet un calice plus ou moins développé. Le Polypier ainsi formé, et qu'on rencontre quelquefois fossile à cet état embryonnaire, n'appartient réellement encore à aucun genre, à aucune espèce, car les caractères qu'il présente alors doivent bientôt changer, soit qu'il reste Polypier simple, soit qu'il représente la souche d'une colonie future.

Le jeune Polypier peut continuer à s'accroître en restant unique et isolé. Il constitue alors ce que nous appelons un Polypier simple (*Monastrée*) ; il vit, grandit, engendre et meurt sans qu'un être semblable vienne unir son existence à la sienne. Cet état, tout particulier que nous avons pris pour base d'une de nos quatre grandes divisions, n'a pas, nous le pensons, assez attiré l'attention des Zoophytologistes. Ils se sont servi de l'existence isolée ou commune des Polypiers pour distinguer des genres seulement, et encore trouve-t-on dans certains genres des Polypiers simples mêlés avec des Polypiers composés. Et cependant, l'être qui est toujours seul, isolé, ne communiquant par aucun organe avec son semblable, peut-il être assimilé à ceux qui, par suite de leur constitution, sont réunis plus ou moins intimement en colonie, qui ne peuvent se déplacer qu'à la condition que les autres suivront le mouvement, qui ne prennent leur nourriture que là où tous les autres la cherchent, et qui enfin n'assimilent pas toujours pour eux seulement les aliments, mais qui y font participer les êtres qui les avoisinent ? Nous aurons bientôt à revenir sur ces considérations.

2. **BOURGEONNEMENT.** — Le bourgeonnement ou gemination est le résultat d'un développement plus grand de l'activité vitale du Polype sur un des points de sa surface. On voit d'abord apparaître une légère élévation arrondie qui bientôt se soulève en forme de bouton un peu déprimé au centre ; puis la partie supérieure se sépare en lames radiées qui constituent les cloisons, ou se creuse en tube, si les cloisons doivent être rudimentaires.

Les bourgeons, suivant qu'ils se développent sur la base, les

côtés ou le calice du Polypier, sont appelés *basilaires*, *latéraux* ou *calicinaux*.

BOURGEONNEMENT BASILAIRE. — La partie étalée de la base du Polypier souche peut continuer à s'étendre sous forme de prolongements rhizomorphes qui rampent sur le corps étranger où le premier individu est fixé et engendrent de distance en distance des individus semblables au premier Polype. La colonie est ainsi formée de Polypiers qui s'élèvent parallèlement côte à côte sur un réseau radiciforme et donnent lieu à une masse astréiforme plus ou moins compacte. Le genre *Rhizangia* nous fournit un exemple de cette disposition.

Dans d'autres cas, la base du Polypier, au lieu de s'étendre sur quelques points seulement, donne naissance à une lame mince et étendue sur laquelle les calices se développent. Cette lame peut rester libre comme dans le genre *Echinopora*, ou encroûter la surface du corps étranger sur lequel s'est développé le Polypier souche. Les lames libres peuvent aussi se plisser diversement, se rencontrer, se souder entr'elles et constituer alors une lame composée de deux feuillets et sur les deux faces de laquelle se développent les calices. Les calices peuvent être très-penchés à la surface de la lame et immergés dans le développement exothécal comme on le remarque chez les Pleurocœnies. Les Axopores, les Millépores, etc., ont au contraire des calices saillants réunis par un coenenchyme plus ou moins compacte.

BOURGEONNEMENT LATÉRAL. — Les bourgeons au lieu de se développer sur la base peuvent prendre naissance sur les côtés du Polypier, et donner lieu à une masse astréiforme ou à une touffe arborescente. Si les bourgeons s'écartent rapidement en suivant un angle très-ouvert, il en résulte un ensemble rameux, comme on le remarque chez les Goniocores et les Dendrosmilies ; mais si les nouveaux polypiérites s'élèvent en suivant un angle très-aigu, ils constituent une masse fasciculaire, comme le font les Cladocores, les Donacosmilies, etc.

Les bourgeons peuvent naître au hasard sur tous les points de la surface latérale du Polypier, mais souvent ils se développent régulièrement de distance en distance et quelquefois se dirigent tous du même côté.

Les polypiérites résultant du bourgeonnement peuvent rester

libres dans une grande étendue, depuis leur point de départ jusqu'à leur sommet, ou bien ils se trouvent réunis par le développement des côtes ou de l'exothèque. Dans ce dernier cas, ils donnent lieu à des masses empâtantes, de formes différentes. et à la surface desquelles les calices sont libres et seulement réunis par le développement des organes externes. Mais quelquefois les polypiérites se trouvent assez rapprochés pour que les murailles se soudent, et les calices affectent alors des formes polygonales, comme on le voit chez les *Isastrées*, les *Astrocaënies*, etc.

BOURGEONNEMENT CALICINAL. — Les bourgeons peuvent encore se développer dans le calice lui-même ou sur ses bords. Lorsque les bourgeons se développent dans le calice, comme on le remarque chez les *Eridophyllum*, le polypier souche meurt et les nouveaux donnent naissance à des masses cespitueuses plus ou moins agglomérées. Si les bourgeons se développent sur le bord du calice, on voit sur une petite partie de celui-ci une activité vitale plus grande, les cloisons qui correspondent à ce point s'élèvent, franchissent la muraille et restent au dehors pendant que celle-ci continue à s'accroître. Ce fait est facile à observer sur des échantillons de *Blastosmilies*. Les cloisons qui sont restées en dehors de la muraille sont les rudiments du nouvel être qui se développe rapidement et monte parallèlement à côté du polypier souche jusqu'au moment où il s'en détache. Le premier polypier porte alors les cicatrices de ce bourgeonnement, et on compte jusqu'à trois générations sur le même polypier, malgré sa petite taille. Quelquefois le bourgeonnement se fait sur le bord du calice, alors que celui-ci, arrivé à son maximum de développement, a cessé de s'accroître. Les genres *Enallohelix*, *Diplohelix* nous offrent un exemple de ce bourgeonnement; les polypiérites qui viennent de naître restent adhérents et engendrent eux-mêmes un autre polypiérite qui se développe sur le côté opposé à celui où son prédécesseur a pris naissance; il en résulte un bourgeonnement alterne, distique, fort remarquable qui donne lieu à des touffes arborescentes.

3. **FISSIPARITÉ.** — Le Polypier souche que nous avons vu se développer aux dépens de l'œuf peut encore se multiplier

par suite d'un dédoublement qu'on nomme *fissiparité*. Chez certains polypes mous, les Actinies, par exemple, la fissiparité peut donner naissance à deux individus isolés et indépendants, comme cela arrive chez les infusoires. Chez les polypes à polypiers, la fissiparité peut opérer le dédoublement du calice; mais jamais ne sépare le nouvel individu de celui qui lui a donné naissance. La fissiparité a toujours lieu dans le calice : on remarque sur un point de sa surface et principalement près de la columelle une activité vitale plus considérable; le calice s'allonge, les cloisons s'infléchissent vers ce point qui bientôt devient un centre, et la columelle, si elle existe, se divise et laisse une partie d'elle-même au nouveau centre. Bientôt les murailles se resserrent entre les deux centres qui s'écartent, s'éloignent peu à peu et deviennent enfin complètement indépendants. Les calices, après ce dédoublement, reprennent chacun la forme arrondie jusqu'au moment où ils donnent naissance à de nouveaux individus. Les polypières ainsi produits par fissiparité, peuvent, comme nous l'avons vu pour ceux qui résultent du bourgeonnement, s'élever l'un à côté de l'autre, tout en restant indépendants à partir de leur point de séparation, comme on le remarque dans les genres *Calamophyllia*, *Rhabdophyllia*, etc.; mais souvent aussi ils sont réunis par le développement des côtes et de l'exothèque, comme nous le montre le genre *Favia*. Enfin, dans d'autres cas, ils peuvent se souder par leurs murailles et présenter des calices polygonaux à la surface d'une masse empâtante, comme on le voit chez les Goniastères et les Septastères.

Les Polypiers, qui se multiplient par fissiparité, se distinguent de ceux qui bourgeonnent par leur tendance à se mettre en série, par leurs calices irréguliers et quelquefois par la présence, dans ceux-ci, d'un ou de deux centres naissants.

Les polypières fissipares ne s'individualisent pas toujours; il arrive quelquefois que le calice du Polypier souche s'allonge sans se diviser et occupe le sommet d'une lame plus ou moins longue et plissée. Cette lame peut rester libre par ses côtés et présenter à son sommet une double rangée de cloisons au milieu desquelles on ne distingue plus de centres proprement dits. Les genres *Rhipidogyra*, *Phytogyra*, etc., nous offrent cette particularité. Mais, dans d'autres cas, les lames peuvent se trou-

ver réunies par le développement des côtes ou de l'exothèque, comme on le remarque chez les *Pachygyra* et les *Plérogyna*, ou se souder intimement par leurs murailles comme on le voit dans les genres *Mœandrina*, *Eugyna*, etc.

Il arrive aussi que les polypières, tout en formant des lames continues, laissent cependant au centre de la vallée calicinales des traces de leur individualité. On remarque alors dans ces points un renflement de la Columelle, si elle existe, ou une direction convergente des cloisons vers ces points. La fissiparité donne, au reste, les mêmes résultats que le bourgeonnement; elle peut, comme ce dernier, engendrer des masses cespiteuses, gyreuses ou astréiformes.

DÉVELOPPEMENT PAR SUPERPOSITION. — Chez beaucoup de Polypiers massifs, le développement de la colonie s'opère au moyen de couches superposées. Ce fait, qui ne se produit que chez les Polypiers qui se multiplient par bourgeonnement, est surtout facile à observer chez les *Stylina* et les *Thamnastræa*.

La forme la plus commune qu'affecte la colonie qui commence à se former est la forme hémisphérique. A une certaine époque de l'âge de cette colonie, on remarque, sur un des points de sa circonférence, une activité vitale plus considérable et la production d'un bourrelet qui se forme entre les polypières qui se sont allongés. Ce bourrelet, qui résulte d'un grand développement des organes externes, s'étend peu à peu et recouvre à mesure qu'il s'avance la surface du Polypier sous forme d'une lame sclérenchymateuse plus ou moins épaisses. A l'approche de cette lame, les polypières s'allongent, la muraille et les cloisons s'élèvent au niveau de la surface de la nouvelle couche, et bientôt celle-ci les enveloppe de toutes parts jusqu'au bord du calice. C'est pendant cette évolution du Polypier que les nouveaux bourgeons se développent, et c'est à ce moment aussi que les polypes se retirent brusquement et donnent naissance aux traverses ou aux planchers qui divisent l'intérieur de la loge.

V.

HABITUDES EXTÉRIEURES DES POLYPIERS.

La manière dont les Polypiers s'engendrent ou se multiplient, imprime à ces êtres des modifications si sensibles, des habitudes si caractéristiques que nous n'avons pas hésité (1) à nous servir de la forme extérieure de ces animaux pour établir parmi eux des divisions naturelles d'autant plus utiles qu'elles facilitent considérablement le classement des Polypiers.

Les Polypiers se présentent sous quatre formes principales, que nous retrouvons dans tous les Zoanthaires et que nous allons successivement examiner.

1. **MONASTRÉES.** — Lorsque la reproduction et la multiplication des Polypiers a lieu uniquement par oviparité, les êtres qui en résultent sont toujours simples, vivent d'une vie isolée et ne sont jamais unis à leur semblable par un organe quelconque. Cet isolement, cette individualité absolue caractérisent les Monastrées.

Il peut arriver, mais accidentellement, qu'un Polypier simple se trouve placé sur un autre Polypier simple; mais alors l'œuf qui a produit le second s'est arrêté sur le premier Polypier et s'y est développé, comme il aurait pu le faire sur tout autre corps solide, et jamais on ne voit dans ce cas de rapport d'existence entre les deux animaux qui vivent l'un à côté de l'autre. Les Polypiers simples se distinguent facilement des autres Polypiers par leur existence particulière et leur individualité isolée, mais, comme tous les Polypiers composés, les *Thæcosmilia*, les *Aplosmilia*, etc., commencent par n'avoir d'abord qu'un Polypier simple qui, plus tard, sous l'influence du bourgeonnement ou de la fissiparité, devient Polypiers composé, il est souvent très-difficile, lorsqu'on étudie un être jeune, de pouvoir le placer avec certitude dans tel ou tel genre,

(1) Voyez notre *Description des Polypiers fossiles de l'Etage Néocomien*, 1857; Paris, chez Baillière, rue Haute-Feuille, 19.

et à plus forte raison lui assigner une place comme espèce. Aussi doit-on ne prendre pour types que des espèces qui semblent arriver à leur maximum de développement et qui présentent tous leurs caractères. Mais ce maximum de développement est, il faut bien l'avouer, très-difficile à déterminer chez les Polypiers simples. En effet, tant qu'un Polypier simple s'accroît, il s'élève, s'élargit et le nombre de ses organes internes peut augmenter avec l'âge. Que deviennent alors ces distinctions qui sont établies entre les espèces sur la hauteur du Polypier, la largeur du calice, le nombre des cloisons, etc., puisque le même Zoophyte à mesure qu'il avance en âge, éprouve des modifications sensibles dans sa muraille, son calice, ses cloisons, etc.? Les meilleurs caractères spécifiques sont, pour le Polypier simple, ceux qui sont tirés des organes internes et externes, de la grosseur de la columelle, de l'épaisseur des cloisons et des côtes, de leur dentelure, de la rareté ou de l'abondance des traverses, des planchers, etc.; mais à défaut de ces signes qui, chez les Polypiers fossiles, ne sont pas toujours faciles à constater, nous avons été, comme nos prédécesseurs, forcé de nous servir des caractères incertains que nous avons indiqués.

MM. Milne-Edwards et J. Haime ont aussi pris en considération l'état de liberté ou de fixité des Polypiers. Il y a, en effet, des Polypiers qui, comme les *Turbinolia*, semblent n'avoir jamais été fixés, même dans le jeune âge. Mais cette apparence ne doit pas être une réalité, car je ne crois pas qu'on ait déjà constaté que des œufs de polypes se soient développés sans s'être d'abord arrêtés sur un corps solide. Les Polypiers adhérents peuvent devenir libres par les progrès de l'âge, soit que le pédicule se trouve peu à peu résorbé, soit qu'il ne puisse supporter le poids du Polypier qui a grandi et qu'il se brise; il présente alors à sa base la trace d'une cicatrice qui, dans quelques cas, peut s'effacer complètement.

Quelques Polypiers appartenant à la famille des *Astrangiens* sont quelquefois rencontrés isolés et indépendants; mais on ne doit pas pour cela les regarder comme des Monastrées, car ils sont le résultat d'un bourgeonnement sur une expansion basilaire qui ne se durcit pas toujours et disparaît pendant la fossilisation.

Deux genres seulement de Polypiers simples, le genre *Blastotrochus* qui n'a pas de représentant à l'état fossile, et le genre *Blastosmilia* dont nous connaissons deux espèces des étages Corallien et Kimméridgien, se reproduisent en même temps par oviparité et bourgeonnement. Les bourgeons se développent sur le bord du calice ; mais peu après le développement du jeune Polypier, il se détache et devient libre et indépendant. Nous avons pu constater qu'il n'y a aucune communication dans ce cas entre les individus qui se trouvent temporairement réunis.

Les Polypiers simples ne se reproduisent jamais par fissiparité complète, c'est-à-dire qu'un être ne peut jamais donner naissance à deux êtres semblables en se divisant complètement. La nature sclérenchymateuse du Polypier semble être l'obstacle qui s'oppose à cette division spontanée, puisqu'il paraît qu'on l'a déjà observé chez les Actinies dont le polype est entièrement charnu.

2. DISASTRÉES. — Les Disastrées sont des polypiers dont les polypiérites, bien que réunis par leur partie inférieure, restent libres entre eux depuis leur point d'adhérence jusqu'au calice. Lorsqu'un polypier, qui prend naissance, doit constituer un polypier fasciculé, il s'élève d'abord comme le fait le polypier simple, puis arrivé à une certaine époque de sa croissance, il commence à se multiplier de différentes manières, suivant qu'il se développe sous l'influence de la fissiparité ou du bourgeonnement.

Si le polypier doit subir la fissiparité, son calice éprouve les modifications que nous avons indiquées plus haut, deux centres s'y établissent et deviennent bientôt indépendants. Les nouveaux polypiérites, munis d'une muraille qui leur est propre, s'élèvent l'un à côté de l'autre, puis leurs calices se fissiparisent à leur tour et le polypier présente bientôt une forme cespiteuse, un ensemble de polypiérites qui, bien que réunis entre eux par leur partie inférieure, sont libres dans une grande étendue et jouissent d'une existence toute individuelle. Les genres *Aplosmilia*, *Rhabdophyllia*, *Aplophyllia*, etc., nous offrent des exemples de cette forme.

Lorsque les Disastrées se multiplient par bourgeonnement,

les bourgeons peuvent se développer sur les calices, sur les parois externes de la muraille ou sur une expansion basilaire.

Les bourgeons qui se développent sur le calice peuvent se montrer sur son bord ou dans son intérieur. Dans le premier cas, le polypiérite qui prend naissance se jette un peu de côté pour ne pas nuire à celui qui l'a engendré et s'élève ensuite presque verticalement jusqu'au moment où un autre bourgeon se déclare à son tour sur son calice; il cesse alors de croître et le nouveau bourgeon se développe dans le sens du premier parent. Il en résulte une gemmation alterne, distique, qui distingue le genre *Enallohelix*. Quelquefois il se déclare deux bourgeons sur le même bord calicinal; ces bourgeons sont alors opposés et se développent suivant un angle très-ouvert, comme on le voit dans le genre *Euhelix*. Si les bourgeons se déclarent dans le calice lui-même, le polypier souche ne tarde pas à cesser de vivre, et les polypiérites qui prennent ainsi naissance s'écartent très-peu et ont de la tendance à se souder par leur muraille.

Lorsque le bourgeonnement s'opère sur les parois de la muraille, les jeunes polypiérites se développent en formant un angle très-ouvert avec le premier polypiérite, et le polypier affecte dans ce cas une forme rameuse bien prononcée, comme on le remarque dans les genres *Goniocora*, *Dendrophyllia*, etc. Mais il arrive aussi que les jeunes polypiérites se relèvent brusquement et s'élèvent parallèlement avec le polypier souche auquel ils s'unissent quelquefois au moyen de prolongements; les genres *Donacosmilia*, *Stylosmilia*, *Syringopora*, etc., nous en fournissent des exemples.

Le bourgeonnement peut encore se faire sur des expansions basilaires, qui, sous forme de stolons, vont loin du polypier souche s'irradier et donner naissance à de nouveaux polypiérites. Cette forme, bien distincte des précédentes, doit aussi faire rentrer ces polypiers parmi les disaistrées; car, comme les premiers que nous avons examinés, ces polypiérites, quoique réunis par leur base, sont cependant libres dans une grande étendue. Il peut même arriver que les stolons ne se durcissent pas et qu'à l'état fossile on trouve les polypiérites complètement séparés. Cet accident ne doit en aucune façon faire changer la place que nous assignons à ces fossiles.

SYRRASTRÉES. — Nous comprenons sous le nom de Syrrastrées tous les polypiers composés qui forment des séries calicinales, libres ou non, par leurs côtés, dont les centres sont plus ou moins indistincts, et qui constituent des vallées séparées par des crêtes ou collines. Chez les polypiers qui se multiplient par fissiparité, il peut arriver que le centre s'allonge sous l'influence d'une activité vitale qui se déclare sur un point du bord caliculaire, et que cette activité, ayant une tendance centrifuge, aille toujours et sans interruption en s'éloignant de son point de départ. Le premier calice ne donne pas alors naissance à 2 ou 3 calices distincts, comme nous l'avons vu pour les Disastrées, mais il s'allonge indéfiniment et donne lieu à une vallée plus ou moins tortueuse occupant le sommet d'une lame droite ou contournée. Cette lame peut rester libre par ses côtés, comme on le voit chez les *Rhypidogyra* et les *Phytogyra*; mais il arrive aussi qu'elle se soude aux lames voisines par ses murailles et constitue ainsi une masse plus ou moins étendue dont la surface est sillonnée de vallées séparées par des collines qui sont le résultat de l'accolement des murailles. Celles-ci présentent à leur sommet une ligne de démarcation lorsque la fusion des deux murailles n'est pas parfaite, et se terminent, au contraire, en arête si l'union des deux murailles est intime. Les genres *Mæandrina*, *Eugyra*, etc., nous offrent ces particularités. Les murailles peuvent ne pas être soudées ensemble, mais seulement réunies par le développement des côtes ou d'un cœnenchyme abondant. Les Stibastrées sont un exemple du premier état, et les Pachygyres du second. Chez les Polypiers vivants qui revêtent cette forme, on ne remarque pas une seule ouverture buccale pour toute une vallée, mais bien une série de bouches qui paraissent indépendantes, quoique toutes les cavités communiquent à l'intérieur. Cette disposition des parties molles semble laisser quelquefois des traces sur l'organisation du polypier lui-même, et il n'est pas rare de trouver au milieu des vallées des points vers lesquels les cloisons s'infléchissent et qui représentent des centres calicinaux, des radiments d'individualité. Dans quelques cas, les centres sont bien distincts et forment de véritables calices. Cette disposition se fait surtout remarquer chez les Syrrastrées, qui se reproduisent par bour-

geonnement, comme le montre le genre *Latimæandra*. Ici chaque polypière a sa muraille, les calices sont polygonaux, mais ils sont réunis en série et entre chaque série les murailles cacolées s'élèvent plus haut que les autres et donnent naissance à des collines plus ou moins saillantes. Il arrive quelquefois que les collines ne limitent pas une série simple de calices, mais qu'entre ces crêtes s'étend un espace assez étendu et couvert de calices. Les collines peuvent aussi être peu développées, peu longues et surgir ça et là à la surface d'un polypier chargé de calices en séries. Les genres *Comoseris* et *Orosieris* sont des exemples de ces deux états.

Nous avons fait encore rentrer dans nos Syrrastrées le genre *Halicites*, qui renferme des polypiers dont les individus, bien circonscrits et unis entre eux seulement par les côtés, forment des lames minces, verticales, diversement pliées et anastomosées.

POLYASTRÉES. — Nous avons réunis sous cette dénomination tous les Polypiers qui n'ont les caractères ni des Monastrées, ni des Disastrées, ni des Syrrastrées, et dont les polypières sont toujours intimement unis ensemble soit directement par les murailles, soit au moyen d'une production exothéciale quelconque. Les Polypiers des Polyastrées se multiplient aussi par fissiparité et par bourgeonnement. Dans le premier cas, les calices sont généralement déformés : ils ne sont ni régulièrement ronds, ni régulièrement polygonaux. Cette irrégularité tient à ce que les calices qui en produisent d'autres sont obligés de s'allonger pour donner lieu à 3 ou 4 calices semblables. Si les calices ne sont pas soudés par leur muraille, ils affectent une forme ovale, comme on le voit chez les *Favies* ; si, au contraire, ils sont comme chez les *Septastrées* intimement unis par les murailles, ils prennent une forme polygonale d'autant plus irrégulière qu'ils sont plus avancés en âge et près de se fissipariser.

Si les Polyastrées se multiplient par bourgeonnement, les polypières peuvent rester distants et n'être réunis que par un grand développement de l'appareil costal ou d'un cénenchyme plus ou moins abondant et compact. Le bourgeonnement, dans ce cas, s'opère au-dessous du calice et les jeunes

se montrent dans les intervalles qui séparent les calices. Si les polypiérites sont unis par leur muraille, les calices affectent une forme polygonale assez régulière, et le bourgeonnement a généralement lieu, dans ce cas, sur le bord du calice ou au pourtour de la colonie. Les bourgeons peuvent encore se développer sur une expansion de la base et s'unir à mesure qu'ils s'élèvent, comme on le remarque dans le genre *Phyllangia*.

La forme de la colonie peut varier à l'infini chez les Polyastées; tantôt elle s'étale en lames épaisses ou se développe en boule. Là, elle se pédicule et prend la forme d'un champignon; ici, elle s'élève et produit des branches qui donnent lieu à des touffes rameuses. Enfin, dans quelques cas, elle constitue des feuilletés très-minces, plus ou moins contournés ou enroulés et à la surface desquels les polypiérites se trouvent répartis.

Les polypiérites qui composent une colonie de Polyastées sont quelquefois, comme nous l'avons dit, très-rapprochés et présentent une forme polygonale. Les murailles peuvent, dans ce cas, être assez rapprochées pour se souder complètement ensemble et se confondre; dans d'autres cas, l'épithèque seule semble servir à l'union des polypiérites, et on remarque alors un léger sillon entre les murailles des calices qui se touchent.

Si les polypiérites sont éloignés les uns des autres, les calices restent sensiblement circulaires, et les murailles ne sont unies entre elles que par le développement d'une production exothécale. Cette production peut être, comme chez les Stylines, le résultat du développement des côtes; d'autrefois il se développe entre les murailles un tissu feuilleté, plus ou moins vésiculaire et qui paraît n'être que la continuation des traverses exothécales. Enfin les polypiérites semblent quelquefois être plongés dans une masse sclérenchymateuse qui doit probablement son origine à une production épithécale. Cette masse intermédiaire peut être compacte comme chez les Oculinides, feuilletée ou entièrement poreuse comme on le remarque chez les Zoanthaires Poreux.

Dès l'année 1854, nous avons déjà communiqué nos idées sur le classement des Polypiers à notre savant confrère et ami J. Haime, dont la perte a été aussi grande pour la science que douloureuse pour tous ceux qui, comme nous, ont pu jouir de sa précieuse amitié. Il chercha, par des exemples, à nous

prouver que l'habitude extérieure du polypier ne pouvait servir de base à une classification, et nous cita à l'appui de son opinion le genre *Cyathophyllum*, qui renferme, tel qu'il a été établi en dernier lieu par MM. Milne-Edwards et J. Haime, des polypiers simples, fasciculés et astréiformes, c'est-à-dire des Monastrées, des Disastrées et des Polyastrées. L'exemple qui nous était fourni parmi les Zoanthaires Rugueux aurait pu être concluant, si pareille chose eut existé dans les autres classes de Polypiers, si toujours l'analogie des caractères anatomiques internes des Polypiers l'eût emporté sur les caractères tirés de l'état d'isolement ou de société de ces êtres. Mais ce que ces auteurs ont admis comme vrai pour les Zoanthaires Rugueux, où ils ne craignent pas de placer ensemble, dans le même genre, des espèces simples et composées, ne leur a pas paru rationnel pour les autres Zoanthaires. En effet, ils ont placé dans des genres bien distincts les Montlivaulties et les Thécosmilies; les Placosmilies et les Aplosmilies; les Stylosmilies et les Stylines; les Axosmilies et les Astrocœnies, etc.... Et cependant quelle différence existe-t-il entre une Montlivaultie et une Thécosmilie, si la forme simple ou composée ne doit pas être prise en sérieuse considération? Pourquoi ne pas réunir les Stylosmilies et les Stylines; les Aplosmilies et les Placosmilies, etc.? Il n'existe de différence réelle entre ces différents polypiers que la forme simple ou composée, fasciculée ou astréiforme; une Thécosmilie est une Montlivaultie qui s'est reproduite par fissiparité, et la preuve c'est que MM. Milne-Edwards et J. Haime disent eux-mêmes : « Les » Montlivaulties (*Histoire naturelle des Coralliaires*, t. II, » p. 353; 1856) correspondent très-exactement aux Thécosmilies dans la section des Lithophylliacées simples, et il serait » même possible que nous eussions décrit, sous le premier de » ces noms, quelques polypiers encore simples, mais qui » étaient destinés par la suite à se fissipariser. » — Ailleurs, ils disent encore (même ouvrage, p. 369) : « Les caractères » que nous a fourni le polypier des Symphyllies se retrouvent » en partie dans deux genres dont nous avons déjà fait l'histoire, les Lithophyllies et les *Mussa*; les seules différences » qui séparent ces trois groupes sont justement celles qui nous » ont servi à établir trois sections dans l'agèle des Lithophyl-

» liacées, c'est-à-dire que dans le premier le polypier est
» simple, que dans le second il est composé et cespiteux, et
» que dans le troisième il est composé et massif; *mais on ob-*
» *serve dans chacun d'eux la même composition et la même*
» *structure.* » — Nous pourrions multiplier les citations et
trouver des exemples semblables dans tous les autres Zoan-
thaires, mais ces quelques lignes que nous venons de citer
nous paraissent suffisantes, puisqu'elles démontrent nettement
que les mêmes auteurs, qui n'ont pas craint de placer dans le
même genre des polypiers simples, fasciculés et astréiformes
ailleurs, se sont servi de ces différentes formes, non pas seu-
lement pour séparer des espèces, même des genres, mais,
comme ils le disent eux-mêmes, pour former des sections. Or,
ce qui est vrai pour une partie des Zoanthaires doit être vrai
pour toutes les autres, et nous ne devons pas hésiter à séparer
les espèces simples des espèces composées, les polypiers fasci-
culés des polypiers astréiformes, toutes les fois que ces êtres
ont été réunis dans la même espèce ou le même genre. La
nature, il est vrai, procède par gradation, on n'y remarque
jamais de brusques transitions; mais si on devait trop attacher
d'importance aux moindres liens qui unissent une série
d'êtres avec une autre, si on devait faire passer les détails
avant les généralités, les divisions n'auraient plus de limites
sensibles et toute classification deviendrait impossible. Ces
réflexions nous sont suggérées par ce que nous observons
chez les Polypiers; les espèces simples sont bien toujours
simples et sous ce rapport facile à distinguer des autres, et
cependant les espèces qui composent le genre *Blastosmilia*,
bien qu'appartenant réellement aux polypiers simples, présen-
tent, à l'époque où ils portent les jeunes bourgeons, quelque
ressemblance avec les Disastrées. Ces derniers, dont les poly-
piérites sont libres dans une grande étendue, peuvent quel-
quefois, par suite du resserrement des individus, se rapprocher,
se souder même et offrir quelque analogie avec les Polyastrées.
Il n'est pas non plus très-rare de remarquer, chez les Polyas-
trées des polypiérites qui tendent à s'isoler, comme on le voit
dans le *Stylina gemmans*, par exemple; enfin les Syrrastrées
eux-mêmes peuvent, dans quelques parties de leur surface,
présenter les caractères des Polyastrées, comme on le remarque

dans le *Latimæandra sequana*. Mais la forme primordiale, ce pourquoi l'individu a été créé, le but vers lequel il tend en se développant, sont au fond toujours les mêmes; le polypier simple ne deviendra jamais composé; le polypier fasciculé ne pourra présenter que très-accidentellement l'aspect du Polypier massif, et jamais un polypier gyreux ne pourra se transformer en polypier astréiforme. Nous avons cherché pendant longtemps si nous trouverions un obstacle sérieux dans la forme du Polypier : au mode de division que nous avons adopté et tous les matériaux que nous avons pu réunir ou examiner, tous les Polypiers vivants ou fossiles que nous avons pu étudier, nous ont laissé la conviction profonde que les quatre formes que nous avons décrites, sont des bases certaines de grandes divisions, qui doivent venir immédiatement après les caractères qui constituent les ordres et les sous-ordres parmi les Polypiers.

VI.

DISTRIBUTION MÉTHODIQUE DES POLYPIERS FOSSILES.

La grande classe des Coralliaires se compose d'animaux ayant une bouche centrale entourée de tentacules. Cette bouche, qui sert aussi d'anus, occupe le sommet du corps, qui est creusé en forme de bourse et qui renferme les organes de la génération. Les Coralliaires ne possèdent pas tous un polypier, quelques-uns sont entièrement constitués par un tissu charnu qui ne contient que peu ou point d'éléments calcaires. Les Podactinaires sont dans ce cas et se distinguent des Cnidiaires par des tentacules non tubulaires, disposés par groupes isolés et qui ne communiquent pas avec la cavité viscérale. Ces derniers ont, au contraire, des tentacules tubulaires disposés en couronne et qui communiquent avec la cavité viscérale. Les Cnidiaires, qui ont le plus souvent un Polypier solide, se divisent en deux ordres, les Zoanthaires et les Alcyonaires. Les premiers ont les tentacules simples ou irrégulièrement ramifiés et en nombre croissant avec l'âge; les seconds ont, au contraire, les tentacules pinnés d'une manière très-régulière et toujours au nombre de huit.

Les Zoanthaires à Polypiers ont de nombreux représentants à l'état fossile; ils abondent dans certains étages géologiques et constituent presque à eux seuls des bancs d'une épaisseur considérable et tout à fait analogues aux bancs de coraux qui s'élèvent constamment dans les mers actuelles. Les Alcyonaires se rencontrent plus difficilement à l'état fossile: la nature de leurs parties solides et la délicatesse de leur constitution ont rendu leur conservation plus difficile pendant la formation des roches, et n'ont pu, comme les premiers, résister aux agents destructeurs qui sont venus les attaquer.

CLASSIFICATION DES POLYPIERS FOSSILES

D'APRÈS LA MÉTHODE DICHOTOMIQUE.

Polypes ayant des tentacules simples ou ramifiés irrégulièrement et en nombre variant avec l'âge.	Page
ORDRE I. — ZOANTHAIRES	A 54
Polypes ayant des tentacules pinnés régulièrement et toujours au nombre de huit. ORDRE II. — ALCYONAIRES	75

ORDRE I. — ZOANTHAIRES.

A	{	Polypier vaginal et étoilé.....	B
		Polypier basilaire et phytoïde. Sous-ordre 1. — Z. Cauliculés	55
B	{	Chambres viscérales libres ou subdivisées par des traverses ou des synapticules.....	C
		Chambres viscérales divisées par des planchers....	E
C	{	Appareil cloisonnaire bien développé.....	D
		Appareil cloisonnaire rudimentaire. Sous-ordre VI. — Z. Tubulés	75
D	{	Sclérenchyme compacte. Sous-ordre II. — Z. Apores	55
		Sclérenchyme perforé. Sous-ordre III. — Z. Perforés	66
E	{	Appareil cloisonnaire peu développé et appartenant au type hexaméral. Sous-ordre IV. — Z. Tabulés	68
		Appareil cloisonnaire bien développé et appartenant au type tétraméral. Sous-ordre V. — Z. Rugueux	71

SOUS-ORDRE I. — ZOANTHAIRES CAULICULÉS.

Polyastrées.

I^{re} Famille. — Antipathiens.

Genre fossile unique..... *Leiopathes*. 1

SOUS-ORDRE II. — ZOANTHAIRES APORES.

Monastrées Apores.

	Chambre viscérale libre dans toute la hauteur.....	2
1	{ Chambre viscérale divisée par des traverses ou des synaptiques.....	23
2	{ Cloisons simples.....	3
	{ Cloisons trigéminées. II ^e FAMILLE. — DASMIENS. <i>Dasmia</i> . II	
3	{ Des Palis. III ^e FAMILLE. — CARYOPHYLLIENS.....	4
	{ Point de Palis. IV ^e FAMILLE. — TURBINOLIENS.....	16
III^e Famille. — Caryophylliens.		
4	{ Une seule couronne de palis.....	5
	{ Plusieurs couronnes de palis.....	11
5	{ Muraille plus ou moins élevée et nue.....	6
	{ Muraille horizontale avec une épithèque.....	10
6	{ Une Columelle.....	7
	{ Point de Columelle..... <i>Conocyathus</i> ... III	
7	{ Columelle à surface chioracée et spongieuse.....	8
	{ Columelle à surface papilleuse... <i>Brachycyathus</i> . IV	
8	{ Palis larges.....	9
	{ Palis étroits..... <i>Bathycyathus</i> ... V	
9	{ Côtes simples..... <i>Caryophyllia</i> ... IV	
	{ Côtes principales épineuses..... <i>Acanthocyathus</i> . VII	
10	{ Columelle lamellaire..... <i>Discocyathus</i> ... VIII	
	{ Columelle fasciculaire..... <i>Cyclocyathus</i> ... IX	
11	{ Columelle fasciculaire.....	12
	{ Columelle styloforme..... <i>Stylocyathus</i> ... X	
12	{ Les palis manquant devant le dernier cycle.....	13
	{ Les palis existant devant tous les cycles. <i>Leptocyathus</i> . XI	
13	{ Polypier fixé ou pédicellé.....	14
	{ Polypier toujous libre..... <i>Deltoocyathus</i> . XII	

14	{ Muraille nue	15
	{ Muraille recouverte d'une épithèque. <i>Thecocyathus</i> . XIII	
15	{ Base du Polypier généralement grêle. <i>Trochocyathus</i> . XIV	
	{ Base du Polypier très-large. <i>Paracyathus</i> . XV	

IV^e Famille. — Turbinoliens.

	{ Muraille nue ou garnie d'une épithèque rudimentaire	17
16	{ Muraille entièrement couverte d'une épithèque pelliculaire. <i>Flabellum</i> . XVI	
17	{ Une Columelle.	18
	{ Point de Columelle.	22
18	{ Columelle styliforme. <i>Turbinolia</i> . XVII	
	{ Columelle lamellaire ou fasciculaire.	19
19	{ Columelle lamellaire. <i>Sphenotrochus</i> . XVIII	
	{ Columelle fasciculaire.	20
20	{ Polypier à muraille plus ou moins élevée.	21
	{ Polypier à muraille discoïde. <i>Discotrochus</i> . XIX	
21	{ Base large et sans trace d'adhérence. <i>Platytrochus</i> . XX	
	{ Base étroite et pédicellée. <i>Ceratotrochus</i> . XXI	
22	{ Polypier libre et sans adhérence. <i>Smilotrochus</i> . XXII	
	{ Polypier largement fixé. <i>Desmophyllum</i> . XXIII	
23	{ Chambre viscérale divisée par des traverses.	24
	{ Chambre viscérale divisée par des synapticules.	39
24	{ Cloisons entières et non dentées.	25
	{ Cloisons dentées. VII ^e FAMILLE. — LITHOPHYLLIENS.	36
	{ Epithèque rudimentaire ou nulle. V ^e FAMILLE. —	
25	{ TROCHOSMILIENS	26
	{ Epithèque bien développée. VI ^e FAMILLE. — PLEU-	
	{ ROSMILIENS.	32

V^e Famille. — Trochosmiliens.

26	{ Traverses endothécales très-abondantes.	27
	{ Traverses endothécales rares	30
27	{ Côtes simples.	28
	{ Côtes se ramifiant et s'élevant. <i>Diploctenium</i> . XXIV	
28	{ Une Columelle.	29
	{ Point de Columelle. <i>Trochosmilia</i> . XXV	
29	{ Columelle spongieuse. <i>Cylicosmilia</i> . XXVI	
	{ Columelle lamellaire <i>Placosmilia</i> . XXVII	

30	{ Une Columelle.....	31
	{ Point de Columelle..... <i>Cælosmilia</i> .. XXVIII	
31	{ Columelle spongieuse..... <i>Parasmilia</i> .. XXIV	
	{ Columelle lamellaire..... <i>Lophosmilia</i> . XXX	

VI^e Famille. — Pleurosmilliens.

32	{ Une columelle.....	33
	{ Point de Columelle..... <i>Epismilia</i> . XXXI	
33	{ Columelle plus ou moins libre, mais jamais unie à une grande cloison plus développée que les autres.....	34
	{ Columelle toujours unie à une grande cloison très-développée..... <i>Pleurosmilia</i> . XXXII	
34	{ Columelle styloforme.....	35
	{ Columelle lamellaire..... <i>Peplosmilia</i> . XXXIII	
35	{ Des bourgeons caducs sur le bord calicinal et donnant naissance à de nouveaux Polypiers simples..... <i>Blastosmilia</i> . XXXIV	
	{ Point de bourgeonnement, reproduc- tion par oviparité..... <i>Axosmilia</i> ... XXXX	

VII^e Famille. — Lithophylliens.

36	{ Epithèque rudimentaire ou nulle.....	37
	{ Epithèque membraniforme com- plète..... <i>Montlivaultia</i> . XXXVI	
37	{ Une Columelle.....	38
	{ Point de Columelle..... <i>Leptophyllia</i> . XXXVII	
38	{ Côtes et cloisons épineuses..... <i>Lithophyllia</i> . XXXVIII	
	{ Côtes seulement granulées, cloi- sons lobées..... <i>Circophyllia</i> .. XXXIX	
39	{ Muraille échinulée et poreuse. — VIII ^e FAMILLE. — ANABACIENS.....	40
	{ Muraille ni perforée, ni échinulée. — IX ^e FAMILLE. — CYCLOSÉRINIENS.....	41

VIII^e Famille. — Anabaciens.

40	{ Cloisons peu nombreuses et libres par leur bord interne..... <i>Micrabacia</i> XL
	{ Cloisons nombreuses et soudées par leur bord interne..... <i>Anabacia</i> XLI

IX^e Famille. — Cyclosériniens.

41	{ Une Epithèque plissée.....	42
	{ Point d'Epithèque.....	43
42	{ Cloisons très-nombreuses et anas- tomosées.....	<i>Cyclolites</i> XLII
	{ Cloisons peu nombreuses et libres.	<i>Palæocyclus</i> ... XLIII
43	{ Polypier libre et discoïde.....	<i>Cycloseris</i> XLIV
	{ Polypier adhérent et trochoïde....	<i>Trochoseris</i> XLV

Disastrées Apores.

1	{ Polypières toujours libres dans une grande étendue dans le jeune âge, mais s'empâtant par le déve- loppement du cœnenchyme; les chambres s'oblitérant par leur partie inférieure. — X ^e FAMILLE. — EUHELIIENS.....	2
	{ Polypières toujours libres dans une grande étendue; les chambres ne s'oblitérant jamais.....	4

X^e Famille. — Euhéliens.

2	{ Polypières alternes.....	3
	{ Polypières opposés deux à deux..	<i>Euhelia</i> XLVI
4	{ Cœnenchyme peu abondant, Colu- melle tuberculeuse.....	<i>Enallohelia</i> ... XLVII
	{ Cœnenchyme abondant, Columelle spongieuse.....	<i>Diplohelia</i> XLVIII
4	{ Multiplication par fissiparité.....	5
	{ Multiplication par bourgeonnement.....	16
5	{ Cloisons entières non dentées. — XI ^e FAMILLE. — APLOSMILIENS.....	6
	{ Cloisons dentées ou lobées. — XII ^e FAMILLE. — CALAMOPHYLLIENS.....	7

XI^e Famille. — Aplosmiliens.

6	{ Une Columelle lamellaire.....	<i>Aplosmilia</i> XLIX
	{ Point de Columelle.....	<i>Barysmilia</i> L

XII^e Famille. — Calamophylliens.

7	{	Point d'Epithèque.....	8
		Epithèque bien développée.....	13
8	{	Les côtes épineuses..... <i>Dasyphyllia</i> ...	LI
		Côtes seulement granuleuses.....	9
9	{	Côtes distinctes seulement dans le voisinage du calice..... <i>Aplophyllia</i> ...	LII
		Côtes distinctes sur toute la lon- gueur des polypières.....	10
10	{	Dés collerettes murales..... <i>Calamophyllia</i> ...	LIII
		Point de collerettes murales.....	11
11	{	Des Palis bien développés..... <i>Dactylosmilia</i> ...	LIV
		Point de Palis.....	12
12	{	Columelle spongieuse; le pendicule ne s'accroissant pas..... <i>Rhabdophyllia</i> ...	LV
		Columelle nulle; le pendicule s'ac- croissant avec l'âge..... <i>Baryphyllia</i> ...	LXI
13	{	Type heptaméral; une cloison plus développée que les autres s'éten- dant jusqu'au centre..... <i>Pleurophyllia</i> ...	LVII
		Type hexaméral; cloisons primaires subégales.....	14
14	{	Deux murailles distinctes..... <i>Hymenophyllia</i> ...	LVIII
		Une seule muraille.....	15
15	{	Polypiers généralement gros; cloi- sons nombreuses..... <i>Thecosmilia</i> ...	LIX
		Polypiers généralement petits; cloi- sons peu nombreuses..... <i>Cladophyllia</i> ...	LX
16	{	Bourgeonnement latéral.....	17
		Bourgeonnement basilaire. — XV ^e FAMILLE. — RIZANGIENS.....	23
17	{	Cloisons entières non dentées. — XIII ^e FAMILLE. — STYLOSMILIENS.....	18
		Cloisons dentées. — XIV ^e FAMILLE. — CLADOCORIENS.....	21

XIII^e Famille. — Stylosmiliens.

18	{	Point de Columelle..... <i>Donacosmilia</i> ...	LVI
		Une Columelle.....	19

19	{	Columelle spongieuse.....	<i>Dendrosmilia.</i>	LXII	
		Columelle styloforme.....			20
20	{	Polypières toujours libres: cloi-			
		sons débordantes.....	<i>Stylosmilia..</i>	LXIII	
		Polypières souvent unis; cloisons			
		non débordantes.....	<i>Placophyllia..</i>	LXIV	

XIV^e Famille. — Gladocoriens.

21	{	Point de Palis.....	<i>Goniocora...</i>	LXV	
		Des Palis.....			22
22	{	Murailles peu épaisses et libres dans			
		toute l'étendue des polypières;			
		Epithèque peu développée.....	<i>Cladocora...</i>	LXVI	
		Murailles très-épaisses et soudées			
		aux voisines à la base des poly-			
		pières; point d'Epithèque.....	<i>Pleurocora..</i>	LXVII	

XV^e Famille. — Rizangiens.

23	{	Stolons ne se durcissant pas; poly-			
		pières devenant libres par suite			
		de la fossilisation.....	<i>Cryptangia..</i>	LXVIII	
		Polypières réunis par des solons			
		qui se durcissent.....	<i>Rizangia....</i>	LXIX	

Syrtrastrées Apores.

1	{	Chambres divisées par des traverses			
		lamellaires.....			2
		Chambres divisées par des synapti-			
		cules. — XIX ^e FAMILLE. — COMOSÉRINIENS.....			19
2	{	Cloisons entières et non dentées. —			
		XVI ^e FAMILLE. — EUGYRIENS.....			3
		Cloisons dentées.....			8

XVI^e Famille. — Engyriens.

3	{	Point de Columelle lamellaire.....			1
		Une Columelle lamellaire.....			5
4	{	Polypier formant des lames libres			
		par les côtés.....	<i>Stenogyra...</i>	LXX	
		Polypier dont les vallées sont sou-			
		dées entre elles.....	<i>Eugyra.....</i>	LXXI	

5	Vallées libres par leurs côtés	6
5	Vallées unies par les murailles ou le cœnenchyme	7
6	Lames se contournant, mais ne se bifurquant pas <i>Rhipidogira</i>	LXXII
6	Polypier se bifurquant en branches horizontales <i>Phytogyra</i>	LXXIII
7	Vallées unies par un cœnenchyme granulé <i>Pachygyra</i>	LXXIV
7	Vallées soudées par les murailles . . <i>Dendrogyra</i>	LXXV
	Multiplication par bourgeonnement.	
8	XVII ^e Famille. — Latiméandriens,	
8	Genre unique <i>Latimæandra</i>	LXXVI
	Multiplication par fissiparité. —	
	XVIII ^e Famille. — Symphylliens.	
	XVIII ^e Famille. — Symphylliens.	
9	Centres calicinaux toujours distincts	10
9	Centres tout à fait indistincts	15
10	Séries soudées par les murailles	11
10	Séries réunies par des côtes très- développées <i>Stibastræa</i>	LXXVII
11	Cloisons confluentes et recouvrant les murailles <i>Mæandrastræa</i>	LXXVIII
11	Cloisons non confluentes et ne re- couvrant pas les murailles	12
12	Une Columelle	13
12	Point de Columelle	14
13	Murailles séparées par un sillon; les dents des cloisons décroissant de dehors en dedans <i>Symphyllia</i>	LXXIX
13	Murailles unies en arêtes vives; les dents des cloisons décroissant de dedans en dehors <i>Ulophyllia</i>	LXXV
14	Séries rayonnant du centre à la circonférence; les calices mar- ginaux plus développés que les autres <i>Aspidiscus</i>	LXXXI
14	Séries irrégulières; point de calices marginiaux plus développés que autres <i>Mycetophyllia</i>	LXXXII

15	{ Une Columelle.....	16
	{ Point de Columelle.....	18
16	{ Columelle spongieuse.....	17
	{ Columelle lamellaire..... <i>Leptoria</i> LXXXIII	
17	{ Côtes rudimentaires, murailles sou-	
	dées ou très-rapprochées..... <i>Mæandrina</i> .. LXXVIV	
	{ Côtes bien développées et formant	
	des ambulacres entre les murail ^{es} . <i>Diploria</i> LXXXV	
18	{ Collines murales non interrompues. <i>Stelloria</i> LXXXVI	
	{ Collines murales souvent interrom-	
	pues..... <i>Hydnophora</i> . LXXXVII	
	{ XIX ^e Famille. — Comosériniens.	
19	{ Collines longues et assez contournées. <i>Comoseris</i> . LXXXVIII	
	{ Collines courtes et droites..... <i>Oroseris</i> ... LXXXIX	

Polyastrées Apores.

	{ Chambres divisées par des traverses.....	2
1	{ Chambres divisées par des synapti-	
	cules.....	46
2	{ Multiplication par fissiparité. XX ^e FAMILLE. — FAVIENS.....	3
	{ Multiplication par bourgeonnement.....	5

XX^e Famille. — Faviens.

3	{ Polypiérites unis par les côtes; ca-	
	lices ovalaires..... <i>Favia</i>	XC
	{ Polypiérites soudés par les murail-	
	les; calices polygonaux.....	4
4	{ Des Palis..... <i>Goniastræa</i> ..	XCI
	{ Point de Palis..... <i>Septastræa</i> ..	XCI
5	{ Bourgeonnement latéral ou marginal.....	6
	{ Bourgeonnement basilaire. XVI ^e FAMILLE. — ASTRANGIENS.	43
6	{ Polypiérites unis par un grand dé-	
	veloppement d'un cœnenchyme	
	dermique.....	7
	{ Polypiérites unis par les côtes ou les	
	murailles.....	17

7	{	Chambres s'oblitérant de bas en haut par les progrès de l'âge; cænen- chyme compacte. XXI ^e FAMILLE. — OCULINIENS....	8
	{	Chambres ne s'oblitérant jamais; cænenchyme feuilleté ou spon- gieux. XXII ^e FAMILLE. — STYLOPHORIENS.....	13

XXI^e Famille. — Oculiniens.

8	{	Une Columelle.....	9
	{	Point de Columelle.....	10
9	{	Des Palis..... <i>Oculina</i>	XCIII
	{	Point de Palis.....	10
10	{	Cloisons dentées et confluentes... <i>Synhelia</i>	XCIV
	{	Cloisons entières et non confluentes.....	11
11	{	Polypiers massifs et mamelonnés.. <i>Psammohelia</i> .	XCV
	{	Polypiers branchus, disposés en espaliers..... <i>Prohelia</i>	XCVI
12	{	Cloisons dentées; Polypiers arbo- rescents	<i>Astrohelia</i> ... XCVII
	{	Cloisons entières; Polypiers massifs. <i>Baryhelia</i> ...	XCVIII

XXII^e Famille. — Styloforiens.

13	{	Une Columelle	14
	{	Point de Columelle.....	15
14	{	Calices ne faisant pas saillie à la surface du cænenchyme	<i>Stylophora</i> .. XCIX
	{	Calices en cônes tronqués et costu- lés près du calice.....	<i>Stylohelia</i> ... C
15	{	Cænenchyme spongieux; les der- nières cloisons représentées par des pointes subcristiformes....	<i>Areacis</i> CI
	{	Cænenchyme feuilleté; toutes les cloisons entières.....	16
16	{	Trois cloisons principales seulement. <i>Heterocænia</i> ..	CII
	{	Plus de trois cloisons principales... <i>Elasmocænia</i> .	CIII
17	{	Cloisons entières et non dentées.....	18
	{	Cloisons dentées. XXV ^e FAMILLE. — ASTRÉENS.....	31
18	{	Deux murailles pour les mêmes polypières.....	
	{	XXIII ^e Famille. — Diplocæniens. <i>Diplocænia</i> ..	CIV
	{	Une seule muraille. XXIV ^e FAMILLE. — STYLINIENS.....	19

XXIV^e Famille. — Styliniens.

19	{ Polypiérites unis par les côtes ; calices subcirculaires.....	20
19	{ Polypiérites unis par l'épithèque ou les murailles ; calices subpolygonaux.....	28
20	{ Côtes ne faisant complètement suite aux cloisons et ne cachant pas les murailles	21
20	{ Côtes faisant suite aux cloisons et cachant les murailles par des rayons septo-costaux confluent.....	27
21	{ Une Columelle.....	22
21	{ Pas de Columelle.....	24
22	{ Columelle lamellaire ; calices ovales. <i>Placocænia</i> ...	XV
22	{ Columelle styloforme ; calices ronds.....	23
23	{ Point de Palis..... <i>Stylina</i>	CVI
23	{ Une couronne de Palis..... <i>Columnastræa</i>	CVII
24	{ Cinq cloisons primaires seulement. <i>Pentacænia</i> ...	CVIII
24	{ Plus de cinq cloisons primaires.....	25
25	{ Côtes non confluentes et masquant les murailles..... <i>Convexastræa</i>	CIX
25	{ Côtes confluentes et ne masquant pas les murailles.....	26
26	{ Côtes bien développées ; calices ovales..... <i>Phyllocænia</i>	CX
26	{ Côtes peu développées ; calices ronds. <i>Cryptocænia</i>	CXI
27	{ Une Columelle ; calices épars..... <i>Holocænia</i> ...	CXII
27	{ Pas de Columelle ; calices rangés autour d'un calice central plus développé que les autres. <i>Dimorphocænia</i>	CXIII
28	{ Polypiérites unis seulement par l'épithèque et montrant un sillon entre les murailles ; columelle soudée à une grande cloison... <i>Pleurostylina</i>	CXIV
28	{ Polypiérites intimement unis par les murailles ; pas de grande cloison soudée à la Columelle.....	29
29	{ Point de Columelle..... <i>Aplocænia</i> ...	CXV
29	{ Une Columelle.....	30

- 30 { Des palis et point de colonnes murales *Stephanocænia*. CXVI
 Point de palis; des colonnes aux angles des calices *Stylocænia*.... CXVII

XXV^e Famille. — Astréens.

- 31 { Calices libres entre eux et subcirculaires 32
 Calices soudés par les murailles et polygonaux 38
- 32 { Murailles n'étant pas cachées par des rayons septo-costaux confluent 32
 Murailles cachées par des rayons septo-costaux confluent 36
- 33 { Des palis *Plesiastræa*... CXVIII
 Point de palis 34
- 34 { Calices unis par des côtes bien développées 35
 Calices unis seulement par l'exothèque *Solenastræa*... CXIX
- 35 { Gemmation intercaliculaire *Heliastræa*... CXX
 Gemmation périphérique *Brachyphyllia*. CXXI
- 36 { Un bourrelet indiquant les murailles et une dépression entre ces bourrelets: columelle nulle *Confusastræa*. CXXII
 Point de bourrelets, point de dépression 37
- 37 { Calices épars *Thamnastræa*. CXXIII
 Calices rangés autour d'un parent central plus développé *Dimorphastræa*. CXXIV
- 38 { Murailles soudées dans toute la hauteur des polypierites 39
 Murailles libres inférieurement et soudées seulement près du calice. *Prionastræa*... CXXV
- 39 { Une columelle 41
 Point de columelle 40
- 40 { Cloisons régulières s'unissant au centre *Isastræa*.... CXXVI
 Cloisons irrégulières s'unissant en dehors du centre *Amphiastræa*. CXXVII

- 41 { Columelle papilleuse..... 42
 { Columelle styloforme..... *Astrocænia*.. CXXVIII
 { Cloisons non confluentes; traverses
 42 { rares *Astræa*..... CXXIX
 { Cloisons confluentes; traverses
 { abondantes..... *Pleastræa*.. CXXX

XXVI^e Famille. — Astrangiens.

- { Polypiérites libres dans une petite
 étendue 44
 43 { Polypiérites complètement réunis
 par un cœnenchyme mural feuil-
 leté 45
 44 { Cloisons dentées..... *Astrangia*... CXXXI
 { Cloisons non dentées..... *Phyllangia*.. CXXXII
 45 { Calice horizontal; une columelle.. *Cladangia*.. CXXXIII
 { Calice couché; pas de columelle. *Pleurocænia*. CXXXIV
 { Plateau commun perforé.....
 46 { **XXVII^e Famille. — Génabaciens.** *Genabacia*... CXXXV
 { Plateau commun imperforé..... 47

XXVIII^e Famille. — Cyathosériniens.

- { Calices élevés en dôme au-dessus
 47 { de la surface du polypier..... *Polyphylloseris*. CXXXVI
 { Calices superficiels..... 48
 { Polypier adhérent, en forme de
 coupe évasée..... *Cyathoseris*. CXXXVII
 48 { Polypier formé de lames enroulées
 en cornets..... *Protoseris*. CXXXVIII

SOUS-ORDRE III. — ZOANTHAIRES PERFORÉS.

Monastrées Perforés.

XXIX^e Famille. — Eupsammiens.

- { Polypier trochoïde plus ou moins
 1 { élevé..... 2
 { Polypier discoïde, à muraille hori-
 zontale. *Stephanophyllia*. CXXXIX

2	{	Côtes simples sans appendices costaux.....	3
		Côtes latérales munies d'appendices aliformes.....	<i>Eudopachys</i> . CXL
3	{	Polypier devenant libre.....	<i>Euspammia</i> .. CXLI
		Polypier restant toujours adhérent.	<i>Balanophyllia</i> . CXLII

Disastrées Perforés.

1	{	Cloisons lamellaires, mais perforées.....	2
		Cloisons constituées seulement par des tigelles épineuses.....	
		XXX ^e Famille. — Disaréens. <i>Disaræa</i>	CXLIII

XXXI^e Famille. — Dendrophylliens.

2	{	Multiplication par fissiparité.....	<i>Lobosammia</i> . CXLIV	3
		Multiplication par bourgeonnement.....		
3	{	Bourgeonnement latéral; la dernière cloison plus développée que la pénultième.....	<i>Dendrophyllia</i> . CXLV	
		Bourgeonnement basilaire; la pénultième cloison plus développée que la dernière.....	<i>Stereopsammia</i> . CXLVI	

Syrrastrées Perforés.

XXXII^e Fam. — Latiméandraréens. *Latimeandraræa*. CXLVII

Polyastrées Perforés.

1	{	Cœnenchyme abondant.....	2
		Cœnenchyme rudimentaire. PORITINIENS.....	6
2	{	Deux cloisons opposées, plus fortes que les autres et divisant la loge en deux parties égales.....	
		XXXIII ^e Famille. — Madréporiens. <i>Madrepora</i> ..	CXLVIII
		Six cloisons également développées.....	TURBINARIENS..... 3

XXXIV^e Famille. — Turbinariens.

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| 3 | { | Une columelle..... | 4 |
| | { | Pas de columelle..... | 5 |
| 4 | { | Columelle spongieuse; point de palis. <i>Turbinaria</i> ... | CXLIX |
| | { | Columelle papilleuse; des palis..... <i>Actinacis</i> | CL |
| 5 | { | Polypier massif; cloisons inégales;
cœnenchyme lâche et très-échi-
nulé..... | <i>Astreopora</i> ... CLI |
| | { | Polypier arborescent; cloisons pres-
que égales; cœnenchyme très-
dense et granulé..... | <i>Dendracis</i> ... CLII |

XXXV^e Famille. — Poritiniens.

- | | | | |
|----|---|--|-----------------------------|
| 6 | { | Cloisons rudimentaires ou nulles..... | 7 |
| | { | Cloisons bien développées..... | 9 |
| 7 | { | Columelle fasciculaire; point de palis. <i>Holarœa</i> ... | CLIII |
| | { | Columelle nulle; des palis..... | 8 |
| 8 | { | Point d'épithèque..... | <i>Porites</i> ... CLIV |
| | { | Une épithèque..... | <i>Rhodarœa</i> .. CLV |
| 9 | { | Des colonnes aux angles des calices. <i>Protarœa</i> ... | CLVI |
| | { | Point de colonnes murales..... | 10 |
| 10 | { | Murailles nulles; cloisons confluentes. <i>Microsolena</i> . | CLVII |
| | { | Des murailles; clois. non confluentes..... | 11 |
| 11 | { | Une columelle..... | <i>Litharœa</i> ... CLVIII |
| | { | Pas de columelle..... | <i>Pleurodictyum</i> . CLIX |

SOUS-ORDRE IV. — ZOANTHAIRES TABULÉS.

Monastrées tabulés.

Pas de représentants.

Disastrées tabulés.

XXXVI^e Famille. — Syringoporiens.

- | | | | |
|---|---|--|----------------------------|
| 1 | { | Bourgeonnement latéral; polypié-
rites unis çà et là par des tubes
de connexion..... | <i>Syringopora</i> . CLX |
| | { | Bourgeonnement calicinal; pas de
tubes de connexion..... | <i>Fletcheria</i> ... CLXI |

Syrrastrées tabulés.

XXXVII^e Famille. — Halysitiniens. *Halysites*.... CLXII

Polyastrées tabulés.

1 {	Cœnenchyme abondant.....	2
1 {	Peu ou point de cœnenchyme.....	12
2 {	Cœnenchyme cellulaire ou tubu-	
2 {	laire..... MILLÉPORIENS.....	3
2 {	Cœnenchyme compacte. DENDROPORIENS.....	10

XXXVIII^e Famille. — Milléporiens.

2 {	Une Columelle.....	4
2 {	Point de Columelle.....	5
4 {	Columelle très-forte et fasciculaire. <i>Axopora</i>	CLXIII
4 {	Columelle petite et tuberculeuse... <i>Heliolites</i>	CLXIV
5 {	Cœnenchyme formé de tigelles... <i>Polytremacis</i> .	CLXV
5 {	Cœnenchyme n'étant pas formé de	
5 {	tigelles.....	6
6 {	Cœnenchyme formé de lames ver-	
6 {	ticales ou horizontales.....	7
6 {	Cœnenchyme vésiculaire ou spongieux.....	8
7 {	Cœnenchyme formé de lames ver-	
7 {	ticales qui semblent être la con-	
7 {	tinuation des côtes... <i>Plasmopora</i> .	CLXVI
7 {	Cœnenchyme formé de lames hori-	
7 {	zontales qui paraissent être la con-	
7 {	tinuation des travers ^{ses} exothécales. <i>Propora</i>	CLXVII
8 {	Cœnenchyme spongieux.....	<i>Battersbia</i> .. CLXVIII
8 {	Cœnenchyme vésiculaire.....	9
9 {	Appareil septo-costal rudimentaire. <i>Fistulipora</i> ..	CLXIX
9 {	Appareil septo-costal bien développé. <i>Lyellia</i>	CLXX

XXXIX^e Famille. — Dendroporiens.

10 {	Polypier à branches prismatiques. <i>Rhabdopora</i> ..	CLXXI
10 {	Polypier à branches arrondies.....	11
11 {	Cœnenchyme lisse.....	<i>Dendropora</i> . CLXXII
11 {	Cœnenchyme costulé.....	<i>Trachypora</i> . CLXXIII
12 {	Cloisons rudimentaires ou nulles.....	13
12 {	Cloisons bien développées. THÉCIENS.....	29

13 {	Murailles perforées. FAVOSITINIENS.....	14
	Murailles imperforées	19

XL^e Famille. — Favositiniens.

14 {	Calices obliques sur l'axe des poly-	
	piérites.....	<i>Alveolites..</i> CLXXIV
	Calices perpendiculaires à l'axe des	
	polypiérites	15
15 {	Planchers simples et réguliers.....	16
	Planchers composés et irréguliers.....	18
16 {	Planchers horizontaux.....	17
	Planchers infundibuliformes.....	<i>Ræmeria...</i> CLXXV
17 {	Murailles régulièrement perforées. <i>Favosites..</i>	CLXXVI
	Murailles irrégulièrement perforées. <i>Koninckia..</i>	CLXXVII
18 {	Planchers doubles, les uns horizon-	
	taux, les autres inclinés sur les	
	premiers.....	<i>Emmonsia.</i> CLXXVIII
	Planchers vésiculaires et irréguliers. <i>Michelinia.</i>	CLXXIX
19 {	Murailles plus ou moins soudées	
	ensemble.....	20
	Murailles réunies par des expansions	
	exothécales.. THÉCOSTÉGITINIENS.....	27
20 {	Point de cœnenchyme. CHÆTÉTINIENS.....	21
	Cœnenchyme compacte formé par	
	les murailles... POCILLOPORIENS.....	26

XLI^e Famille. — Chætétiniens.

21 {	Polypier présentant à sa surface des	
	mamelons étoilés.....	<i>Constellaria.</i> CLXXX
	Point de mamelons étoilés.....	22
22 {	Planchers vésiculeux.....	<i>Beaumontia.</i> CLXXXI
	Planchers lamelleux.....	23
23 {	Planchers se correspondant dans	
	tous les Polypiers à la même	
	hauteur.....	<i>Dania.....</i> CLXXXII
	Planchers ne se correspondant pas	34
24 {	Point de cônes ou lobes muraux à la	
	surface du Polypier.	<i>Chætetes..</i> CLXXXIII
	Des cônes ou des lobes muraux à la	
	surface du Polypier.....	25

- 25 { Des cônes sur le bord des calices. *Dekayia*.. CLXXXIV
 { Des lobes sur des murailles inter-
 rompues..... *Labechia*.. CLXXXV

XLII^e Famille. — Pocilloporiens.

- 26 { Calices assez réguliers et radiés... *Pocillopora*. CLXXXVI
 { Calices irréguliers présentant trois
 dents cloisonnaires..... *Cænites*... CLXXXVII

XLIII^e Famille. — Thécostigitiniens.

- 27 { Planchers horizontaux 28
 { Polypiérites en forme d'entonnoirs
 superposés..... *Chonostegites*. CLXXXVIII
 28 { Polypiérites unis par des expan-
 sions murales..... *Thecostegites*. CLXXXIX
 { Polypiérites unis par les côtes ... *Cyathophora*. CLXXXX

XLIV^e Famille. — Théciens.

- 29 { Cloisons non confluentes; murailles
 distinctes *Columnaria*. CXC
 { Cloisons confluentes; murailles in-
 distinctes..... 30
 30 { Cloisons soudées latéralement.... *Thecia*.... CXCI
 { Cloisons non soudées, mais unies
 par des traverses *Clausastræa*. CXCVI

SOUS-ORDRE V. — ZOANTHAIRES RUGUEUX.

Monastrées Rugueux.

XLV^e Famille. — Cystiphylliens.

- 1 { Cloisons rudimentaires *Cystiphyllum*. CXCIV
 { Cloisons bien développées..... 2
 2 { Point de fossettes septales..... 3
 { Une ou plusieurs fossettes septales..... 6
 4 { Une Columelle.... AXOPHYLLIENS 4
 { Point de Columelle. POLYCÆLIENS 5

XLVI^e Famille. — Axophylliens. *Axophyllum*. CXC

XLVII^e Famille. — Polycæliens.

- 5 { Cloisons droites, dont quatre plus
 développées *Polycælia*.... CXCVI

- 5 { Cloisons courbées vers le centre et
subégales..... *Metrosphyllum*. CXCVII
- 6 { Appareil septal irrégulier. ZAPHRENTINIENS..... 7
Appareil septal régulier. CYATHOPHYLLIENS..... 17

XLVIII^e Famille. — Zaphrentiniens.

- 7 { Polypier trochoïde 8
Polypier discoïde..... *Combophyllum*. CXCVIII
- 8 { Une seule fossette septale 9
Plus d'une fossette septale 16
- 9 { Fossette septale libre..... 10
Fossette septale occupée par une cloison..... 14
- 10 { Cloisons allant jusqu'au centre de la
loge..... 11
Cloisons n'allant pas jusqu'au centre. *Amplexus*... CXCIX
- 11 { Cloisons subégales..... 12
Trois cloisons plus développées que
les autres..... 13
- 12 { Cloisons à peu près régulièrement
radiaires *Zaphrentis*.. CC
Cloisons pinnées le long de la fosse^{te}. *Aulacophyllum*. CCI
- 13 { Fossette septale peu prononcée... *Baryphyllum*. CLII
Fossette septale très-développée et
allant jusqu'au centre..... *Anisophyllum*. CCIII
- 14 { Une Columelle cristiforme faisant
suite à la cloison qui occupe le
fond de la fossette..... *Lophophyllum*. CCIV
Point de Columelle..... 15
- 15 { Cloison de la fossette très-grande.. *Hallia*..... CCV
Cloisons de la fossette plus petite
que les autres..... *Trochophyllum*. CCVI
- 16 { 3 fossettes septales, dont 2 petites. *Menophyllum*. CCVII
4 fossettes septales, dont 3 petites. *Hadrophyllum*. CCVIII

XLIX^e Famille. — Cyathophylliens.

- 17 { Deux murailles..... *Aulophyllum*. CCIX
Une seule muraille..... 18
- 18 { Calice rond ou ovale..... 19
Calice quadrangulaire..... *Goniophyllum*. CCX
- 19 { Une Epithèque 20
Point d'Epithèque..... 24

20	{ Des prolongements radiciformes. <i>Omphyma</i> ...	CCXI	
	{ Point de prolongements radicifor ^{més}		22
	{ Cloisons se rencontrant au centre		22
21	{ Cloisons ne se rencontrant pas au centre.		23
	{ Cloisons tordues au centre et simulant une columelle. <i>Cyathophyllum</i> .	CCXII	
22	{ Cloisons non tordues; columelle lamellaire rudimentaire <i>Clisiophyllum</i> .	CCXIII	
	{ Lames horizontales intercloisonnaires soutenues par des traverses		
22	{ verticales <i>Heliophyllum</i> .	CCXIV	
	{ Point de lames intercloisonnaires ni de traverses verticales. <i>Campophyllum</i> :	CCXV	
	{ Polypier composé de cornets emboîtés; muraille interrompue de distance en distance.		25
24	{ Polypier n'étant pas formé de cornets emboîtés; muraille continue. <i>Streptelasma</i> .	CCXVI	
	{ Cloisons tordues au centre. <i>Ptychophyllum</i> .	CCXVII	
25	{ Cloisons non tordues au centre. <i>Chonophyllum</i> .	CCXVIII	

Disastrées Rugueux.

1	{ Point de columelle. ERIDOPHYLLIENS	2
	{ Une columelle	4

L^e Famille. — Eridophylliens.

2	{ Côtes et exothèque bien développées <i>Pachyphyllum</i> .	CCXIX
	{ Côtes et exothèque rudimentaires.	2
	{ Cloisons allant jusqu'au centre du calice <i>Disphyllum</i> .	CCXX
3	{ Cloisons n'atteignant jamais le centre du calice. <i>Eridophyllum</i> .	CCXXI
	{ Une seule muraille. <i>Diphyphyllum</i> .	CCXXII
4	{ Deux murailles distinctes.	

LI^e Famille. — Lonsdaliens... *Lonsdalia*... CCXXIII

Syrrastrées Rugueux.

Pas de représentants.

Polyastrées Rugueux.

1	{ Cloisons présentant quatre systèmes bien séparés par quatre cloisons plus développées que les autres et formant une croix par leur union.....	STAURIENS	2
	{ Cloisons subégales ne formant pas de croix au centre.....		3

LII^e Famille. — Stauriens.

2	{ Polypiérites unis par les murailles. <i>Stauria</i>	CCXXIV	
	{ Polypiérites unis par les côtes....	<i>Holocystis</i> ..	CCXXV
	{ Columelle nulle..	ACERVULARIENS	4
3	{ Columelle plus ou moins développée.....	STYLAXINIENS	9

LIII^e Famille. — Acervulariens.

4	{ Une seule muraille.....		5
	{ Deux murailles distinctes		7
5	{ Polypiérites soudés par les murailles.....		6
	{ Polypiérites unis par des côtes confluentes.....	<i>Smithia</i>	CCXXVI
6	{ Cloisons droites et bien développées.....	<i>Polyphyllum</i> .	CCXXVII
	{ Cloisons flexueuses et peu développées.....	<i>Spongophyllum</i> .	CCXXVIII
7	{ Epithèque bien développée.....		8
	{ Epithèque nulle.....	<i>Endophyllum</i> .	CCXXIX
8	{ Planchers peu développés et à peu près horizontaux.....	<i>Acervularia</i> .	CCXXX
	{ Planchers très-développés et infundibuliformes	<i>Strombodes</i> .	CCXXXI

LIV^e Famille. — Stylaxiniens.

9	{ Columelle styloforme.....		10
	{ Columelle lamellaire ou fasciculaire.....		12
10	{ Polypiérites unis par les murailles. <i>Lithostrotion</i> .	CCXXXII	
	{ Polypiérites unis par les côtes.....		11
	{ Calices subplanes. Columelle bien développée.....	<i>Phillipsastræa</i> .	CCXXXIII
11	{ Calices saillants, Columelle petite. <i>Syringophyllum</i> .	CCXXXIV	

- | | | | | |
|----|---|---|------------------------------|----|
| 12 | { | Columelle fasciculaire..... | <i>Stylophyllum</i> . CCXXXV | 31 |
| | | Columelle lamellaire..... | | |
| 13 | { | Planchers bien développés et bombés au centre..... | <i>Chonaxis</i> ... CCXXXVI | |
| | | Planchers peu développés et sensiblement horizontaux..... | <i>Stylaxis</i> ... CCXXXVII | |

SOUS-ORDRE VI. — ZOANTHAIRES TUBULÉS.

Monastrées Tubulés.

LV^e Famille. — Pyrgiens.. *Pyrgia*... CCXXXVIII

Disastrées Tubulés.

LVI^e Famille. — Auloporiens.. *Aulopora*.. CCXXXIX

Syrrastrées et Polyastrées Tubulés.

Pas de représentants.

ORDRE II. — ALCYONAIRES.

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1 | { | Alcyonaire ayant un axe calcaire adhérent..... | 2 |
| | | Alcyonaire ayant un axe calcaire libre | 5 |
| 2 | { | Axe composé de cylindres calcaires séparés par des rondelles de tissu corné ou subéreux qui disparaît par la fossilisation. | 3 |
| | | Axe sclérobasiq.ue entièrement homogène et calcaire..... | 4 |

LVII^e Famille. — Isidiens.

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------|
| 3 | { | Bourgeons naissant sur les tiges calcaires | <i>Isis</i> CCXL |
| | | Bourgeons naissant sur les rondelles cornées..... | <i>Mopsea</i> CCXLI |

4 LVIII^e Famille. — Coralliens.. *Corallium*.. CCXLII

LIX^e Famille. — Pennatuléens.

- | | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| 5 | { | Des polypes de chaque côté de la tige. <i>Virgularia</i> .. | CCXLIII |
| | | Des polypes d'un seul côté..... | <i>Pavonaria</i> .. CCXLIV |

ORDRE I. — ZOANTHAIRES.

SOUS-ORDRE I. — ZOANTHAIRES CAULICULÉS.

Polypier basilaire et phytoïde, constitué par une sécrétion épidermique. Loges des polypes creusées dans un cœnenchyme cortical très-friable et qui disparaît entièrement sous l'influence de la fossilisation. Ces êtres rentrent tous dans la section des Polyastres.

I^{re} Famille. — Antipathiens.

ANTIPATHIENS, Milne-Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. 1, p. 313, 1857.

Polypier ayant la bouche entourée de six tentacules simples, ce qui les distingue des Alcyonaires qui ont toujours huit tentacules bipinnés.

GENRE I. — LEIOPATHES.

Antipathes (pars), Esper, *Die Pflanzenth.*, Nuremberg, 1791-1797.

— Lamarck, *Hist. des anim. sans vert.*, 1816.

Leiopathes, Gray, *Cat. de la coll. zooph. du mus. brit.*

— Milne-Edwards et H., *Distr. méth. des Pol.*, 1850.

L'axe sclérobasique est rameux, rugueux et granulé; le cœnenchyme renferme des filaments siliceux.

LEIOPATHES VETUSTA. — *Antipathes vetusta*, Michelotti, *Spicil. zooph. dil.*, p. 43. — Michelin, *Iconog. Zooph.*, p. 77, pl. 15, fig. 11. — *Leiopathes vetusta*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des Coral.*, t. 1, p. 323. — *Falunien* : Piémont, Turin.

SOUS-ORDRE II. — ZOANTHAIRES APORES.

Polypiers présentant des murailles complètes, non perforées et des cloisons bien développées. Le sclérenchyme qui compose les différents organes donne lieu à un tissu compacte qui n'existe plus dans les Zoanthaires Poreux, mais qui se retrouve dans les Zoanthaires Tabulés, Tubulés et Rugueux. Les Zoanthaires Apires ont un calice toujours bien étoilé, les cloisons principales ne se montrent jamais au nombre de 4 seulement, et il n'existe pas de planchers dans la hauteur des loges.

Monastrées Apores.

1^{re} Tribu. — Turbinoliacées.

Caryophylliacées, Trochocyathacées et Turbinoliacées, Edwards et Haime, *Hist. nat. des Coral.*, 1856.

Polypier ayant la loge ouverte dans toute sa hauteur et ne contenant ni traverses ni synaptiques.

II^e Famille. — Dasmies.

PSEUDOTURBINOLIDÆ, Edwards et Haime, 1850; DASMIDES, *id.*, *id.*, 1856.

Polypier ayant des cloisons formées par 3 lames distinctes, mais réunies par leur bord externe.

GENRE II. — DASMIA.

Dasmia, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, t. IX, p. 328, 1848.

Dasmia, Ed. de Fromentel, *Pol. foss. de l'Etage Néocomien*, p. 14, 1857.

Polypier discoïde ou turbiné et pédicellé; muraille nue et couverte de côtes larges; cloisons trigémées.

1. D. SOWERBYI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 7, fig. 8. — *Brit. foss. corals*, p. 25, pl. 4, fig. 4. — *Hist. nat. des Coral.*, p. 101. — *Desmophyllum*, Sowerby, *trans. of the Geol. soc. of London*, t. V, p. 136, pl. 8, fig. 1, 1834.

Polyp. turbiné et peu comprimé; calice large de 8 mil. sur 7. — 12 grosses côtes et 6 plus petites. — *Parisien*: Highgate, Clarendon-Hill.

2. D. NECOMIENSIS, E. de Fromentel, *Description des Pol. foss. de l'Etage néocomien*, p. 14, pl. 1, fig. 1-2, 1857.

Polypier discoïde; calice large 20 mil. sur 15; trois cycles complets, les cloisons des deux premiers cycles égales entre elles. *Néocomien*: Saint Dizier.

III^e Famille. — Caryophylliens.

CARYOPHYLLIENS (*pars*), Edw. et H., *Hist. nat. des Coral.*, 1856.

Polypiers possédant une ou plusieurs couronnes de Palis.

GENRE III. — CONOCYATHUS.

Conocyathus, d'Orbigny, *Note sur les Pol. foss.* p. 5, 1849.

Polypier simple, trochoïde et libre; côtes lamellaires; cloisons débordantes; point de columelle; des palis devant les cloisons de l'avant-dernier cycle.

C. SULCATUS, d'Orbigny, in Milne-Edwards et J. Haime, *Pol. fos. des terr. paléoz.*, 1851. — D'Orbigny, *Prod.*, 1852.

Polyp. turbiné, allongé; calice large de 5 à 7 mill.; 3 cycles de cloisons, 6 palis devant les cloisons du 2^e ordre. — *Falunien*: Mayence.

GENRE IV. — BRACHYCYATHUS.

Brachyacyathus, Milne-Edwards et J. Haime, *Ann. des sc. nat.*, t. IX, p. 295, 1848.

Polypier très-court et libre; calice superficiel et circulaire; columelle papilleuse, cloisons courtes, débordantes; palis très-développés.

B. ORBIGNYANUS, Milne-Edwards et J. Haime, *loc. cit.*, p. 276, pl. 9, fig. 6.

Polypier très-court, haut de 6 mil.; calice large de 15 mil.; columelle bien développée et papilleuse; 4 cycles de cloisons, celles des deux premiers ordres égales; palis larges et épais devant les cloisons du 3^e ordre. — Néocomien : Saint-Julien-Beauchêne.

GENRE V. — BATHYCYATHUS.

Bathyacyathus, Milne-Edwards et J. Haime, *loc. cit.*, p. 294, 1848.

Polypier largement fixé et élevé; côtes fines et simples; calice elliptique et profond; columelle chicoracée et peu développée; cloisons débordantes et étroites; palis élevés.

B. SOWERBYI, Milne-Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Brit. fos. corals.*, p. 64, pl. 11, fig. 2, 1858. — Polypier trochoïde largement fixé; calice comprimé large de 20 mill. sur 12; 48 cloisons inégales, épaisses et débordantes; palis étroits. — Cénomanien : Kidge (Wiltshire).

GENRE VI. — CARYOPHYLLIA.

Caryophyllia (pars), Lamarck, *Syst. des anim. sans vert.*, 1816.

Galaxea (pars), Oken, *Lehrb. der nat.*, 1815.

Anthophyllum (pars), Schweigger, *Handb. der Naturg.*, 1820.

Caryophyllia, Stokes, *Zool. journ.*, 1828.

Cyathina, Ehrenberg, *Corall. des rot. meer*, 1834. — Dana, 1846. — Milne-Edwards et Haime, 1848. — *Cyathina* et *Amblocyathus*, d'Orbigny, 1849.

Caryophyllia, Milne-Edwards et J. Haime, *Hist. nat. des Coral.*, t. II, p. 11, 1856.

Polypier turbiné, adhérent par une base étalée; calice circulaire et peu profond; columelle chicoracée, formée de tigelles tordues; cloisons larges et débordantes; côtes simples; palis entiers, larges et libres dans une certaine étendue.

1 C. CLAVUS, Scacchi, 1835. — *Cyathina turbinata*, Philippi, 1836. — *Caryophyllia pseudoturbiniolia*, Michelin, *Icon.*, pl. 9, fig. 18, 1841. — *Cyathina Cyathus*, Leuckart, 1841. — *Cyathina pseudoturbiniolia*, Edwards et Haime, *Ann. des sc.*, *loc. cit.*, pl. 9, fig. 1. — *Cyathina clavus*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. paléoz.*, 1857. — *Caryophyllia Clavus*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des Coral.*, 1856. — Polypier trochoïde haut de 30 mill.; calice ovale large de 22 mill. sur 18; columelle forte, allongée; palis bien développés au nombre de 18; 5 cycles de cloisons. — Falunien : Turin (Piémont). Habite encore la Méditerranée.

2. *C. ARCUATA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1849. = Polypier en cône courbé; 48 côtes; 4 cycles cloisonnaires; palis peu épais; hauteur du polypier, 50 mill., largeur du calice, 23. — Castel arquato.

3. *C. GUADULPENSIS*. *Cyathina Guadulpensis*, Edwards et Haime, *Ann. des sc.*, 1849. — *Turbinolia dentalus*, Ducassaing, *Anim. radiaires des Antilles*, 1850. = Polypier cylindroïde, peu courbé, haut de 30 millim.; columelle sérialaire; 4 cycles; palis larges et arrondis; diamètre du calice, 18 mill. sur 16. — Fossile des sables volcaniques de la Guadeloupe. Tuf Blanc.

4. *C. SISMONDAI*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des Coral.*, p. 17, t. II. — *Turbinolia clarus*, Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 14, 1841 (non Lamarck et Michelotti). — Polypier trochoïde un peu courbé et haut de 35 mill.; côtes distinctes seulement près du calice, celui-ci est peu profond, subcirculaire et large de 20 millim; 4 cycles cloisonnaires. — *Falunien* : Turin (Piémont).

5. *C. KONINCKI*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des Coral.*, p. 17, 1856. — *Cyathina*, *id.*, ann. 1848. = Polypier turbiné, droit et haut de 13 mill.; calice large de 7 mill. et profond de 3; columelle fasciculaire; 4 cycles; les cloisons primaires et secondaires subégales. — *Sénonien* : Maëstricht, Ciply.

6. *C. CYLINDRICA*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des Coral.*, p. 17, 1856. — Polypier droit et court; calice circulaire; columelle petite; des palis devant les cloisons du 2^e ordre; 4 cycles complets. — *Sénonien* : Maëstricht.

7. *C. BREDAI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 18, 1856. = Polypier courbé; columelle presque rudimentaire. 4 cycles de cloisons; Palis situés devant les secondaires et un peu sinueux. — *Sénonien* : Maëstricht.

8. *C. DEBEYANA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier allongé, cylindrique, peu courbé; 4 cycles de cloisons, les 1^{res} et les 2^{es} subégales; palis très-étroits. — *Sénonien* : Aix-la-Chapelle.

9. *C. BOWERBANCKI*, Edwards et Haime. *loc. cit.* — *Cyathina*, *id.*, *Brit. foss. corals*, pl. 11, fig. 1. — *Ambloryathus*, *id.*, d'Orbigny, *Prod.*, p. 143. t. II, 1850. = Polypier turbiné, un peu courbé et haut de 18 millim.; calice rond et large de 7 à 8 millim.; 4 cycles complets, les 1^{re} et 2^e subégaux; palis bien développés et placés devant le 3^e. — *Albien* : Folkstone.

10. *C. CYLINDRACEA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Cyathina cylindracea et lævigata*, *Brit. foss. coral.*, pl. 9, fig. 1. — *Cyathina*, *id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier allongé, trochoïde, long de 30 à 40 millim.; calice rond et large de 8 à 12 millim.; 4 cycles incomplets; cloisons minces; palis épais; columelle bien développée. — *Sénonien* : Dinton, Nehou, Bilin.

GENRE VII. — ACANTHOCYATHUS.

Acanthocyathus, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 292, 1848.

Polypier libre ou subpédicellé; côtes formées de crêtes saillantes ou garnies d'épines; columelle bien développée; palis larges et égaux; cloisons débordantes.

1. *A. HASTINGSÆ*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier trochoïde haut de 35 à 38 millim.; calice ovale, large de 30 mill. sur 22; les six côtes principales garnies de tubercules épineux. — *Falunien* : Malte.

GENRE VIII. — DISCOCYATHUS.

Discocyathus, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 296, 1848.

Polypier libre et discoïde; calice circulaire et légèrement convexe; columelle lamellaire à bord entier et droit; palis bien développés et libres; cloisons très-débordantes; muraille horizontale couverte d'une épithèque plissée concentriquement.

D. EUDESI, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Cyclolites Eudésii*, Michelin. *Icon.*, pl. 2, fig. 8, 1848. = Cinq cycles de cloisons; 12 palis larges; hauteur du polypier. 6 mill., diamètre de la muraille, 12, du calice, 16. — *Bajocien* : Bayeux, Port-en-Bessin (Calvados), Burton, etc.

GENRE IX. — CYCLOCYATHUS.

Cyclocyathus, Edwards et Haime, *Brit. foss. coral. introd.*, p. 14, 1850.

Polypier libre et discoïde; calice convexe à la circonférence, concave au centre; columelle fasciculaire bien développée; cloisons élevées et granulées; palis bien séparés des cloisons; muraille horizontale et couverte d'une épithèque pelliculaire.

C. FITTONI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 63, pl. 11, fig. 3, 1850. = Polypier discoïde, large de 13 mill. à la base; de 15 près du calice et haut de 6 mill.; columelle large; 4 cycles complets. — *Albien* : Drayton, Cambridge, etc.

GENRE X. — STYLOCYATHUS.

Stylocyathus, d'Orbigny, *Note sur les Pol. foss.*, p. 5, 1849.

Polypier subturbiné et libre; columelle lamellaire; cloisons débordantes; palis bien développés; épithèque pelliculaire s'élevant jusqu'au bord du calice.

S. DENTALINUS (DENTALINA), d'Orbigny, *Prod.*, t. II, p. 181, 1851. = Polypier en cône allongé; calice elliptique; 4 cycles complets; cloisons alternativement inégales en épaisseur. — *Cénomaniens* : Le Mans.

GENRE XI. — LEPTOCYATHUS.

Leptocyathus, Edwards et Haime, *Brit. fos. corals*, p. 14, 1850.

Polypier court, subdiscoïde et libre; côtes simples et bien développés; columelle papilleuse; cloisons serrées et débordantes; palis dentelés. Épithèque nulle.

1. L. ELEGANS, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 21, pl. 3, fig. 6, 1850. = Polypier subdiscoïde, haut de 3 mill.; calice rond, large de 9 à 10 millim.; 4 cycles cloisonn. complets. — *Parisien* : Haverstock-Hill.

2. L. ATALAYENSIS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des Ter. pal.*, 1851. — *Turbinolia et Trochocyathus atalayensis*, d'Archiac, 1847-1849. — Polypier discoïde; côtes peu marquées; 5 cycles de cloisons, les primaires et les secondaires subégales. — *Parisien* : Biarritz.

GENRE XII. — DELTOCYATHUS.

Deltocyathus, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, t. X, p. 325, 1848.

Polypier conique, court et libre; calice circulaire et subplane; columelle subdivisée; palis très-développés, ceux du pénultième cycle inclinés sur les précédents; cloisons peu débordantes; côtes bien développées et visibles depuis la base. Point d'épithèque.

D. ITALICUS, Edwards et Haime; *loc. cit.*, pl. 10, fig. 11. — *Stephanophyllia italica*, Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 3, 1848. = Polypier trochoïde haut de 6 millim. et large de 10; columelle formée de 3 tigelles placées en série; palis épais et unis deux à deux au centre; 4 cycles complets; côtes inégales et granuleuses. — *Falunien*: Tortone.

GENRE XIII. — THECOCYATHUS.

Thecocyathus, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 317, 1848.

Cyathophyllum, Goldfuss, *Petref. Germ.*, t. I, p. 56, 1826.

Polypier court, droit, fixé dans le jeune âge, mais devenant libre plus tard; épithèque complète et débordante; calice circulaire et plane; columelle fasciculaire; palis lobés et faisant suite aux tigelles columellaires.

1. T. TINTINNABULUM, Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1848. — *Cyathophyllum*, *id.*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 16, fig. 6, 1829. = Polypier turbiné, haut de 5 à 6 millim.; calice large de 5 mill.; 3 cycles de cloisons; épithèque épaisse et complète. — *Toarcien*: Mendes, Banz, etc.

2. T. MOOREI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 30, fig. 6, 1851. = Polypier adhérent, trochoïde, haut de 8 à 9 millim.; calice rond et large de 7 millim.; 4 cycles complets, palis des deux premiers cycles petits, ceux du troisième, épais et bilobés; columelle trabiculaire; épithèque mince. — *Toarcien*: Ilmenster.

3. T. MACTRA, Edwards et Haime, *loc. cit.*, — *Cyathophyllum mactra*, Goldfuss, *loc. cit.*, pl. 16, fig. 8. = Polypier court, subdiscoïde et haut de 3 à 4 millim.; calice rond, superficiel et large de 16 millim.; 4 cycles complets; palis étroits et épais. — *Toarcien*: Avallon, Besançon, Banz, Mussy, Tuchau, etc.

4. T. ? GROSGOGENTI. Polypier conique, très-court, calice circulaire assez profond; cloisons très-débordantes et formant un bourrelet au-dessus de l'épithèque qui est épaisse, plissée et présente des saillies correspondant aux côtes; columelle fasciculée assez étroite; palis larges et bien développés; 4 cycles complets; cloisons inégales selon les ordres, les primaires étant beaucoup plus développées que les autres. — *Oxfordien*: Saint-Claude (communiqué par M. Etallon).

GENRE XIV. — TROCHOCYATHUS.

Turbinolia (pars), Goldfuss, *Petref. Germ.*, t. I, p. 62, 1826.

Turbinolia, Michelin, *Icon. Zooph.*, p. 40, 1840.

Trochocyathus, Edwards et J. Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 300, 1848.

Trochocyathus et *Aplocyathus*, d'Orbigny, *Note sur les Pol. fol.*, p. 5, 1849.

Polypier adhérent ou libre; calice subcirculaire; columelle formée de tigelles prismatiques tordues en faisceaux ou disposées en séries; cloisons débordantes, larges; palis bien développés, libres dans une grande étendue et placés devant tous les cycles qui précèdent le dernier; muraille nue et costulée. Type hexaméral.

1. TROCHOCYATHI STRIATI (Edw. et H.)

a. 3 Cycles complets et des cloisons du quatrième.

1. T. SISMONDAI, Edwards et Haime, *Ann. des sc., loc. cit.*, pl. 10, fig. 4. — *Aplocyathus*, *id.*, d'Orbigny, *Prod.*, t. III, p. 145, 1852. — Polypier trochoïde, libre, un peu courbé, haut de 10 millim.; calice large de 11 à 12 millim.; 3 cycles et le commencement du 4^e dans 2 des systèmes.; les cloisons primaires plus développées que les autres. — *Falunien* : Turin.

2. T. CUPULA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, p. 64, 1849, — *Turbinolia Cupula*, Al. Rouault, *Mém. de la Soc. géol.*, 2^e série, t. III, p. 461, pl. 14, fig. 3, 1849. — Polypier droit, court et largement fixé; 3 cycles et des cloisons du 4^e dans la moitié de 3 des systèmes. — *Parisien* : Bos d'Arros, Lacken.

b. 4 Cycles complets; Polypier arqué.

3. T. MITRATUS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 21, 1851. — *T. mitratus et plicatus*, *id.*, *id.* *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 303. — *Turbinolia mitrata*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 15, fig. 5. — *Id.*, *id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 9, fig. 2^b. — Pol. comprimé, trochoïde, arqué et haut de 20 m.; calice large de 15 mill. sur 11; palis de la 2^e couronne plus développés que ceux de la première; columelle sérialaire. — *Falunien* : Tortone.

4. T. CRASSUS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 304, 1848. — *Turbinolia plicata*, Michelin, *Icon.*, pl. 9, fig. 2, 1841. — Cette espèce diffère de la précédente par sa forme trapue et ses cloisons plus minces. Hauteur 25 mill., grand axe 20, petit 15. — *Falunien* : Tortone.

5. T. SIMPLEX, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 308. — Plus courte et plus grêle que les précédentes, cette espèce a des palis aussi épais que les cloisons qui sont assez épaisses elles-mêmes. Hauteur 10 mill., largeur 13 sur 10. — *Falunien* : Tortone.

6. T. COSTULATUS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — Côtes cristiformes près du calice, les côtes latérales très-développées. Hauteur 20 millim., grand axe 17, petit 14. — *Falunien* : Tortone.

7. T. ELONGATUS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — Columelle formée de tigelles tordues; palis inégaux, les 1^{ers} et 2^{es} subégaux, les 3^{es} larges et rapprochés du centre. Hauteur 35 mill., grand axe 13, petit 10. — *Parisien* : Quartier-du-Vit, près Castellane.

8. T. GRANULATUS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 21, 1851. — *Turbinolia granulata*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 37, fig. 20, 1829. — Côtes très-granulées et distinctes depuis la base. Hauteur 10 mill.; diamètre du calice 6 millim. — *Falunien* : Bunde (Westphalie).

9. T. KONINCKI, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 305, 1848. — Une épithèque bien développée à la base; palis larges et épais.

Hauteur 13 à 15 millim.; grand axe 6, petit 5. — *Cénomanien* : Obourg, près Mons.

10. *T. GRACILIS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* == Polypier grêle, allongé, columelle formée par 3 ou 4 petites tigelles en série. Hauteur 13 millim., grand axe 5, petit 4. — *Cénomanien* : Le Mans.

c. 4 Cycles complets; Polypier droit et conique.

11. *T. CONULUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 306. — *Turbinolia conulus*, Michelin, *Icon.*, pl. 1, fig. 12. — *Aplocyathus*, *id.*, d'Orbigny, *Prod.* == Polypier souvent pédicellé et quelquefois courbe; calice rond. Hauteur 14 mill., largeur du calice 10, profondeur 2. — *Albien* : Cambridge, Speeton, Estrépy (Marne), Perte-du-Rhône, etc.

d. 4 Cycles complets; Polypier court, subdiscoïde.

12. *T. HARVEYANUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 314. — *Aplocyathus*, *id.*, d'Orbigny, *Prod.* == 12 côtes (1^{re} et 2^e) bien développées; calice rond; palis minces. Hauteur 5 mill., diamètre du calice 18. — *Albien* : Folkstone.

13. *T. MAGNEVILLEANUS*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 26, fig. 1, 1851. — *Turbinolia Magnevilleana*, Michelin, *Icon.*, pl. 2, fig. 2. — *Aplocyathus Magnevilleanus*, d'Orbigny, *Prod.* == Polyp. hémisphérique; haut. 6 mill.; diamètre du calice 8. — *Bajocien* : Bayeux, Dorsetshire.

14. *T. MICHELLINI*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 314, 1848. — Pol. discoïde; columelle formée de 3 tubercules comprimés en série; cloisons débordantes, Haut. 4 mill.; diam. du cal., 7 ou 8 mill. — *Oxfordien* : Etrochey (Côte-d'Or).

15. *T. TERQUEMI*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 32, 1856. == Polyp. discoïde ou cylindroïde, très-court; côtes granulées et striées en travers; palis inégaux. Hauteur 2, 6 ou 8 millim., diam. 8. — Bouches-du-Rhône (marnes bleues).

e. 4 Cycles et le commencement d'un cinquième.

16. *T. BELLINGERIANUS*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 307. — *Turbinolia Bellingheriana*, Michelin, *Icon.*, pl. 9, fig. 3. == Pol. un peu courbé; calice elliptique. Le cinquième cycle manque dans deux des systèmes (peut-être ce fossile appartient-il au type Pentaméral). Hauteur 30 mill., grand axe 18, petit 15. — *Falunien* : Tortone, Grenade (Espagne).

17. *T. ALPINUS*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 25, 1851. — *Turbinolia alpina*, Michelin, *Icon.*, pl. 61, fig. 6. — Pol. bilobé; côtes inégales. Hauteur, 25 millim.; diam. du cal., 25 sur 21 mill. — *Parisien* : La Palarea.

18. *T. IMPARIPARTITUS*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 307, 1848. — Pol. voisin du *T. costulatus*; il en diffère par son nombre plus grand de cloisons et ses côtes inégales. — *Falunien* : Tortone.

f. 5 Cycles complets.

19. *T. BURNESI*, J. Haime, in d'Archiac, *Hist. des prog. de la Géol.*, p. 220, 1850. — D'Archiac et J. Haime, *Anim. foss. de l'Inde*, pl. 12, fig. 2, 1853. — Pol. court, à surface inférieure convexe; calice circulaire et creux; columelle peu développée; palis courts et bilobés. — *Parisien* : Chaîne d'Hala (Inde).

20. *T. LINEATUS*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 23, 1851.

— *Turbinolia lineata*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 37, fig. 18. = Polypier allongé et courbé à la base; côtes granulées. Haut., 25 mill.; diam du cal., 23 sur 20. — *Parisien* : Saltzbourg, etc.

.g. 6 Cycles de cloisons.

21. T. SINUOSUS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 314. — *Turbinolia turbinata*, Lamarck, 1816. — *Turbinolia sinuosa*, Brogniart, 1823. — Bronn, 1825 et 1838. — Leymerie, 1848. — Michelin, *Icon.*, pl. 63, fig. 1, 1846. = Polypier trochoïde, comprimé; calice irrégulier, à bord ondulé; cloisons serrées et minces; palis larges et minces. Hauteur, 20 à 30 millim. et jusqu'à un décim.; les diamètres du calice varient suivant la hauteur. — *Parisien* : La Palarea, Corbières, etc.

22. T. CYCLOLITOIDES, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 315. — *Turbinolia*, id., Michelin, *Icon.*, pl. 61, fig. 9. — *Aplocyathus*, id., d'Orbigny, *Prod.*, 1851. = Polyp. convexe en dessous; calice circulaire. Hauteur moyenne, 13 à 15 mill.; diamètre du calice, 30. — *Parisien* : La Palarea, Annot, Sinde.

23. T. DOUGLASI, Edwards et Haime. *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 23, 1851. — *Turbinolia Douglasi*, Michelotti, *Foss. des terr. mioc. de l'Italie*, pl. 1, fig. 20, 1847. = Polypier voisin du *T. sinuosus*, mais moins comprimé et plus arrondi sur les côtés; base recourbée dans le sens du petit axe. — *Falunien* : Tortone.

24. T.? VAN-DEN-HECKE, Edwards et Haime, in d'Archiac, *Hist. des progrès de la géol.*, p. 227, 1850. — *Turbinolia bilobata*, Michelin, *Icon.*, pl. 61, fig. 7 (non pl. 62, fig. 1), 1846. = Espèce voisine de la précédente, mais plus trapue. Côtes alternativement grosses et petites. Haut., 25 mill., calice large de 40 mill. sur 10 ou 15 mill. — *Parisien* : La Palarea, Sinde.

2. TROCHOCIATHI ARMIGERI

a. Polypier élevé; 3 cycles et le commencement du 4^e.

25. T. CORNUCOPIA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 312, 1848. — *Turbinolia*, id., Michelotti, 1838-1847. — Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 16, 1841. = Polypier allongé et courbé; 12 côtes saillantes; calice ovalaire large de 10 à 12 millim. Hauteur du polypier, 40 mill. — *Falunien* : Tortone.

26. T. SUBUNDOSUS, d'Archiac, *Mém. de la soc. géol. de France*, 2^e série, t. III, p. 402, pl. 8, fig. 4, 1849. = Pol. allongé, comprimé et courbé à la base dans le sens du petit axe; côtes fortes, ondulées, subcristiformes; 42 cloisons épaisses et serrées. — *Parisien* : Biaritz.

b. Polypier élevé; 4 cycles complets.

27. T. PYRENAICUS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 311. — *Flabellum pyrenaicum*, Michelin, *Icon.*, pl. 63, fig. 2, 1846. — *Turbinolia calcar*, d'Archiac, *loc. cit.*, pl. 5, fig. 1-2-3, 1846. — Pol. courbé à la base; côtes inégales, celle de la grande courbure munie de crêtes anguleuses et saillantes. Haut., 30 millim.; diam. du calice, 15 à 18 millim. — *Parisien* : Biaritz, Annot.

28. T. VERRUCOSUS, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 311. = Pol. courbé à la base et présentant sur ses faces des verrues espacées; calice elliptique large de 15 mill. sur 10. Hauteur, 25 à 28 millim. — *Falunien* : Vienne.

29. *T. UNDULATUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 312. — *Turbinolia undulata*, Michelin, *Icon.*, pl. 9, fig. 4 — *Aplocyathus*, *id.*, d'Orbigny, *Prod.* — Polypier courbé à la base; 12 côtes munies de petites crêtes, les autres peu saillantes; palis plus larges que les cloisons. Hauteur, 25 mill.; diam. du calice, 12 à 15 mill. — *Falunien* : Tortone.

30. *T. HAIMEI*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 22, 1851. — *Turbinolia*, *id.*, Al. Rouault, *Mém. de la soc. géol. de France, loc. cit.*, pl. 14, fig. 3, 1849. — Polypier comprimé, arqué dans le sens du petit axe; côtes lamellaires et tranchantes dont 12 plus développées; calice elliptique. — *Parisien* : Bos-d'Arros.

c. *Polypier élevé; 4 Cycles complets et le commencement du 5°.*

31. *T. VERSICOSTATUS*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 308. — *Turbinolia versicostata*, Michelin, *Icon.*, pl. 9, fig. 8. — Polypier un peu courbé. Côtes primaires formées par des épines saillantes et écartées. Cloisons du 5° cycle dans deux des systèmes seulement. Haut. 30 à 35 millim.; diam. du calice, 23 sur 18 mill. — *Falunien* : Turin.

32. *T. LATERO-CRISTATUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 10, fig. 3. — Pol. allongé et courbé dans le sens du grand axe. Côtes latérales très-épineuses surtout près du calice; les autres égales et peu saillantes. Cloisons du 5° cycle dans deux des systèmes (type octoméral?). — Hauteur, 30 à 35 mill.; grand axe, 20; petit, 13. — *Falunien* : Turin.

33. *T. LATERO-SPINOSUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 309. — Polyp. droit; côtes latérales garnies d'épines; calice comprimé; cloisons du 5° cycle dans deux demi-systèmes. Haut., 25 mill.; grand axe, 17; petit, 10. — *Falunien* : Turin.

34. *T. RARICOSTATUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Turbinolia raricostata*, Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 9. — Pol. courbé à la base; 14 côtes saillantes en crêtes, les autres planes; cloisons du 5° cycle dans deux demi-systèmes (type octoméral?); cloisons élevées et minces. Hauteur, 35 mill.; larg., 28. — *Falunien* : Turin, etc.

35. *T. CORNUTUS*, J. Haime, *Mém. de la Soc. géol. de France*, 2° série, t. IV, p. 276, pl. 22, fig. 4, 1852. Cette espèce ne diffère du *T. pyrenaeus* que par sa forme plus allongée et irrégulière et ses cloisons plus fortes. — *Parisien* : La Palarea.

d. *Polypier élevé; 5 cycles complets.*

36. *T. REVOLUTUS*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 310, pl. 10, fig. 1. — Pol. fortement recourbé dans le sens du petit axe; 12 côtes en crêtes peu saillantes; les sommets du grand axe en ogive. Haut., 30 mill.; grand axe, 18; petit, 12. — *Falunien* : Turin.

37. *T. SUBCRISTATUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — Pol. très-comprimé; côtes latérales cristiformes. Haut., 25 mill.; grand axe, 20; petit, 12. — *Falunien* : Turin.

38. *T. ? BELLARDII*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Turbinolia Bellardii*, Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 10. — Pol. droit, peu comprimé; 12 côtes formées de crêtes saillantes. Hauteur, 25 mill.; grand axe, 40; petit, 27. — *Falunien* : Turin.

aa. *Polypier court, discoïde; 4 cycles complets.*

39. *T. OBESUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 313, pl. 10, fig. 2. — *Turbinolia obesa*, Michelotti, 1838. — Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 7 a et b,

1841. — *Aplocyathus*, id., d'Orbigny, *Prod.*, 1852. = Pol. court, trochoïde; côtes 1^{res} et 2^{es} garnies d'épines; cloisons inégales et saillantes. Haut., 10 à 15 millim.; diam., 15 à 25. — *Falunien* : Tortone.

40. T. PERARMATUS, Edw. et Haime, *Brit. foss. coral.*, p. 66, 1850. — *Turbinolia perarmata*, Tallavignes in Alex. Rouault, *loc. cit.*, pl. 14, fig. 4. = Cette espèce se distingue de la précédente par des épines, au nombre de 6, longues et comprimées. — *Parisien* : Fabresan, Bos d'Arros.

bb. *Polypier court; 3 Cycles et le commencement d'un 4^e.*

41. T. ARMATUS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 313. — *Turbinolia armata*, Michelotti, 1838, 1847. — Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 8. — *Aplocyathus*, id., d'Orbigny, *Prod.*, = Polyp. court, aussi large à la base qu'au sommet; 5 côtes fortes, garnies d'épines dirigées en bas; des cloisons du 4^e cycle dans 4 des systèmes (type pentaméral, probablement). Hauteur, 10 millim.; diam., 10 mill. — *Falunien* : Turin.

cc. *Polypier court; plus de 5 Cycles.*

42. T.? PYRAMIDATUS, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 316. — *Turbinolia pyramidata*, Michelotti, 1838, 1847. — Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 11. — *Aplocyathus*, id., d'Orbigny, *Prod.*, = Polypier subhémisphérique, 6 côtes formées par des crêtes spiniformes élevées; 9 ou 11 cloisons dans chacun des 6 systèmes. Hauteur, 20 à 22 mill.; largeur, 32. — *Falunien* : Tortone, la Superga.

ESPÈCES DOUTEUSES.

43. T.? GRENIERI. Polypier simple, cônique, droit, peu élevé; cloisons minces et inégales selon les ordres, les primaires et les secondaires subégales. Columelle très-développée, formée de 15 à 18 tigelles tordues sur elles-mêmes. Palis étroits, soudés aux cloisons, mais libres dans leur partie supérieure sur une longueur d'un millimètre; 4 cycles complets (48 cloisons). Diamètre du calice, 6 mill.; haut., 5; diam. de la columelle, 2 mill. — *Oxfordien* (marnes à fossiles pyriteux) : Prévotel. (Communiqué par M. Etallon.)

44. T.? DELEMONTANUS. — *Turbinolia Delemontana*, Thurmman, Abrah., Gagnebin, pl. 11, fig. 24. = Polyp. petit, grêle, allongé, coudé à la base et ordinairement fixé par un épatement étroit; calice circulaire, peu profond; cloisons peu inégales et très-granulées; 2 cycles complets; columelle formée de tigelles assez minces, contournées et anastomosées; palis étroits, soudés aux cloisons, mais libres dans leur partie supérieure sur une petite étendue. Diam. du calice, 3 à 4 millim.; haut. du polyp., 5 à 6 mill. — *Oxfordien* : Champlitte, Prévotel. (Communiqué par M. Etallon.)

45. T.? SUBLÆVIS, Edw. et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 316, *Aplocyathus*, id., d'Orbigny, *Prod.* — *Falunien* : Turin.

46. T.? IRREGULARIS, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 45, t. II, 1856. — *Turbinolia irregularis, brevis et tenuistriata*, Deshayes in Ladoucette, *Hist. des Hautes-Alpes*, pl. 13, fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 1834. — *Turbinolia brevis*, Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 12. — *Trochomilia irragularis*, Milne-Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 240. — *Trochocyathus brevis et tenuistriata*, d'Orbigny, *Prod.*, — *Parisien* : Gap, Faudon, Ronca.

47. T.? KONIGI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, p. 66, 1850. — *Turbinolia Konigi*, Mantell, 1822. — Fleming, 1828. — *Albien* : Folkstone, Wissant, etc.

48. T.? *WARBURTONI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 67. — *Albien* : Cambridge.

49. T.? *PRIMUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 30, fig. 8. — *Lias* : Ilminster.

50. T.? *HEXAGONALIS*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 46, 1856. — *Turbinolia*, *id.*, Mantell, pl. 28, fig. 19, 1850. — *Subapennin* : Onékakara.

51. T.? *MANTELLI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 47. — *Turbinolia*, Mantell, 1850. — *Subapennin* : Onékakara.

M. d'Orbigny cite encore, sans les décrire, les fossiles suivants :

T.? *THORENTI*; T.? *ROYANUS*; T. *ALPINUS*; T.? *GRANDIS* — *Prodrome*, t. II, p. 403, 1850.

GENRE XV. — *PARACYATHUS*.

Cyathina (pars), Philippi, *Arch. für natur.*, t. I, p. 42, 1842.

Paracyathus, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 318, 1848.

Polypier subturbiné et largement fixé. Columelle bien développée et papilleuse; cloisons serrées, subégales et très-granulées; palis soudés inférieurement aux cloisons. Quelques rudiments de traverses qui ne se développent jamais complètement. Type hexaméral.

Ce genre ne diffère du précédent que par sa large base.

a. 5 Cycles complets.

1. P. *DESNOYERSI*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 320. = Pol. un peu comprimé; palis lobés; 5 cycles complets; haut., 30 mill.; grand axe, 20; petit, 12; profondeur de la fossette, 5. — *Parisien* : Grignon.

2. P. *PROCUMBENS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Palis lobés; 5 cycles complets; polyp. courbé; calice circulaire, incliné et profond de 4 mill.; haut., 20 mill.; diam. du calice, 12. — *Parisien* : Hauteville.

b. 4 Cycles et le commencement du 5^e.

3. P. *CRASSUS*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 4, fig. 1, 1850. = Polyp. court; côtes inégales; 4 cycles et des cloisons d'un 5^e dans la moitié de deux systèmes. Haut., 5 mill.; largeur du calice, 7 à 8. = *Parisien* : Bracklesham-Bay.

c. 4 Cycles complets.

4. P. *PEDEMONTANUS*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 321. = Polyp. assez élevé; côtes distinctes dès la base; calice incliné et large de 7 à 10 mill.; palis lobés. Haut. de 8 à 15 mill. — *Subapennin* : Asti.

5. P. *BREVIS*. Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 323. = Polyp. court et droit; calice circulaire large de 15 mill.; palis peu développés. Hauteur, 10 mill. — *Parisien* : Ile Sheppy.

d. 3 Cycles et le commencement d'un 4^e.

6. P. *CARYOPHYLLUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 322. — *Turbinolia*, *id.*, Lamarck, 1816. — Deslongchamps, 1824. — DeFrance, 1828. =

Polyp. droit, cylindro-cônique; calice circulaire large de 8 mill.; 4 cycles, le 5^e manquant dans un ou deux systèmes; palis minces et lobés. Haut., 15 millim. — *Parisien* : Ile Sheppy.

aa. *Palis entiers*; 4 *Cycles complets*.

7. P. TURONENSIS, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 321. == Polyp. court et droit; calice circulaire, un peu incliné et large de 7 millim.; columelle développée; palis gros et prismatiques. Hauteur, 7 à 8 mill. — *Falunien* : Manthelan, Turin, etc.

IV^e Famille. — Turbinoliens.

TURBINOLIENS (pars), Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 59, 1856.

Loge ouverte dans toute la hauteur. Point de palis.

GENRE XVI. — FLABELLUM.

Fungia (pars), Lamarck, *Hict. des anim. s. vert.*, 1816.

Flabellum, Lesson, *Illust. de zool.*, 1831.

Monomyces, Ehrenberg, *Coral. des Roth Meer*, 1834.

Phyllodes, Philippi, 1841.

Euphyllia, Dana, *Exp. exp. zooph.*, 1846.

Flabellum, Milne-Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 3^e série, t. IX, p. 256, 1848.

Polypier droit, comprimé; fossette calicinale étroite et profonde, columelle pariétale peu développée et souvent rudimentaire; cloisons nombreuses, non débordantes; muraille recouverte d'une épithèque armée souvent de crêtes et d'épines.

1. *Murailles lisses sur les faces et portant des crêtes sur les côtés.*

a. 6 *Cycles complets*.

4. T. EXTENSUM, Michelin, *Icon.*, pl. 9, fig. 14. — Nyst., 1843. — Michelotti, 1847. — Milne-Edwards, *loc. cit.*, 1848. == Polyp. comprimé; bords supérieurs formant un arc plus grand qu'un demi-cercle; 4 cycles égaux, le 6^e rudiment. Hauteur, 25 millim.; grand axe, 35; petit, 10. — *Falunien* : Turin.

2. F. BASTEROTI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 263. == Polyp. comprimé; crêtes latérales saillantes; les 2 premiers cycles égaux. Hauteur, 23 mill.; grand axe, 23; petit, 9. — *Falunien* : Dax.

1. — b. 5 *Cycles et le commencement d'un 6^e.*

3. F. INTERMEDIUM, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 262. — *F. avicula* (pars), Michelin, pl. 9, fig. 11^c. — *Turbinolia avicula, alata, stellatissima*, Michelotti, 1838. == Polyp. comprimé, à bord peu convexe; 5 cycles, le 6^e manquant dans la moitié des systèmes. Haut., 40 mill.; grand axe, 40; petit, 15; profondeur de la fossette, 15. — *Falunien* : Tortone.

1. — c. 5 *Cycles complets*.

4. F. AVICULA, Michelin, *Icon.*, pl. 9, fig. 11^a (non 11^c). — *Turbinolia uneata*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 37, fig. 17. — *Turbinolia avicula*,

Michelotti, 1838. = Polyp. comprimé; côtes saillantes; les trois premiers cycles égaux. Hauteur, 23 mill.; grand axe, 30; petit, 15. — *Falunien*: Tortone, Turin.

5. F. CUNEIFORME, Lonsdale, *Journ. of the geol. Soc.*, 1845. = Polypier muni de crête seulement à la base des côtés; les 3 premiers cycles égaux. Hauteur, 25 mill.; grand axe, 22; petit 12. — *Parisien*: Alabana, Entow, etc.

6. F. COSTATUM, Bellardi, in Michelin, *Icon.*, pl. 61, fig. 10, 1846. = Polyp. plus allongé et comprimé que le *F. avicula*; côtes assez saillantes et tuberculeuses. Haut., 16 mill.; grand axe, 13; petit, 5. — *Suessonien*: La Palarea.

7. F. ACUTUM, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 267, pl. 8, fig. 6. = Pol. allongé et finement pédicellé; bords supérieurs peu arqués; les 3 premiers cycles égaux. Haut., 40 mill.; grand axe, 35; petit, 23. — Localité inconnue.

8. F. SICILIENSE, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polyp. portant des crêtes petites sur les côtés; cloisons minces à bords flexueux; les premiers cycles égaux. Haut., 38 mill.; grand axe, 38; petit, 19. — *Subapennin*: Palerme.

9. F. HOHEI, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Turbinolia cuneata*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 38, fig. 17. = Polypier présentant 5 grosses côtes de chaque côté; les côtes latérales ont de fortes crêtes; sommet du grand axe en ogive; 12 système composés chacun de 7 cloisons. Haut., 30 mill.; grand axe, 33. — *Parisien*: Castel Arquato.

1. — c. 4 Cycles et le commencement d'un 5^e.

10. F. BELLARDII, J. Haime, *Bull. de la Soc. géol. de France*, 1850. — *Flabellum cuneatum* (pars), Michelin, *Icon.*, p. 270, 1846. = Pol. allongé et comprimé; les sommets des angles calicinaux en ogive; 4 cycles et des cloisons d'un 5^e dans deux des systèmes (type octoméral?). — *Parisien*: La Palarea.

11. F. DUFRENOYI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 269. — *Turbinolia*, id., d'Archiac, *Mém. de la Soc. géol.*, 2^e série, t. II, pl. 5; fig. 4-5, 1846. = Pol. élevé et un peu étroit; cloisons primaires plus fortes que les autres; 4 cycles, le 5^e incomplet. Haut., 20 à 25 mill.; grand axe, 13; petit, 10. — *Suessonien*: Biaritz, Fabresan.

12. F. APPENDICULATUM, Michelin (pars), *Icon.*, p. 45 (non la fig. 12, pl. 9 qui est le *F. asperum*). — (F.? id., Bronn, 1838. — *Turbinolia appendiculata*, Brogniart, *Sur les terr. du Vicentin*, pl. 6, fig. 17, 1823. = Polyp. peu élevé et étroit; des crêtes bien prononcées; 4 cycles, le 5^e incomplet. Haut., 15 mill.; grand axe, 12; petit, 7. — *Suessonien*: Ronca, Val Sangonini.

13. F. VAGINALE, Michelin, *Icon.*, pl. 63, fig. 3. = Polyp. allongé et étroit; côtes latérales presque droites et garnies de petites crêtes; bords supérieurs presque droits; sommet du grand axe anguleux; cloisons peu nombreuses, mais en nombre indéterminé. — *Parisien*: Biaritz.

2. Murailles présentant des crêtes sur les faces et les côtés.

a. — 5 Cycles cloisonnaires complets.

14. F. ROISSYANUM, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 268. = Polyp. cunéiforme; côtes primaires garnies de crêtes; les cloisons des 3 premiers cycles subégales. Haut., 25 mill.; grand axe, 30; petit, 15. — *Falunien*: Dax.

15. *F. CRISTATUM*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. pal.*, p. 32, 1851. Ne diffère du *F. Roissyanum* que par ses crêtes plus fortes; les côtes sont plus saillantes et la columelle pariétale moins prononcée. — *Falunien* : Le Boldelberg.

2. — b. 4 Cycles seulement.

16. *F. TURGIDUM*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 87, t. II, 1856. = Polyp. droit, peu comprimé; 24 côtes fortes et cristiformes; les 2 premiers cycles subégaux. — *Falunien* : Turin.

17. *F. ASPERUM*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 270. — *F. appendiculatum*, Michelin, *Icon.*, pl. 9, fig. 12. — Michelotti, 1847. = Côtes primaires garnies seules de crêtes; bords supérieurs droits; angles du grand axe arrondis. Haut., 20 mill.; grand axe, 13; petit, 10. — *Falunien* : Tortone.

3. Murailles lisses et ne portant pas de crêtes.

a. 6 Cycles cloisonnaires complets.

18. *F. MAJUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 264. = Les 3 premiers cycles subégaux. Haut., 65 mill.; grand axe, 90; petit 25. — *Falunien* : Castel-Roussillon, Alberga.

3. — b. 5 Cycles cloisonnaires complets.

19. *F. WOODI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 267. — *Fungia semilunata*, Wood, *Ann. and mag.*, 1844. = Pol. en cône comprimé; les 3 premiers cycles égaux. Hauteur, 30 mill.; grand axe, 30; petit, 10. — *Falunien* : Iken.

20. *F. SUBTURBINATUM*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 268. = Polyp. peu comprimé; bords supérieurs droits; les 3 premiers cycles égaux. Haut., 60 mill.; grand axe, 40; petit 26; profondeur de la fossette, 10. — *Falunien* : Plaisance.

21. *F. CUNEATUM*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Turbinolia cuneata*, Goldfuss, *Petref. germ.*, pl. 15, fig. 9. — Michelotti, 1838, et *T. clavus*, id., pl. 2, fig. 2, 1838. = Polyp. deltoïde, cunéiforme; cloisons épaisses; celles des 3 premiers cycles égales. Haut., 25 mill.; grand axe, 33; petit, 15. — *Suessonien*? : Pyrénées.

22. *F. MICHELINI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 265. — *F. cuneatum*, Michelin, *Icon.*, pl. 9, fig. 15. = Polyp. en cône comprimé; calice elliptique, large de 27 mill. sur 16; les 2 premiers cycles égaux. Hauteur, 30 à 35 millim. — *Subapennin* : Sienne, Saint-Martin-d'Aubigny.

23. *F. GALLAPAGENSE*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 264. pl. 4, fig. 3. = Polypier en cône peu comprimé; calice elliptique; bord interne des cloisons principales épaissi; les 3 premiers cycles égaux. Haut., 40 mill.; grand axe, 30; petit, 15; profondeur, 15. — *Falunien*? : Gallapagos.

24. *F. INORNATUM*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, p. 91. 1850. = Polyp. élevé, peu comprimé; calice ovalaire, horizontal; cloisons minces et striées. — *Falunien* : Turin.

25. *F. SINENSE*, Michelin, *Icon.*, pl. 9, fig. 8, 1841. — *Flabellum sinense*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 272. = Polypier court, peu comprimé; calice elliptique; bord supérieur courbé; les 3 premiers cycles égaux. Haut., 23 mill.; grand axe, 30; petit, 25. — *Falunien* : Turin.

ESPÈCES DOUTEUSES.

26. *F. LACINIATUM*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 272. — *Ptylloides*, id.,

Philippi, *Neues Jahrb. für min.*, etc., pl. 11, fig. B², t. IX. — *Terrains tertiaires de la Calabre*.

27. F. RÖMERI, Philippi, *Beitr. zur Kenntniss*, etc., pl. 1, fig. 2. — *Terrains tertiaires du nord de l'Allemagne*.

GENRE XVII. — TURBINOLIA.

Turbinolia (pars), Lamarck, *Hist. des anim. sans vert.* T. II, p. 229, 1816.

Turbinolia (pars), Ehrenberg, *Corall. des Roth meer*, p. 53, 1834.

Turbinolia, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., p. 235, 1848.

Polypier turbiné, droit et libre; calice circulaire; cloisons débordantes; columelle styliforme; côtes lamellaires, saillantes, séparées par des rangées de fossettes.

a. 2 Cycles et des cloisons d'un 3^e.

1. T. HUMILIS, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 3, fig. 4, 1850. = Polypier petit, subcylindrique; columelle ronde et saillante; le 3^e cycle manque dans deux des systèmes (la figure 4^b, pl. 3, *Brit. foss. corall*, montre à tort 3 cycles complets). Haut., 5 mill.; diamètre du calice, 2. — *Parisien* : Barton.

b. 3 Cycles cloisonnaires complets.

2. T. SULCATA, Lamarck, loc. cit., 1816. — Lamouroux, 1821. — Deslongchamps, 1824. — Goldfuss, 1826. — DeFrance, 1828. — Nyst, 1843. — Michelin, 1844, pl. 43, fig. 4. — Edwards et Haime, loc. cit., pl. 3, fig. 3, 1850. = Polyp. turbiné; columelle très-saillante; 48 côtes dont 24 rudimentaires; les cloisons tertiaires se soudent aux primaires. Haut., 8 à 10 millimètres; diamètre du calice, 3. — *Parisien* : Grignon, Hauteville, Blacklesham-Bay, Gand.

3. T. BOWERBANKI, Edwards et Haime, loc. cit., pl. 2, fig. 3, 1850. = Polyp. court; cloisons épaisses; 48 côtes. Haut., 7 mill.; diam. du calice, 3. — *Parisien* : Barton.

4. T. FREDERICANA, Edwards et Haime, loc. cit., pl. 3, fig. 2. = Pol. conique; 48 côtes inégales; columelle épaisse et granulée; cloisons assez minces. Hauteur, 7 mill.; diamètre du calice, 3 1/4. — *Parisien* : Barton.

5. T. PRESTWICHI, Edwards et Haime, loc. cit., pl. 3, fig. 5. = Polyp. cylindroïde, tronqué à la base; côtes saillantes, épaisses; 24 rudimentaires; point de fossettes murales. Haut., 11 mill.; diam., 5. — *Parisien* : Haverstock-Hill.

6. T. DIXONI, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., p. 238, pl. 4, fig. 2. — *Brit. foss. corals*, pl. 3, fig. 1. = Polyp. large au sommet et mince à la base; 24 côtes seulement; columelle comprimée; cloisons minces. Haut., 11 mill.; diam. du calice, 6. — *Parisien* : Blacklesham-Bay.

7. T. FIRMA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 2, fig. 4. — 24 côtes saillantes et serrées; fossettes murales indistinctes; columelle comprimée. Haut., 8 mill.; diamètre du calice, 4. — *Parisien* : Barton.

8. T. PHARETRA, Isaac Lea, *Contrib. to geol.*, pl. 6, fig. 210. — Edwards et Haime, *Ann.*, loc. cit., p. 238. = Ne diffère du *T. sulcata* par ses 24

côtes seulement, mais plus saillante et sa columelle comprimée, grosse et présentant 6 arêtes qui continuent les cloisons primaires. — *Parisien* : Alabama.

9. *T. NYSTANA*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, p. 15. — Ne diffère du *T. pharetra* que par sa columelle plus petite et ses cloisons plus épaisses. — *Parisien* : Bruxelles.

10. *T. MINOR*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 2, fig. 5. — Pol. petit; cloisons minces au centre; columelle ronde et petite; côtes épaisses. Haut., 5 1/2 mill.; diam. du calice. 2 3/4. — *Parisien* : Barton.

c. 3 *Cycles complets et des cloisons d'un 4°.*

11. *T. COSTATA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, pl. 7 fig. 1. — Polyp. petit, atténué à la base; 36 cloisons et 72 côtes; les cloisons se soudent en faisceau qui vont s'unir à la columelle. Haut., 10 mill.; diam. du calice, 5. — *Parisien* : Grignon.

12. *TURBINOLIA DISPAR*, DeFrance, *Dict.*, 1828. — Michelin, *Icon.*, pl. 43, fig. 5. — Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 240. — 96 côtes; 40 cloisons; (type pentaméral?); columelle comprimée. Haut., 8 à 10 millim.; diamètre du calice, 5 ou 6. — *Parisien* : Hauteville, Paris.

GENRE XVIII. — SPHENOTROCHUS.

Sphenotrochus, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc., cit.*, p. 231, 1848.

Polypier droit, cunéiforme et libre; calice ovalaire; columelle lamellaire à bord horizontal; cloisons peu débordantes; côtes granulées, lisses ou crépues.

1. *Côtes crépues ou papillifères.*

1. *S. CRISPUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 241. — *Turbinolia crista*, Lamarck, 1816. — Deslongchamps, 1824. — Goldfuss, 1826, pl. 15, fig. 7. — Michelin, 1844, pl. 43, fig. 1. — Polyp. en éventail; côtes crépues à leur partie supérieure; cloisons 1^{re} et 2^e se soudant à la columelle et en dédoublant leur feuillet. Haut., 7 à 8 mill.; grand axe, 7; petit, 3 à 4. — *Parisien* : Uccle, Paris.

2. *S. MIXTUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 243. — *Turbinolia mixta*, Michelin, *Icon.*, pl. 43, fig. 3. — Ce polyp. diffère du *S. crispus* par sa forme plus allongée et ses côtes crépues seulement vers le calice. Haut., 5 à 6 mill.; grand axe, 3 1/2; petit, 2. — *Parisien* : Grignon.

3. *S. PULCHELLUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 7, fig. 3. — Polyp. allongé; côtes prim. et second. peu crépues; les tertiaires le sont fortement depuis la base où les côtes sont interrompues; columelle un peu flexueuse. Haut., 6 mill.; grand axe, 4 1/2; petit, 2 1/2. — *Parisien* : Grignon :

4. *S. SEMIGRANOSUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 245. — *Turbinolia semigranosa*, Michelin, *Icon.*, pl. 43, fig. 2. — Ce polypier diffère du *S. crispus* par ses côtes moins visibles et remplacées par des granulations allongées et papilliformes. Haut., 4 mill.; grand axe, 5; petit, 3. — *Parisien* : Guise-la-Mothe.

5. *S. GRANULOSUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 246, pl. 7, fig. 2. — *Turbinolia granulosa*, DeFrance, *loc. cit.*, 1828. — Polyp. allongé et comprimé; côtes indistinctes et remplacées par des granulations polygonales

sur les faces, visibles un peu en haut. Haut., 8 mill.; grand axe, 5; petit, 2. — *Parisien* : Hauteville.

2. Côtes lisses.

6. S. INTERMEDIUS, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 213. — *Turbinolia intermedia*, Münster, *ap. Goldfuss, Petref. Germ.*, pl. 37, fig. 10, 1826. — Polypier subcylindrique; 24 côtes lisses. Haut., 8 à 9 millim.; grand axe, 6; petit, 4. — *Falunien* : Sutton, Anvers.

7. S. MILLETANUS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Turbinolia Milletiana*, Michelin, pl. 74, fig. 1. — Diffère du précédent par des côtes moins sail-lantes et quelquefois interrompues. Haut., 7 à 8 mill.; grand axe, 5; petit, 2 1/2. — *Falunien* : Thorigné (Anjou), Manthelan (Touraine).

8. S.? NANUS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Turbinolia nana*, Lea, *Contr. to geol.*, pl. 6, fig. 209. — Diffère du précédent par sa taille plus petite et n'en est peut-être que le jeune âge. — *Parisien* : Alabama.

9. S. RÆMERI, Edwards et Haime, *Brit. fos. coral.*, p. 5, 1850. — Res-semble au *S. mixtus* et en diffère par ses côtes lisses; calice deux fois aussi long que large. — *Falunien* : Cassel, Hildesheim.

GENRE XIX. — DISCOTROCHUS.

Discotrochus, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 251, 1848.

Polypier discoïde et libre; calice subplane et circulaire; columelle papilleuse; cloisons peu débordantes; murailles nues; côtes sim-ples.

1. D. ORBIGNYANUS, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 252, pl. 7, fig. 6. — Polyp. concave en dessous; côtes grosses et inégales; 4 cycles com-plets; cloisons inégales et convexes en dessus. Hauteur, 1 1/2 mill.; diam. du calice, 6. — *Parisien* : Alabama.

2. D. MICHELOTTI, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 76, t. II, 1856. — Diffère du précédent par des cloisons moins inégales. — *Falu-nien* : Colline de Turin.

GENRE XX. — PLATITROCHUS.

Platitrochus, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 246.

Turbinolia (pars), Lea, *loc. cit.*, 1833.

Endopochys (pars), Lonsdale, 1845.

Polypier droit, cunéiforme et libre; columelle forte et papilleuse; cloisons débordantes et subégales; muraille nue garnie de côtes fortes et larges.

1. P. STOKESI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 7, fig. 7. — *Turbinolia*, *id.*, Lea. — *Endopochys*, Lonsdale, 1833. — Polypier comprimé à la base; côtes larges, celles du milieu subégales, celles des côtés prennent en des-cendant un grand développement; cloisons séparées des côtes par un sillon profond et circulaire; 3 cycles complets. Haut, 7 mill.; grand axe, 5; petit, 4. — *Parisien* : Alabama.

2. P. GOLDFUSSI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 248, pl. 7, fig. 9. — *Turbinolia*, *id.*, Lea, 1833. — Ne diffère du précédent que par sa base plus large et moins aplatie; les cloisons et les côtes ne sont pas non plus séparées par un sillon. — *Parisien* : Alabama.

GENRE XXI. — CERATOTROCHUS.

Ceratotrochus, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 248.

Polypier pédicellé, mais devenant libre par les progrès de l'âge, columelle petite et fasciculaire; cloisons larges et débordantes; muraille nue; côtes distinctes depuis la base et épineuses.

a. *Côtes spinifères; calice circulaire.*

1. *C. MULTISPINOSUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Turbinolia multispina*, Michelin, pl. 9, fig. 5. — Michelotti, 1838, 1847. = Polypier peu élevé; côtes primaires et secondaires garnies d'épines; 3 cycles et des cloisons du 4^e dans la moitié des systèmes. Hauteur 10 à 20 mill.; diam. du calice, 7 à 12 mill. — *Falunien* : Tortone.

2. *C. MULTISERIALIS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 240, pl. 7, fig. 5. — *Turbinolia*, id., Michelotti, *Spec. Zooph.*, pl. 2, fig. 7, 1838. — Michelin, *Icon.*, pl. 9, fig. 6. = Polyp. courbé; côtes épineuses excepté à la base, 4 cycles incomplets (en tout 36 cloisons); cloisons primaires bien plus développées que les autres. Hauteur, 10 mill.; diamètre du calice, 8; profondeur, 2. — *Falunien* : Tortone.

b. *Côtes cristifères; calice ovale.*

3. *C. DUODECIMCOSTATUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 250. — *Turbinolia duodecimcostata*, Michelin, *Icon.*, pl. 9, fig. 7. — Michelotti, 1847. = Polyp. assez élevé et comprimé; 12 côtes saillantes et formées d'une série de petites crêtes; 6 cycles; les cloisons primaires et secondaires subégales. Hauteur, 45 mill.; grand axe, 30; petit, 20. — *Subapennin* : La Palarea.

4. *C. EXARATUS*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 30, 1851. — *Turbinolia exarata*, Michelin, pl. 61, fig. 3. = Polypier élevé, courbé et légèrement comprimé; 24 côtes saillantes séparées par 6 petites subégales. Haut., 70 centim.; diamètre du calice, 35 sur 40. — *Parisien* : La Palarea.

GENRE XXII. — SMILOTROCHUS.

Smilotrochus, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 29, 1851.

Polypier cunéiforme, droit et libre; columelle nulle; cloisons peu débordantes et soudées par leur bord interne; muraille nue et couverte de côtes simples.

a. *5 Cycles complets.*

1. *S. TUBEROSUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, — *Brit. foss. corals*, pl. 10, fig. 2, 1850. — *Turbinolia compressa*, Morris, *Cat. of Brit.*, 1843. = Polyp. peu élevé, comprimé et couvert de côtes fines; les cloisons des 1^{er} et 2^e cycles subégales. Hauteur, 17 mill.; grand axe, 20; petit, 10. — *Cénomarien* : Blackdown.

b. *Moins de 5 Cycles.*

2. *S. AUSTENI*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 71, t. II. =

Polypier cunéiforme, très-comprimé inférieurement; calice ovale; 48 côtes (4 cycles) droites et fines. Hauteur, environ 10 mill. — *Sénonien* : Maëstricht.

3. S. HAGENOWI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 71. — Diffère du précédent par ses côtes moins nombreuses et subflexueuses. — *Sénonien* : Maëstricht.

GENRE XXIII. — DESMOPHYLLUM.

Desmophyllum, Ehrenberg, *Coral. des Roth meer*, p. 75, 1834.

Polypier fixé par une large base; point de columelle; calice profond; cloisons larges et débordantes; muraille nue et lisse ne montrant des côtes que dans le voisinage du calice.

1. D. TAURINENSE, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 336. — *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 31, 1851. — *Turbinolia Taurinensis*, Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 17. — Polypier un peu courbé et granulé à sa surface; 5 systèmes (type pentaméral) composé chacun de 7 cloisons dérivées; les cloisons primaires saillantes. Hauteur, 20 mill.; diamètre du calice, 10. — *Falunien* : Turin.

2^e Tribu. — Trochosmiliacées.

TROCHOSMILIACÉES et LITHOPHYLLIACÉES (*pars*), Edwards et Haime, 1856.

Polypier simple; chambres viscérales divisées par des traverses lamellaires. Point de synapticules.

V^e Famille. — Trochosmiliens.

TROCHOSMILIACÉES (*pars*), Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 146, 1856.

Cloisons entières, à bord tranchant. ne présentant ni lobes ni dents; muraille nue.

GENRE XXIV. — DIPLOCTENIUM.

Diploctenium, Goldfuss, *Petref. Germ.*, t. I, p. 50, 1826.

Fungia (*pars*), Lamarck. *Hist. des anim. s. vert.* T. II, p. 235. 1816.

Polypier très-comprimé, flabelliforme et libre; calice allongé, à fossette étroite, longue et peu profonde; columelle nulle; cloisons très-nombreuses, subégales et peu débordantes; murailles nues et couvertes de côtes qui se ramifient en s'élevant; traverses abondantes.

a. *Bord calicinal très-convexe.*

b. *Angles calicinaux descendants plus bas que le pédicelle.*

1. D. LUNATUM, Michelin, *Icon.*, pl. 65, fig. 8. — *D. lunatum* et *Goldfussanum*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *D. cordatum*, Goldfuss, pl. 37, fig. 16. — *Fungia lunata*, Bruguière, *Journ., d'hist. nat.*, 1792. — *F. semilunata*,

Lamarck, 1816. — Defrance, 1820, — Lamouroux, 1824. = Polypier en forme de croissant ; bord supérieur formant un arc moindre qu'un demi-cercle. Haut., 3 centim.; grand axe, 6 cent.; petit, 1. — *Cénomanién* ; Bains de Rennes, les Martigues, Gosau.

2. D. SUBCIRCULARE, Michelin in Milne-Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., p. 249, pl. 6, fig. 4, 1849. = Polyp. subcirculaire ; bord calicinal formant les $\frac{3}{4}$ d'un cercle ; environ 520 côtes. Hauteur depuis le pédicelle, 20 millim.; grand axe, 30 millim. — *Sénonien* : Royan (Dordogne).

3. D. FERRUM EQUINUM, Reuss, *Denks. der Wiener Akad.*, t. VII, p. 89, pl. 1, fig. 13 et 14, 1851. = Polypier en forme de fer à cheval ; les ailes latérales sont anguleuses et légèrement divergentes à leur extrémité. — *Cénomanién* : Gosau.

4. D. CONJUNGENS, Reuss, loc. cit., p. 90. — Pédicelle court ; ailes latérales ayant de la tendance à se rejoindre pour former un cercle. — *Cénomanién* : Gosau.

5. D. HAIDINGERI, Reuss, loc. cit., p. 90, pl. 1, fig. 1-2. — Cette espèce diffère de la précédente par des côtes plus saillantes et réunies par des traverses exothécales et par ses angles calicinaux qui se rejoignent en bas pour constituer un cercle parfait. — *Cénomanién* : Gosau.

6. D. CONTORTUM, Reuss, loc. cit., pl. 13, fig. 1. — Côtes lamellaires ; ailes latérales croisées en bas et contenant le pédicelle. — *Cénomanién* : Gosau.

a.—c. *Angles calicinaux ne descendant pas aussi bas que le pédicelle.*

7. D. MATHERONI (*Matheronis*), Michelin, *Icon.*, pl. 68, fig. 1. = Pol. demi-circulaire ; côtes fines et ondulées, on en compte 280. Haut., 25 mill.; grand axe, 32; petit, 5; profondeur de la fossette, 3. — *Cénomanién* : Figuières, Fondoule.

8. D. CORDATUM, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 15, fig. 1. — Bronn, 1837-37. — Edwards et Haime, 1849. = Pédicelle gros et courbé ; bord calicinal semi-elliptique et élevé ; 240 côtes. Hauteur, 24 millim.; grand axe, 18. — *Sénonien* : Maëstricht.

aa. *Bord calicinal peu convexe.*

9. D. PAVONIUM, Reuss, loc. cit., pl. 1, fig. 5-6. = Polyp. flabelliforme aussi haut que large ; côtes fortes ; 100 cloisons inégales. — *Cénomanién* : Saint-Wolfgang.

10. D. PLUMA, Goldfuss, loc. cit., pl. 15, fig. 2. — Bronn, 1835-37. = Polypier à bords latéraux concaves ; bord calicinal bilobé ? 600 côtes géminées et ondulées. — *Sénonien* : Maëstricht.

ESPÈCE DOUTEUSE.

11. D. LAMELLOSUM, d'Orbigdy, *Prod.*, t. II, p. 277. = « Espèce presque circulaire à très-grosses cloisons écartées. » — *Sénonien* : Royan.

GENRE XXV. — TROCHOSMILIA.

Trochosmilia, Edwards et Haime, *Compt.-rend. de l'Acad. des sc.*, t. XXVII, p. 467, 1848.

Turbinolia (pars), Lamarck, 1816. — Michelin, 1841.

Acrosmilia (pars), *Ellipsosmilia* (pars), *Lasmophyllia* (pars), d'Orbigny, *Note sur les Polyp. foss.*, p. 5 et 6, 1849.

Polypier turbiné et fixé par un pédicule mince ou par une large base; columelle nulle; calice circulaire ou ovalaire; cloisons minces, larges et serrées; muraille nue et couverte de côtes simples; traverses abondantes.

A. Base étroite, subpédicellée. a. Polypier droit, calice régulier.

b. Polypier comprimé. c. Rapport des axes, 10 : 32.

1. T. SALTZBURGENSIS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 237. — *Polyp. foss. des terr. pal.*, p. 46. — *Ellipsosmilia Saltzburgiana*, d'Orbigny, *Prod.*, t. II, p. 202. = Polypier peu élevé et comprimé; 168 côtes serrées et crénelées; cloisons à bord arqué. Haut., 40 mill.; grand axe, 65. — Cénomanien : Gosau.

2. T. CUNEOLUS, Edwards et Haime, *Ann., loc. cit.*, p. 237. — *Turbinolia id.*, Michelin, pl. 66, fig. 2. — *Ellipsosmilia id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier allongé et comprimé; 76 côtes fines et égales; cloisons minces et inégales. Hauteur, 30 mill.; grand axe, 15. — Turonien : Martigues, Brignoles.

b. — cc. Rapport des axes environ, 10 : 70.

3. T. COMPLANATA, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 238. — *Turbinolia id.*, Goldfuss, pl. 15, fig. 10. — Michelin, pl. 65, fig. 6. = Polypier très-comprimé; côtes fines et serrées; 220 cloisons alternativement grandes et petites. Haut., 25 mill.; grand axe, 40. — Turonien : Brignoles, Gosau, etc

b. — ccc. Rapport des axes 10 : 100.

4. T. BASOCHESI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 239. — *Turbinolia id.*, DeFrance, 1828. — *Turb. alata*, Michelin, pl. 65, fig. 5. = Polypier très-comprimé et peu élevé; 280 côtes fines, égales et granulées; cloisons inégales. Hauteur, 22 mill.; grand axe, 58. — Turonien : Martigues, Gosau.

b. — cccc. Rapport des axes, 10 : 20.

5. T. COMPRESSA, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 238. — *Turbinolia id.*, Lamarek, 1816. — Lamouroux, 1821. — Michelotti, 1838. — Michelin, pl. 4, fig. 2, 1846. = Polyp. comprimé surtout à la base; côtes égales et serrées; cinq cycles complets, les 3 premiers égaux. Haut., 30 mill.; grand axe, 28. — Turonien : Uchaux, Martigues.

6. T. SULCATA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, p. 68, pl. 11, fig. 6. = Polyp. allongé; muraille creusée latéralement de deux sillons longitudinaux; côtes saillantes; 4 cycles et quelques cloisons d'un 5^e. Hauteur, 22 mill.; grand axe, 15. — Albien : Folkstone.

b. — ccccc. Rapport des axes, 10 : 15.

7. T. CORNICULUM, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 240. — *Turbinolia id.*, Michelin, pl. 61, fig. 4. — *Lasmophyllia id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850, = Polypier élevé, peu comprimé; 144 côtes au sommet et 72 seulement à la base. Haut., 55 mill.; grand axe, 28. — Suessonien : La Palarea, Sinde.

8. T. FIMBRIATA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 43. — *Turbinolia id.*, Michelin, pl. 9, fig. 10. = Polypier en cône court; côtes

subégales; cloisons nombreuses. Hauteur, 28 millim.; grand axe, 43. — Suessonien : La Palarea, Castellane.

bb. *Calice rond.*

9. T. POCULUM. Polypier à pédicule étroit, s'élargissant un peu à la base; côtes égales et bien marquées; calice rond, subplane; 4 cycles complets; les cloisons des 3 premiers cycles subégales. Haut., 15 millim.; diamètre du calice, 8. — Corallien : Champlitte (Haute-Saône),

10. T. MICHELOTTII, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 46. *Turbinolia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 6. = Polyp. subdiscoïde à pédicelle étroit; 5 cycles peu inégaux. Haut., 18 mill.; diamètre du calice, 26. — Falunien : Turin.

A. — a. *Polypier droit; calice irrégulier.*

11. T. MULTISINUOSA, J. Haime in d'Archiac, *Hist. des prog. de la géol.*, t. III, p. 228, 1850. — *Turbinolia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 61, fig. 8. = Polypier plus large que haut; calice sinueux, multilobé; cloisons nombreuses, grandes et petites. Haut., 90 mill.; grande largeur, 115. — Suessonien : La Palarea, Sinde.

A. — aa. *Polypier arqué; calice régulier.*

12. T. URICORNIS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 241, 1848. — *Turbinolia id.*, Michelin, pl. 65, fig. 2. — *Ellipsosmilia id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier cylindroïde; 120 côtes égales et serrées; cloisons très-minces et serrées. Haut., 50 mill.; diam. du calice, 20. — Turonien : Corbières, Catalogne.

13. T. GRANIFERA, J. Haime, *Bull. de la Soc. géol.*, 2^e série, t. XI, pl. 2, fig. 3, 1854. = Polyp. aussi large que haut, turbiné et comprimé; côtes fortes; 5 cycles. Rapport des axes, 10 : 15. — Turonien : Bains de Rennes.

14. T. CERNUA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, p. 69. — *Turbinolia id.*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 15, fig. 8. = Polyp. comprimé; côtes inégales; 48 grandes cloisons; 48 petites. Hauteur, 35 mill.; grand axe, 32. — Fossile de la France méridionale (Goldfuss).

15. T. TIFAUENSIS, J. Haime, *loc. cit.*, pl. 2, fig. 4. = Polypier très-courbé et comprimé; côtes fines, subgranulées au nombre de 192; 6 cycles complets, les cloisons des 3 premiers cycles subégales. Rapport des axes : 1 : 2. — Turonien : Bains de Rennes.

A. — aaa. *Calice bilobé.*

16. T. DIDYMA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 46. — *Turbinolia id.*, Goldfuss, *Petref. germ.*, pl. 15, fig. 11, 1026. = Polypier triangulaire, courbé dans le sens du petit axe; côtes fines; 120 grandes cloisons; 120 petites et des cloisons rudimentaires. Haut., 50 mill.; grand axe, 70; petit, 23. — Turonien ; Gosan.

17. T. GERVILLEI, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 241. = Polyp. courbé dans le sens du petit axe; calice en forme de 8; 8 cycles; fossette profonde de 3 cent. Haut., 60 mill.; grand axe, 75; petit, 35. — Parisien ; Hauteville.

18. T. FAUJASI, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier en cône comprimé à la base et courbé dans le sens du petit axe; côtes fines, serrées; 6 cycles; calice peu lobé et à bord arqué. Haut., 27 mill.; grand axe, 30; petit, 15. — Sémonien ; Maëstricht.

19. *T. INFLEXA*, Reuss, *Denks. der Wiener acad.*, t. VII, p. 86, pl. 5, fig. 3-5, 1854. = Polyp. courbé dans le sens du petit axe et peu allongé; calice à peine bilobé; muraille épaisse; 5 cycles, les cloisons des 3 premiers épaisses. Rapport des axes, 1 : 2. — Turonien : Gosau.

20. *T. BIPARTITA*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 5, fig. 13. = Polypier courbé dans le sens du petit axe et présentant un sillon profond sur le milieu de la face concave; 150 cloisons dont 48 fortes et égales. Rapport des axes, 1 : 3. — Turonien : Gosau.

21. *T. ? SUBINDUTA*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 5, fig. 15. = Polypier une fois plus large que haut; quelques traces d'épithèque; 180 cloisons peu inégales. Rapport des axes 1 : 4. — Turonien : Gosau.

A. — aaaa. Calice multilobé.

22. *T. ? MULTILOBATA*, J. Haime, *Mém. de la Soc. géol.*, 1852. = Polyp. allongé, multilobé, courbé dans le sens du petit axe; côtes nombreuses et inégales; bords du calice flexueux et horizontaux. — Suessonien ; La Palarea.

23. *T. DUMORTIERI*, J. Haime, *Bull. de la Soc. géol.*, *loc. cit.*, pl. 2, fig. 2. 1854. = Polyp. plus large que haut et courbé dans le sens du grand axe; calice trilobé; 7 cycles; cloisons des 3 premiers cycles subégales; côtes inégales de 4 en 4. Haut., 40 à 50 mill.; grand axe, 60 à 70; petit, 20 à 25. — Turonien : Bains de Rennes.

MM. Edwards et Haime rapportent encore aux Trochosmilies pédicellées les fossiles suivants, qui sont peu connus et douteux.

24. *TURBINOLIA ARCOTENSIS*, Forbes, *Transac. géol. soc.*, t. VII, pl. 19, fig. 9. — *Ellipsosmilia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — Sémonien : Pondichéry.

25. *CARYOPHYLLIA GLOBOSA*, Michelin, pl. 8, fig. 4. — Turonien : Uchaux.

26. *ELLIPSOSMILIA SUBRUDIS*, d'Orbigny, *Prod.* — Turonien : Uchaux.

27. *ACROSMLIA CORALLINA*, d'Orbigny, *Prod.* — Corallien : La Rochelle, Pointe-de-Ché.

AA. Base largement fixée. a. Polypier très-comprimé.

28. *T. BOISSYANA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 242. — *Turbinolia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 65, fig. 1. — *Ellipsosmilia id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Polypier plus large que haut, comprimé; côtes fines et serrées; 7 cycles complets; cloisons principales épaisses. Haut., 80 mill.; grand axe, 90; petit, 30; largeur du pédoncule, 12. — Turonien : Gosau, Corbières, etc.

29. *T. PATULA*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 242. — *Turbinolia id.*, Michelin, pl. 65, fig. 3. — *Lasmophyllia id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Polyp. presque droit; côtes subcristiformes; 5 cycles, les 3 premiers égaux. Haut., 30 millim.; grand axe, 30; petit, 15; diamètre du pédoncule, 8. — Turonien : Les Martigues.

AA. — aa. Polypier peu comprimé.

30. *T. CRASSA*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, p. 69, 1850. — *Turbinolia cernua*, Michelin, pl. 66, fig. 1. — *Acrosmlia cernua*, d'Orbigny, *Prod.* = Polyp. subturbiné, peu courbé; côtes nombreuses et égales, on en compte 130; calice subovalaire. Hauteur, 60 mill.; diam. du calice, 40; du pédoncule, 16 à 17. — Turonien : Soulaire.

31. T.? REUSSI, Edwards et Haime, *Hist. des coral.*, p. 164, 1856. — *T. elongata*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 7, fig. 4-6. — Polyp. long et droit; calice subovalaire; côtes égales, nombreuses et granulées; 150 cloisons fortes et subégales. Rapport des axes, 1 : 1 1/2. — *Turonien* : Gosau.

32. T. VARIANS, Reuss, *loc. cit.*, pl. 6, fig. 7-11. — Polyp. de hauteur variable et droit; base large; côtes alternativement saillantes; 4 ou 5 cycles. Rapport des axes, 1 : 1 1/2. — *Turonien* : Gosau.

33. T.? ELONGATA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 50, 1851. — *Acrosmilia*, *id.*, d'Orbigny, *Prod.* — Polypier étroit, largement fixé; calice circulaire (caché par la roche); 12 côtes plus saillantes que les autres. Haut., 70 mill.; diam. du calice, 25. — *Corallien* : Wagnon.

ESPÈCES DOUTEUSES.

MM. Edwards et Haime rapportent encore au genre *Trochosmilia* les fossiles suivants, qui sont très-peu connus.

34. TURBINOLIA INAURIS, Morton, *Syn.*, p. 80, pl. 15, fig. 21. — *Senonien* : Alabama.

35. ACROSMILIA VARUSENSIS, d'Orbigny, *Prod.* — *Turonien* : La Malle.

36. ELLIPSOSMILIA CARANTONENSIS, d'Orbigny, *id.* — *Turonien* : Marton, etc.

37. ACROSMILIA CONICA, d'Orbigny, *id.* — *Turonien* : Soulage.

38. ELLIPSOSMILIA OBLIQUA, d'Orbigny, *id.* — *Turonien* : Martigues Soulage.

39. ELLIPSOSMILIA BOURGEOISI, d'Orbigny, *id.* — *Senonien* : Villavard.

40. ELLIPSOSMILIA SUPRACRETACEA, d'Orbigny, *id.* — *Danien* : Environs de Paris.

41. ELLIPSOSMILIA MEUDONENSIS, d'Orbigny, *id.* — *Danien* : Meudon.

42. CARYOPHYLLIA LIASICA, Quenstedt, *Hand. der Petref.*, p. 654, pl. 58, fig. 21, 1852. — *Lias* : Hattenhofen.

GENRE XXVI. — CYLICOSMILIA.

Cylicosmilia, Edwards et Haime, *Compte rendu*, t. XXVII, p. 466, 1848.

Caryophyllia (pars), DeFrance, *Dict. des sc. nat.*, t. VII, p. 192, 1817.

Polypier fixé; cloisons débordantes; columelle spongieuse, bien développée; muraille nue; côtes simples; traverses abondantes.

C. ALTAVILLENSIS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 233, 1848. — *Caryophyllia id.*, DeFrance, 1816. — Michelin, pl. 74, fig. 2, 1847. — Polypier élevé, subturbiné; côtes inégales et serrées; calice subelliptique; 5 cycles complets; traverses obliques et divisées. Haut., 40 mill.; diam. du calice, 20. — *Parisien* : Hauteville.

GENRE XXVII. — PLACOSMILIA.

Placosmilia, Edwards et Haime, *Compte rendu*, *loc. cit.*, p. 467, 1848.

Turbinolia (pars), Michelin, *Icon. Zooph.*, p. 37, 1841.

Polypier subturbiné et libre; calice ovulaire; columelle lamel-

laire ; cloisons peu ou point débordantes ; muraille nue ; côtes simples et distinctes dès la base du polypier.

a. *Polypier droit.*

1. P. CUNEIFORMIS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 234, 1850. == Polyp. plus large que haut, comprimé, deltoïde ; 176 côtes fines et serrées ; columelle large et mince ; cloisons alternativement inégales. Haut. 33 mill. ; grand axe, 45 ; petit, 12. — *Turonien* : Corbières, Gosau, Les Martigues.

2. P. CYMBULA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Turbinolia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 64, fig. 1. == Polyp. large et épais ; columelle mince ; 176 cloisons inégales. Hauteur, 50 mill. ; grand axe, 90 ; petit, 40. — *Turonien* : Soulage.

3. P. ELONGATA, Edwards et Haime, *loc. cit.* == Polypier en cône allongé et comprimé ; côtes fines, subégales ; 5 cycles complets. Hauteur, 80 mill. ; grand axe, 40 ; petit, 28 ; largeur de la columelle, 18. — *Turonien* : Morée.

4. P. ANGUSTA, Reuss, *loc. cit.*, pl. 5, fig. 6-9. == Polyp. long et grêle ; 96 côtes fines, inégales et granulées. Rapport des axes, 1 : 2. — *Turonien* : Gosau.

b. *Polypier courbé à la base dans le sens du petit axe.*

5. P. PARKINSONI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 235. — *Turbinolia rudis*, Michelin, *Icon.*, pl. 4, fig. 3. — *Placosmilia rudis*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *T. Consobrina*, Reuss, *loc. cit.*, 1854. == Polypier allongé en cône comprimé ; côtes fines et bien séparées ; 5 cycles complets, les 3 premiers subégaux. Hauteur, 60 ou 70 mill. ; grand axe, 40 ; petit, 20. — *Turonien* : Gosau, Uchaux., etc.

6. P. NYSTI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 45, 1851. == Polyp. allongé en cône comprimé ; côtes fines et granuleuses ; 5 cycles complets. Hauteur, 20 mill. ; grand axes. 15 ; petit, 10. — *Terrains tertiaires* : Obourg, près de Mons.

bb. *Polypier courbé dans le sens du grand axe.*

7. P. ARCUATA, Edwards et Haime, *loc. cit.* == Polyp. allongé et comprimé ; côtes inégales ; les 24 principales visibles depuis la base en forme d'arrêtes fines, les autres moins marquées ; columelle très-mince ; 5 cycles complets. Haut., 40 millim. ; grand axe, 25 ; petit, 10. — *Turonien* : Bains de Rennes.

8. P. CORALLINA. Polypier en cône allongé et peu comprimé ; côtes alternativement grosses et petites, toutes distinctes depuis la base ; columelle assez forte et large de 5 à 6 mill. ; cloisons assez minces, quelques-unes se courbent en arrivant près de la columelle ; 12 grandes cloisons, 12 moyennes, 24 petites et 48 rudimentaires (5 cycles complets). Hauteur du pol., 50 mill. ; grand axe, 21 ; petit, 17. — *Corallien* : Charcennes.

M. d'Orbigny cite encore le fossile suivant, sans le décrire :

9. P. CARUSENSIS, *Prod.*, t. II, p. 276. — *Sénonien* : Villavard (Loiret-Cher).

GENRE XXVIII. — CÆLOSMILIA.

Cælosmilia, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, p. 25, 1850.

— *Cyclosmilina (pars)*, d'Orbigny, *Note sur les pol. foss.*, p. 6, 1849, *Prod.*, 1850.

Monocarya, Lonsdale, in Dixon, *Géol. and foss. etc.*, 1850.

Polypier subturbiné peu comprimé, fixé ou pédicellé; muraille nue; côtes droites non ramifiées; cloisons larges et débordantes; columelle nulle; traverses peu nombreuses.

Ce genre, très-voisin des *Trochosmilies*, n'en diffère que par la rareté de son endothèque.

a. 5 Cycles cloisonnaires incomplets.

1. C. FAUJASI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 49, 1851. — *Parasmilina id.*, *Ann. loc. cit.*, p. 245. — *Cyclosmilina id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier courbé et allongé; côtes peu distinctes, mais se montrant dès la base; 4 cycles et des cloisons du 5^e dans une moitié de deux systèmes. Hauteur, 40 mill.; diam. du calice, 20. — *Sénonien* : Ciply.

b. 4 Cycles complets.

2. C. PUNCTATA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Cyclosmilina id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier court, turbiné, à peine courbé; côtes subégales et granulées; 4 cycles complets. Haut., 20 mill.; diam. du calice, 18. — *Sénonien* : Ciply.

3. C. LAXA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, p. 52, pl. 8, fig. 4, 1850. — *Monocarya centralis*, Lonsdale in Dixon, *loc. cit.*, pl. 18, fig. 13, 1850. = Polypier encore un peu courbé; côtes distinctes depuis la base et écartées; 4 cycles de côtes et 3 cycles seulement de cloisons. Hauteur, 30 mill.; diamètre du calice, 18; intervalle des cloisons, 2. — *Sénonien* : Norwich.

4. C. EDWARDSI, d'Orbigny, *Prod.*, t. II, p. 276, 1850. — Ne diffère du précédent que par sa forme grêle et allongée. — *Sénonien* : Sézanne.

ESPÈCES DOUTEUSES.

5. C.? ATLANTICA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 49. — *Cyclosmilina id.*, d'Orbigny, *Prod.*, t. II, p. 276. — *Sénonien* : Timbe-Creek.

6. C.? EXCAVATA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, pl. 179, t. II, 1856. — *Turbinolia id.*, Quenstedt, *Hand. der Petref.*, pl. 59, fig. 1. 1852. — *Sénonien* : Rügen, Moen.

7. C.? RADICATA, Edwards et Haime, *loc. cit.*, *Lobophyllia id.*, et *Coarctata*, Quenstedt, *loc. cit.*, pl. 61, fig. 23 et 24. — *Corallien* : Natheim.

GENRE XXIX. — PARASMILIA.

Parasmilina, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, p. 25, 1850. — *Parasmilina (pars)*, *Comp. rendus*, t. XXVII, p. 479, 1848. — *Cyclosmilina (pars)*, d'Orbigny, 1849.

Polypier allongé, turbiné et fixé; accroissement souvent intermittent; columelle spongieuse; cloisons débordantes et granulées; muraille nue; côtes simples et peu granuleuses; traverses rares et profondes.

A. 3 Cycles cloisonnaires complets.

1. P.? SERPENTINA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 8, fig. 3. == Polypier cylindrique, grêle et courbé; côtes droites et inégales; columelle bien développée; longueur du Polyp., 45 mill.; diam. du calice, 7. — *Sénonien* : Bromley (Kent.).

2. P.? RUDIS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.* — *Cyclommilia* id., d'Orbigny, *Prod.* — *Anthophyllum rude*, Reuss, *Kreideform. Bæhm.*, pl. 14, fig. 22. == Polyp. en forme de coupe; côtes indistinctes; 38 cloisons alternativement inégales. — *Sénonien* : Bilin.

B. 4 Cycles complets. b. Côtes inégales.

3. P. CENTRALIS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., p. 244. — *Britt. foss. corals*, pl. 8, fig. 1. — *Caryophyllia* id., Fleming, 1828. — Mantell, 1829. — Phillips, 1829. — *Turbinolia excavata*, Hagenow, 1839. — *T. centralis*, Römer, 1846. — *Monocarya* id., Lonsdale, loc. cit., 1850. == Polypier turbiné et droit; côtes droites et serrées, les plus fortes correspondent aux cloisons primaires; columelle bien développée; cloisons inégales selon les ordres. Haut., 20 mill.; diam. du calice, 10. — *Sénonien* : Kent, Sussex, Sézanne.

4. P. GRAVESANA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., p. 245, — *Cyclommilia Gravesii*, d'Orbigny, *Prod.*, t. II, p. 276. == Polypier en cône, peu allongé et courbé; côtes fines et distinctes; calice circulaire et penché. Hauteur, 20 mill.; diam. du calice, 8. — *Sénonien* : Châlons-sur-Marne, Bauvais.

5. P. MANTELLI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 8, fig. 2. == Polyp. droit, turbiné et largement fixé; côtes étroites, échinulées et crépues; des rudiments de traverses exothécales entre les côtes; cloisons larges et minces. Hauteur, 20 mill.; diamètre du calice, 11. — *Sénonien* : Bromley.

6. P. FITTONI, Edwards et Haime, loc. cit., pl. 9, fig. 2. == Polypier allongé et très-courbé; côtes larges et peu serrées; calice peu profond; columelle large. Longueur du polyp., 50 mill.; diamètre du calice, 16. — *Sénonien* : Norwich.

B. — bb. Côtes subégales.

7. P. CYLINDRICA, Edwards et Haime, loc. cit., pl. 8, fig. 5. == Polyp. allongé, cylindroïde, peu courbé; côtes minces et flexueuses; columelle bien développée; cloisons primaires et secondaires égales et un peu flexueuses; des traverses exothécales rudimentaires. Hauteur présumée, 70 mill.; diam. du calice, 18. — *Sénonien* : Norwich, Daruss (Westphalie).

8. P.? ELONGATA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., p. 246, 1848. — *Cyclommilia* id., d'Orbigny, *Prod.* == Polypier cylindro-cônique, peu courbé; côtes égales et finement granulées; columelle rudimentaire. Hauteur, 20 mill.; diam. du calice, 18 mill. — *Sénonien* : Ciply.

C. Plus de 4 cycles.

9 P.? BOUEI, Reuss, *Denks. der Wiener acad.*, t. VII, p. 58, pl. 7, fig. 16-17. == Polypier droit et turbiné; côtes fines, subégales; columelle papilleuse bien développée, de 70 à 90 cloisons minces, subégales et granulées. — *Turonien* : Gosau.

GENRE XXX. — LOPHOSMILIA.

Lophosmilia, Edwards et Haime, *Compt. rendus, loc. cit.*, p. 467, 1848.

Caryophyllia, Michelin, *Icon. Zooph.*, p. 198, 1845.

Lophosmilia et *Actinosmilia*, d'Orbigny, *Note sur les pol. foss.*, p. 6, 1849.

Polypier subturbiné et fixé; cloisons très-débordantes et granulees; columelle lamellaire peu étendue; muraille nue; côtes simples; traverses peu abondantes et rudimentaires.

Ce genre devra probablement rentrer dans la famille des *Turbinoliens*.

L. CENOMANA. Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat, loc. cit.*, p. 247, 1849. — *Caryophyllia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 60, fig. 8. — *Actinosmilia id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — Polyp. droit et un peu renflé au-dessous de ses bords calicinaux; côtes très-fines; 4 cycles complets; cloisons droites et inégales. Hauteur, 15 millim.; grand axe, 10; petit, 7 ou 8 — Turonien : Le Mans.

VI^e Famille. — Pleurosmiliens.

TROCHOSMILIACÉES (*pars*), Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, 1856.

Cloisons entières peu ou point débordantes; muraille recouverte d'une forte épithèque qui atteint et dépasse quelquefois le bord du calice; des traverses abondantes.

GENRE XXXI. -- EPISMILIA.

Polypier libre ou adhérent, trochoïde ou subcylindrique; cloisons larges et entières; columelle nulle; espace columellaire allongé; muraille couverte d'une épithèque membraniforme complète, formant des bourrelets transversaux.

Nous avons été forcé de créer un nom de genre nouveau pour les fossiles que nous allons décrire ici, car le genre *Montlivaltia*, de Lamouroux, qui a été fondé pour un fossile dont on croyait les cloisons entières, ne renferme maintenant que des polypiers simples à cloisons dentées, auxquels on a réuni toutes les anciennes *Thécophyllies*. M. Etallon (1) a trouvé dans le corallien du Haut-Jura deux fossiles qui présentent les caractères de nos *Epismilies* et pour lesquels il a rétabli le genre *Ellipsosmilia*, de A. d'Orbigny.

(1) M. Etallon, qui va bientôt faire paraître un mémoire sur les fossiles coralliens du Haut-Jura, où se trouve la description d'un assez grand nombre de polypiers, a bien voulu nous communiquer son manuscrit avant de le livrer à la Société d'Emulation du Doubs.

Nous ne comprenons pas comment cet auteur a pu commettre une pareille erreur, car le genre *Ellipsosmilia*, a été créé pour des Trochosmilies à calice ovale et à columelle creuse, mais sans trace d'épithèque.

1. E. HAIMEI. = Polypier trochoïde et adhérent; épithèque forte, complète et dépassant le bord du calice; 5 cycles complets et le commencement d'un 6^e; les cloisons des 1^{er}, 2^e et 3^e cycles ont le bord supérieur arqué, tranchant et entier; leur bord interne est un peu renflé et ondulé. Les cloisons des autres ordres présentent à leur bord interne des dentelures régulières qui indiquent qu'elles n'ont pas encore atteint leur complet développement. On compte en tout 120 cloisons. Hauteur du polypier, 70 mill.; grand axe, 52; petit, 45. — *Corallien*: Champlitte.

2. E? EXCAVATA. — *Ellipsosmilia id.*, Etallon, *Etudes Paléont. sur le Haut Jura*. = Polyp. droit, pédonculé. Calice elliptique et profond, 4 cycles et le commencement d'un 5^e; espace columellaire allongé. Haut. 45 mill.; grand axe, 24; petit, 19. — *Corallien*: Valfin.

3. E? EXCELSA. — *Ellipsosmilia id.*, Etallon, *loc. cit.* = Polyp. allongé à base étroite. Calice elliptique. Cloisons inégales selon les ordres. Haut 70 à 80 mill.; grand axe, 23; petit, 20. — *Corallien*: Valfin.

GENRE XXXII. — PLEUROSILIA.

Pleurosilia, E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. géol. de France*, 2^e série, t. XIII, p. 853, 1856.

Polypier peu ou point comprimé. Cloisons entières généralement épaisses. Columelle aplatie, rarement ronde, saillante et toujours unie intimement à une grande cloison plus développée que les autres. Muraille recouverte d'une forte épithèque, qui souvent est débordante. Type hexaméral.

a. Plus de cinq cycles cloisonnaires.

1. P. GRANDIS, E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. géol. loc. cit.* = Polyp. plus large que haut. Calice subcirculaire. Bourrelets d'accroissement bien marqués, 5 cycles et la moitié du 6^e (144 cloisons). Les cloisons des trois premiers cycles subégales. Haut. 30 mill.; diam. du calice 50 mill. — *Portlandien*: Mantoche (Haute-Saône).

2. P. CORALLINA, Etallon, *loc. cit.*, = Polyp. cône; largement fixé. Calice un peu comprimé. Cloison inégales selon les ordres; 5 cycles et des cloisons d'un 6^e dans quelques uns des systèmes. Haut. 40 à 50 mill.; grand axe, 40; petit, 36. — *Corallien*: Valfin.

b. Cinq cycles complets seulement.

3. P. CYLINDRICA, E. de Fromentel, *loc. cit.* = Calice circulaire. Columelle saillante et large de 8 mill.; cloisons minces aux deux extrémités et renflées dans leur partie moyenne. Celles qui avoisinent la cloison columellaire sont un peu infléchies vers elle; 5 cycles complets, les cloisons des 3 premiers cycles subégales. Diam. du calice, 38 à 40 mill. — *Portlandien*: Mantoche.

4. *P. ELONGATA*, E. de Fromentel, *loc. cit.*, 1856 (1) = Polyp. allongé subcylindrique; calice rond; 5 cycles de cloisons, celles des 3 premiers cycles égales; les cloisons sont droites, assez minces sur toute leur largeur. Hauteur probable, 1 décim.; diam. du calice, 32 mill. — *Portlandien*: Mantoche.

5. *P. SCAPHIUM*, = Polypier plus large que haut, convexe en-dessous, épithèque interrompue et laissant ça et là voir les côtes, selon une ligne circulaire; calice ovale; cloison columellaire oblique sur la ligne du grand axe; cinq cycles complets, les 2 premiers cycles égaux; cloisons minces et écartées. Haut. du polypier, 23 à 25 mill.; grand axe, 42; petit, 35. — *Portlandien*: Mantoche.

c. Quatre cycles et le commencement d'un cinquième.

6. *P. PORTLANDICA*, E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. géol. loc. cit.* — *P. compressa*, E. de Fromentel, *id.*, = Polypier turbiné, présentant de gros plis transversaux; calice peu comprimé; cloison columellaire un peu inclinée sur le grand axe; 4 cycles et $\frac{3}{4}$ du 5^e (en tout 84 cloisons), cloisons minces et écartées; épithèque épaisse. Haut. probable, 35 mill.; grand axe, 34; petit, 30. — *Portlandien*: Mantoche.

7. *P. MARCOU*, Etallon, *loc. cit.* = Polypier droit et élevé; calice elliptique; cloisons peu serrées et très-épaisses; 4 cycles et des rudiments d'un 5^e; columelle forte et large d'un centim. Hauteur, 80 mill.; grand axe, 40; petit, 30. — *Corallien*: Valfin.

d. Quatre cycles complets.

8. *P. GRACIOSA*, E. de Fromentel; *loc. cit.*, 1856. = Polyp. droit, trochoïde, et rétréci au sommet d'un quart de son diamètre; calice ovale; cloisons serrées et épaisses, les cloisons des 2 premiers cycles égales, les autres inégales selon les ordres. Largeur de la columelle, 7 mill. Hauteur du polyp., 45; grand axe, 25; petit, 18. — *Portlandien*: Mantoche.

9. *P. IRRADIANS*, E. de Fromentel, *loc. cit.*, 1856. = Calice subovale. Columelle comprimée, forte et saillante; 24 cloisons égales alternant avec 24 plus petites; grand axe, 30 mill.; petit, 25. — *Portlandien*: Mantoche.

10. *P. STYLIFERA*, E. de Fromentel, *loc. cit.*, 1856. = Calice à peu près rond, cloisons minces; columelle saillante et presque ronde, 12 grandes cloisons, 12 moyennes et 24 petites; épithèque débordante. Diamètre du calice 27 à 28 mill. — *Portlandien*: Mantoche.

Nous devons encore ici citer un fossile très-voisin des Pleurosmilies, mais qui en diffère par le développement de 3 cloisons principales (type triméral), unies à une columelle en pyramide triangulaire, nous avons donné à ce fossile le nom de *TRISMILIA TRIANGULARIS*; il est aussi de l'étage Portlandien de Mantoche.

GENRE XXXIII. — PEPLOSMILIA.

Peplosmilium, Edwards et Haime, *Brit. fos. corals.*, p. 25, 1850.

Polypier fixé, cylindrique ou turbiné et entouré d'une épithèque

(1) Le *P. communis* que nous avons décrit séparément en 1856, doit être réuni au *P. elongata*.

membraniforme complète. Columelle lamellaire, cloisons larges et granuléés; traverses abondantes et bien développées.

a. 4. *Cycles complets.*

1. P. CORALLINA. = Polypier subturbiné. Calice ovale; cloisons larges et non débordantes; columelle mince et un peu saillante; 12 grandes cloisons, 12 moyennes et 24 petites. Epithèque forte et formant des bourrelets transversaux. Hauteur du polypier, 45 mill.; grand axe, 30; petit, 25. — *Corallien* : Betaincourt (Haute-Marne).

b. 4. *Cycles et le commencement d'un cinquième.*

2. P. AUSTENI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, p. 57, pl. 10, fig. 1, 1850. = Polypier cylindrique; épithèque plissée; 4 cycles et le 5^e rudimentaire : les cloisons des 2 premiers cycles égales; elles sont minces, serrées et un peu courbées vers le sommet de la columelle. Hauteur, 35 mill.; diam. de calice, 32. — *Turonien* : Haldon.

c. 5. *Cycles complets.*

3. P. PORTLANDICA, E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. géol. de France*, loc. cit., p. 856, 1856. = Calice comprimé; cloisons minces et assez serrées, on en compte 24 grandes, 24 moyennes et 48 petites (96 cloisons). La columelle est mince et large de 6 mill.; grand axe du calice, 22; petit, 17. — *Portlandien* : Mantoche.

GENRE XXXIV. — BLASTOSMILIA.

Blastosmilia, Etallon; loc. cit.

Polypier allongé, un peu arqué à la base et subcylindrique. A une certaine époque de son développement, le bord calicinal se renverse sur deux ou trois points de la circonférence par l'effet d'un bourgeonnement marginal, et donne naissance à des polypières nouveaux qui restent pendant quelque temps unis au polypier souche. Bientôt les nouveaux polypiers se détachent et deviennent libres; le polypier souche peut continuer à s'accroître et à donner naissance jusqu'à trois lignées de polypiers. Les traces d'adhérence ne s'effacent pas complètement et sont représentées à la surface de la muraille par des tubercules saillants et aplatis au sommet. Le calice est rond et profond; les cloisons sont faiblement débordantes et assez épaisses; columelle comprimée assez forte; traverses peu abondantes; épithèque complète à bourrelet d'accroissement visible et recouvrant des côtes serrées et subégales.

1. B. PERRONI. = Polypier peu arqué à la base et assez trapu; calice rond et profond; columelle forte, saillante et très comprimée; cloisons relativement épaisses et bien développées; 4 cycles complets (48 cloisons), les cloisons des deux premiers cycles subégales. Diamètre du calice 10 mill., hauteur du Polypier 15. — Ce fossile a été trouvé par M. Perron dans les assises inférieures de l'étage Kimmeridgien de la Haute-Saône.

2. P. FROMENTELI, Etallon, loc. cit. — Ce fossile diffère du premier par son calice un peu moins large, sa forme plus allongée et 3 lignées

de polypiers, tandis que le premier n'en présente que 2. — *Corallien* : Valfin, Haut-Jura.

GENRE XXXV. — AXOSMILIA.

Axosmilia, Edwards et Haime, *Compte-rendu*, loc. cit., p. 467, 1848. — *Caryophyllia*, Michelin, *Icon. Zooph.*, p. 9, 1840.

Polypier allongé turbiné et libre. Calice circulaire et profond; columelle styloforme et forte; cloisons non débordantes et soudées à la columelle. Muraille recouverte d'une épithèque complète qui forme des plis transversaux; traverses peu nombreuses.

a. 3 Cycles et des cloisons d'un quatrième.

1. A. EXTINCTORIUM, Edwards et Haime, *Ann. de sc. nat.*, loc. cit., p. 262, 1849. — *Caryophyllia*, id., — Michelin, *Icon.*, pl. 2 fig. 3^a. = Polyp. enveloppé d'une épithèque complète; 3 cycles et la moitié du 4^e; les cloisons tertiaires se soudent aux secondaires près de la columelle. Hauteur, 25 mill. — *Bajocien* : Croizile; Conlie.

b. Quatre cycles complets.

2. A. WRIGHTI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 27, fig. 6, 1851. = Polypier turbiné, à base grêle. Hauteur 23; diamètre du calice 13 mill. — *Bajocien* : Dundry; Cheltenham.

c. 4 Cycles et des cloisons rudimentaires d'un 5^e.

3. A. MULTIRADIATA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., p. 262. — *Caryophyllia extinctorium (pars)* Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 3^b, (non 3^a), 1840. Cette espèce diffère des précédentes par sa taille un peu plus forte et ses cloisons plus nombreuses. — *Liasien* : Cursy (Calvados).

VII^e Famille. — Lithophylliens.

LITHOPHYLLIACÉES (*pars*), Edwards et Haime, *Hist. nat. du coral.*, p. 287, 1856.

Monastrées ayant les chambres viscérales divisées par des traverses lamellaires. Cloisons dentées surtout vers le centre; muraille bien développée.

GENRE XXXVI. — MONTLIVAUTIA.

Montlivaultia, M'Coy in Edwards et Haime, loc. cit., p. 296, 1856.

Montlivaultia, Lamouroux, 1821. *Expos. des genres de Polypiers*, p. 78.

Lasmophyllia, *Ellipsosmilia (pars)*, *Perismilia*, *Polyphyllia*, *Coryphyllia*, d'Orbigny, *Note sur les pol. fos.* p. 5, 6, 8, 1849.

Polypier libre, pédicellé ou largement fixé; muraille cylindrique, turbinée ou discoïde; calice rond ou ovale, profond ou superficiel; columelle nulle; espace columellaire arrondi ou allongé; cloisons

larges, généralement nombreuses et régulièrement dentées; épithèque forte, membraniforme et quelquefois débordante. Cet organe est très-fragile lorsqu'il n'adhère pas directement à la muraille et il se détache facilement des côtes qu'il recouvre pour peu que celles-ci soient assez développées. Les traverses sont fortes et nombreuses.

A. *Espace columellaire arrondi ou réduit à un point.*

B. *Polypier libre et dépourvu de pédicelle.*

a. *Muraille élevée.* — b. *5 Cycles cloisonnaires.*

1. M. LABECHEI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 26, fig. 5. — M. *decipiens* M' Coy, 1848. = Polypier très-court; calice convexe; cloisons droites, serrées, débordantes, les primaires plus développées que les autres; 5 cycles assez souvent incomplets. Hauteur, 10 mill.; diam. du calice, 20. — *Bajocien*: Dundry; Metz, etc.

2. M. CARCARENSIS, d'Archiac et J. Haime, *Anim. foss. de l'Ind.*, p. 191, 1853, — *Cyclotiles id.*, Michelotti, 1847, = Polyp. conico-convexe; épithèque ne montant qu'à la moitié de la hauteur du polypier; 5 cycles complets, les deux premiers égaux. Hauteur, 30 mill.; diam., 60. — *Parisien*: Carare.

3. M. MONTISCLARI. = Polypier turbiné et libre; calice subcirculaire et profond; 96 cloisons, celles des 3 premiers cycles subégales. Diam. du calice 25 mill.; hauteur 25. — *Corallien*: Champlitte.

a. — bb. *4 Cycles cloisonnaires.*

4. M. MINOR. = Polypier petit, régulièrement turbiné. Epithèque forte et n'atteignant que la moitié de la hauteur de la muraille; 48 cloisons inégales selon les ordres; calice circulaire et assez profond. Haut., 8 mill.; diam. du calice 8. — *Corallien inférieur*: Champlitte.

aa. *Muraille horizontale.* — c. *6 Cycles cloisonnaires.*

5. M. HAIMEI, Chapuis et Delwaque, *Mém. Cour. par l'acad. de Belg.*, pl. 38, fig. 5. — *Cyclotiles granulatus*, Quenstedt, *Handb. der Petref.*, pl. 50, fig. 21. = Polyp. discoïde; épithèque mince; calice circulaire peu convexe; 6 cycles; les cloisons des deux premiers égales, les tertiaires en différant peu. Haut., 3 à 5 mill.; largeur, 25. — *Lias*: Jamoigne

aa. — cc. *5 Cycles cloisonnaires et des cloisons d'un 6^e.*

6. M. BORMIDENSIS, Edwards et Haime, *Hist. nat. du coral.*, t. II, p. 324, 1856. — Les cloisons des 1^{er} et 2^e cycles subégales; les autres plus petites. Hauteur, 10 mill.; largeur, 40. — *Fatunien*: Dego, vallée de la Bormida.

7. M. DISCIFORMIS, Etallon, *loc. cit.* = Polyp. discoïde à plateau concave; épithèque bien développée et montant assez près du bord calcinal; fossette peu marquée; 5 cycles et des cloisons d'un 6^e dans un des systèmes. Hauteur, 2 1/2 mill.; largeur, 12. — *Corallien*: Valfin.

aa. — ccc. 5 Cycles seulement.

8. M. LENS, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 26, fig. 7 et 8, 1851. — Les cloisons des 2 premiers cycles égales; le 5^e rudimentaire, les dents des cloisons principales sont longues et simulent des palis. Haut., 8 mill.; largeur, 18. — *Bajocien*: Charlecomb et English Batch.

9. M. TROUVILLensis, d'Orbigny, *Prodrome*, t. 1, p. 384; 1850. — 48 cloisons subégales, séparées par un nombre égal de petites. Hauteur, 6 mill.; largeur, 35. — *Corallien*? (Oxfordien): Trouville.

aa. — cccc. 4 Cycles seulement.

10. M. DEPRESSA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 29, fig. 5, 1851. — Cloisons minces, droites, inégales, formant 4 cycles complets. Hauteur, 7 à 8 mill.; largeur, 25 mill. — *Bajocien*: Wotton-under-Edge; Marquises.

11. M. ORBITOLITES, d'Orbigny, *Prod.* t. 1, p. 292, 1850. — *Cyclolites* id., Michelin, pl. 2, fig. 6. — Environ 40 cloisons alternant avec autant de petites. Largeur du calice 10 mil. — *Bajocien*: Bayeux, etc.

A. — BB. *Polypier pédicellé, adhérent dans le jeune âge, mais devenant libre ensuite.*

a. 5 Cycles et le commencement d'un 6^e.

12. M. TROCHOÏDES, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 255. — *Brit. foss. corals.*, pl. 27; fig. 2 et 4, 1851. — *M. Caryophyllata*, Bronn, 1836-37. = Polyp. conique, droit; épithèque forte, incomplète en haut; calice circulaire; cloisons minces; celles des 3 premiers cycles égales; fossette légèrement elliptique. Haut., 40 mill.; diam., 35. — *Bajocien*: Charlecomb.

13. BROGNIARTANA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.* = Diffère de la précédente par sa forme plus allongée, un peu courbée et ses cloisons plus épaisses. Haut., 60 mill.; largeur, 40. — *Parisien*: Veronne.

14. M. GRACILIS, Munster, *Beit. zur Petref.*, 4^e part., pl. 2, fig. 5, 1841. = Environ 108 cloisons, minces, serrées. Polyp. turbiné; calice convexe. Haut., 20 mill.; largeur, 10. — *Saliférien*: St-Cassian.

15. M. GRANULOSA, Munster, *loc. cit.*, pl. 2, fig. 10. = Polyp. turbiné, droit; calice circulaire, convexe; plus de 100 cloisons serrées et peu inégales. Hauteur, 15 mill.; largeur 8 à 9. — *Saliférien*: St-Cassian.

16. M? CRENATA, Munster, *loc. cit.*, pl. 2 fig. 11. — *M. boletiformis et rugosa*, id., pl. 2, fig. 9, 12. — *Thecophyllia boletiformis et rugosa*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polyp. subprimatique, allongé; calice un peu déformé, plus de 100 cloisons, minces, flexueuses et anastomosées. Haut., 20 à 30 mill.; largeur, 10 à 15. — *Saliférien*: St-Cassian.

17. M. VASIFORMIS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 75, 1851. — *Caryophyllia* id., Michelin, pl. 19, fig. 5 (figure inexacte). — *Acrosmilina* id., d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polyp. élevé, turbiné et droit, 168 cloisons (5 cycles $\frac{3}{4}$) fines et serrées; celles des 4 premiers ordres subégales. Haut., 25 à 30 mill.; diam. du calice, 20 à 25. — *Corallien*: Damvillers; Auxerre.

aa. 6 Cycles complets.

18. M. DISPAR, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 256. — *M. obconica*, id. *ibid.*, p. 259. — *M. dispar*, id., *Brit. foss. corals.*,

pl. 14, fig. 2, 1851. — *Anthophyllum obconicum*, Goldfuss, *petref. Ger.*, pl. 37, fig. 14. — *Thecophyllia arduennensis*, d'Orbigny, et peut-être le *Lasmophyllia radisensis*, *Prod.*, 1850. = Polypier subturbiné, droit ou à peine courbé et élevé; fossette ronde et peu marquée; cloisons larges, droites et minces. Hauteur, 80 mill.; diam. du calice, 50. — *Corallien*: Malton; Natheim; Wagnon, etc.

19. M. CYTINUS. = Polyp. d'abord trochoïde, puis prenant bientôt un grand développement en largeur; la muraille d'abord droite devient par suite de ce développement presque horizontale en haut; épithèque bien développée et incomplète. Calice circulaire, superficiel; fossette ronde et peu profonde; 192 cloisons, larges et inégales; celles des 4 premiers cycles subégales. Hauteur totale du polypier, 25 à 30 mill.; largeur, 50. — *Corallien inf.*: Charcenne.

aaa. 5 Cycles complets. — b. La hauteur du polypier égale ou supérieure à la largeur du calice.

20. M. LOTHARINGA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 254. = Pol. turbiné et courbé à la base; calice circulaire; cloisons serrées, minces; celles des 3 premiers cycles peu inégales. Haut., 40 mill.; diam. du calice, 25 mill. — *Corallien*: Maxey-sur-Vaise.

21. M. SARTHACENSIS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 74. — *M. infundibulum* et *convexa*. — *Thecophyllia sarthacensis*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polyp. turbiné, à base courbée, épithèque plissée arrivant jusqu'au calice; cloisons minces et subégales. Largeur du calice, 20 à 30 mill. — *Bujocien*: Gueret (Sarthe).

22. M. CAPITATA, Munster, *loc. cit.*, pl. 2, fig. 6. — *Thecophyllia id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypier turbiné, pyriforme; épithèque presque complète; calice circulaire et superficiel; cloisons droites, serrées et inégales. Haut., 18 mill.; largeur, 5 à 6. — *Saliférien*: St-Cassian.

23. M. PUPOIDES, Etallon, *loc. cit.* = Polyp. cylindrique et pédicellé; épithèque forte et incomplète en haut; cloisons à bord arqué et débordantes. Haut., 15 à 25 mill.; largeur, 6 à 10. — *Corallien*: Valfin.

24. M. CHAMPLITTENSIS. = Polyp. peu élevé, aussi large que haut et turbiné jusqu'à 5 ou 6 mill. du sommet, où la muraille devient cylindrique; calice ovale peu profond; cloisons assez épaisses, peu serrées et très-inégales. Largeur du calice, 25 mill.; haut. du polypier autant. — *Corallien*: Champlitte.

25. M. TUBA. = Polyp. allongé et régulièrement courbé en forme de cornet de chasse; calice circulaire et assez profond; cloisons inégales. Haut., 45 à 50 mill.; largeur du calice 25 à 30 mill. (Echantillon mal conservé). — *Corallien*: Ecuelle (Haute-Saône).

26. M. INCUBANS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 75, 1851. — *Lobophyllia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 19, fig. 2. = Polyp. turbiné, courbé à la base et finement pédicellé; épithèque à bourrelets prononcés; cloisons fines et subégales. Largeur du calice, 20 mill. — *Corallien*: St-Mihiel.

aaa. — bb. La hauteur du polypier étant moindre que la largeur du calice.

27. M. TURBINATA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Anthophyllum turbinatum*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 37, fig. 13. = Polyp. conique, plus

large que haut ; calice circulaire assez profond ; cloisons fortes et sail-lantes ; celles des 3 premiers cycles subégales ; les autres plus petites. Hauteur, 30 à 35 mill. ; largeur, 50 à 60. — *Corallien* : Hatteim, Heidenheim.

28. M. GUETTARDI, Blainville, *Dict. des sc. nat.*, t. LX, p. 302, 1830 — Chapuis et Delwaque, *loc. cit.*, pl. 33, fig. 6, 1854. = Polyp. subturbiné pédicellé et courbé ; calice circulaire à fossette petite ; cloisons minces, débordant à peine l'épithèque et armées de pointes grêles. Haut., 15 à 20 mill. ; largeur, 35. — *Sias* : Sedan ; Jamoigne, etc.

29. M. BREVISSIMA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 253. = Polyp. droit, très-court ; épithèque complète ; calice circulaire à fossette superficielle ; cloisons minces en dedans et un peu épaisses en dehors. Haut., 2 cent. ; largeur, 3 1/2. — Fossile de ?

30. M. DEFORMIS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, p. 75, 1851. — *Cyclo/ites*, *id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 2, fig. 7. = Polyp. court et droit ; épithèque bien développée ; cloisons inégales, minces et droites ; calice oblong. Grand axe, 20 mill. ; petit 13. — *Bajocien* : Bayeux ; Moutiers, etc.

31. M. ? CELLULOSA ; Klipstein, *Beitr. zur Geol.*, pl. 20, fig. 2, 1845. = Polyp. subpédicellé, comprimé ; calice elliptique large de 15 mill. ; on distingue de 80 à 90 cloisons, elles sont minces, peu inégales, très-serrées et un peu arquées. — *Saliférien* ; St-Cassian.

aaaa. 4 Cycles et le commencement d'un cinquième.

32. M. ELONGATA, Edwards et Haime, *Hist. nat. du coral.*, p. 304, t. II. 1856. — M. Morellana, *id.*, *Pol. foss. des terr. Pal.* 1851. — *Caryophyllia elongata*, Edwards 1836. — *Caryophyllia Maureausiaca*, Michelin, pl. 17, fig. 1. — *C. Clarus*, *id.*, pl. 17, fig. 6. — *Lasmophyllia Moreausiaca*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polyp. cylindro-cônique, à peine courbé ; 72 cloisons (4 cycles et 1/2) ; celles des 3 premiers cycles subégales. Haut., 80 à 100 mill. ; diam. du calice, 40 à 50 mill. — *Corallien* : St-Mihiel ; Betaincourt (Haute-Marne).

33. M. SYCODES, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, p. 255, 1849. = Polyp. turbiné ; épithèque forte et incomplète en haut ; 4 cycles des cloisons d'un 5^e dans deux des systèmes (64 cloisons), elles sont serrées, subégales et épaisses en dehors. Haut., 35 mill. ; largeur du calice, 28. — Fossile de ?

34. M. WRIGHTI, Edwards et Haime, *Brit., foss. corals.*, pl. 26, fig. 12. = Polyp. régulièrement conique, plus large que haut ; 4 cycles 1/2 ; cloisons alternativement grandes et petites. Haut., 25 mill. ; diam. du calice, 45. — *Bajocien* : Cheltenham.

aaaaa. 4 Cycles seulement.

35. M. GRADATA. = Polyp. court et large, accroissement régulièrement intermittent, indiqué par un accroissement rapide en largeur, il en résulte des degrés en formes d'escalier. Calice circulaire ; 48 cloisons ; celles des 3 premiers cycles subégales. Diam. du calice, 12 mill. ; hauteur, 8. — *Corallien* : Champlitte.

36. M. LUCENSIS, d'Orbigny, *Prodrome*, t. II, p. 521, 1850. = Polyp. conique ; 4 cycles ; cloisons droites et égales dans les 3 premiers cycles. Haut., 15 mill. ; largeur, 12. — *Bajocien* : Luc.

37. M. STUTCHBURYI, Edwards et Haime, *Brit. foss. coral.*, pl. 29, fig. 3, 1851. = Polyp. turbiné, peu courbé, épithèque forte et complète; cloisons inégales et épaisses, les primaires ont des dents très développées au centre du calice. Haut., 35 mill.; largeur, 30. — *Bajocien* : Nunney, près Frome?

aaaaaa. 3 Cycles et le commencement d'un quatrième.

38. M? PYGMEA, Munster, *Beitr. zur Petref.* 4^e part., pl. 2, fig. 14, 1841. — *Conophyllia id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypier grêle, conique; épithèque forte; calice circulaire; 32 cloisons droites et peu inégales. Haut., 10 mill.; largeur du calice, 3 à 4. — *Saliférien* : St-Cassian.

39. M. RADICIFORMIS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 259. — *Cyathophyllum radiforme*, Munster, *loc. cit.*, pl. 2, fig. 23. = Polyp. conique allongé et courbé; calice profond, large de 6 mill.; cloisons minces et subégales, on en compte 40. Haut., 15 à 20 mill. — *Saliférien* : St-Cassian.

40. M? RETORTA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, p. 76, 1851. — *Caryophyllia id.*, Michelin, pl. 54, fig. 4. — *Lasmophyllia id.* d'Orbigny, *Prod.*, t. I, p. 321, 1850. = Polypier droit, renflé près du calice; 281 cloisons fortes et peu inégales; calice circulaire, large 10 millim. Hauteur du polypier 20 à 30 mill. — *Bajocien* : Luc, Langrune (Calvados).

aaaaaaa. 2 Cycles seulement.

41. M. ERGUELENSIS, Edwards et Haime, *Hist. nat. du coral.*, p. 327, 1856. — *Anthophyllum erguelense*, J. Thurmman, *Abraham Gagnebin*, pl. 2, fig. 23, 1851. = Polypier petit, légèrement courbé; épithèque plissée et forte; cloisons dentées; 20 cloisons (type Pentamerale?). Haut., 10 à 12 mill.; diam. du calice, 3 à 4 mill. — *Oxfordien* : Montvonhay; Combe d'Eschert, etc.

A. — BBB. Polypier largement fixé.

a. 6 Cycles cloisonnaires.

42. M. PATELLATA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. pal.*, p. 75, 1851. — *Anthophyllum patellatum*, Michelin, pl. 50, fig. 2. — *Polyphyllia id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier court, droit et subturbiné; calice circulaire à fossette petite; cloisons minces, serrées et anastomosées. Hauteur, 20 mill.; largeur du calice, 30. — *Turonien* : Le Mans.

aa. 5 Cycles cloisonnaires.

43. M. SMITHI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 21, fig. 1, 1851. = Polypier fixé par une base un peu étalée; épithèque épaisse et complète; cloisons débordantes, droites et serrées; le 5^e cycle est quelquefois rudimentaire dans la moitié des systèmes; cloisons des 3 premiers cycles égales. Hauteur, 20 mill.; largeur, 30. — *Bathonien* : Farley; Marquises.

44. M? SE-SILIS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 76, 1851. — *Anthophyllum sessile*, Goldfuss, *Petréf. germ.*, pl. 37, fig. 15, 1829. = Polypier court, subcylindrique; épithèque n'atteignant que la moitié

de la hauteur du polypier; calice circulaire, superficiel; cloisons droites et inégales; les secondaires égales aux primaires. Hauteur, 10 à 15 mill.; diam. du calice, 25. — *Corallien*: Heersum; Thurnau.

45. M. DECIPIENS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 241, 1849. — *Anthophyllum*, *id.*, Goldfuss, pl. 65, fig. 3. = Polypier court ou élevé; épithèque épaisse et plissée; calice rond et superficiel; cloisons larges, débordantes, à bord supérieur arqué. Hauteur du polypier, de 15 jusqu'à 30 et 40 mill.; diam. du calice, 30 mill. — *Bajocien*: Plappeville-Metz; Morville-les-Vic; Mont-Argenterot.

aaa. 4 Cycles et le commencement d'un 5^e.

46. M. EXPLANATA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 76, 1851. — E. de Fromentel, *Descript. des Pol. foss. de l'Et. Neocom.*, p. 16, 1856. — *Anthophyllum explanatum*, Roemer, *Ver. des nordd. oolit.*, pl. 17, fig. 21, 1820. — *Polyphyllia explanata*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polyp. « court, conique, large de 1'', comme pentagonal à base élargie; cloisons nombreuses et alternativement inégales. » — *Néocomien*: Schandelahe; St-Dizier, etc.

aaaa. — 4 Cycles seulement.

47. M. STRIATULATA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 235, 1849. — *Caryophyllia*, *id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 50, fig. 9. = Polyp. droit, à base large, cylindro-turbiné; épithèque mince et presque complète; calice circulaire; cloisons minces, serrées et arrondies en haut. Haut., 6 à 7 mill.; diam., 5. — *Turonien*: Le Mans.

48. M. ACAULIS, Munster, *loc. cit.*, pl. 2, fig. 7. 1841. — *Acrosmilium*, *id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier petit, à base aussi large que le sommet; cloisons minces, serrées et inégales. Haut., 3 à 4 mill.; diam. du calice, 10 mill. — *Satiférien*: St-Cassian.

AA. — Espace columellaire allongé, elliptique ou linéaire.

B. Polypier libre et dépourvu de pédicelle.

a. Muraille élevée. — b. 6 Cycles cloisonnaires.

49. M. GRANTI, d'Archiac et Haime, *Anim. foss. de l'Ind.*, p. 191, pl. 12, fig. 5, 1853. = Polypier droit, court et subhémisphérique; épithèque presque complète; calice subovalaire; cloisons très-minces; celles des 4 premiers cycles peu inégales. — *Parisien*: Sincé.

50. M. SINEMURIENSIS, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier d'abord turbiné, puis cylindrique; calice rond ou subcirculaire; espace columellaire un peu comprimé; cloisons nombreuses, inégales selon les ordres, peu épaisses et garnies de dents très-fortes, on en compte 108 assez développées, séparées par autant de petites cloisons. Hauteur du polypier 35 à 40 mill.; diam. du calice, 25 à 26. — *Sinemurien*: Sémur; Avallon; Metz; etc.

a. bb. Moins de 6 cycles complets

51. M. WATERHOUSEI, Edwards et Haime, *Brit., foss. corals.*, pl. 27, fig. 7, 1851. = Polypier droit, convexe à la base; épithèque forte et incomplète; calice circulaire; fossette calicinalement oblongue; 66 cloisons minces et inégales, souvent séparées par autant de cloisons rudimentaires. Hauteur du polypier, 30 mill.; diam. du calice, 25 à 28. — *Bajocien*: Minchinhampton.

aa. Muraille horizontale. — b. 5 Cycles.

52. M. CYCLOLITOIDES, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 242, 1849. = Polypier très-court; calice circulaire ou subconvexe, cloisons droites, minces et peu inégales; haut., 7 mill.; diam. du calice. 25. — *Bajocien* : Bouxvillers (Bas-Bhin).

AA. — BB. Polypier pédicellé, adhérent dans le jeune âge, mais pouvant devenir libre ensuite.

a. 7 Cycles complets.

53. M. TRUNCATA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 75, 1851. — *Caryophyllia id.*, DeFrance, 1817. — *Caryophyllia Calvimontis*, Lamouroux, 1824. — Milne-Edwards, 1836. — *Turbinolia id.*, Michelotti, 1838. — *Caryophyllia id.*, Michelin, pl. 27, fig. 1, 1843. — *Lasmophyllia truncata*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier cylindroconique et droit; calice circulaire; cloisons minces et serrées; haut., 80 mill.; diamètre du calice, 45. — *Corallien* : Chaumont; Is-sur-Thil.

aa. 6 Cycles et le commencement du 7^e.

54. M. BAUMONTI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 74. = Polypier pédicellé, à peine courbé; cloisons minces et serrées; épithèque complète et peu plissée; haut. et diam. du calice, 55 millim. — *Rethel*.

55. M. BILOBATA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 259, — *Turbinolia id.*, Michelin, pl. 62, fig. 1. — *Perismitia id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier pédicellé, droit et comprimé; calice en forme de 8; 300 cloisons dont les principales sont épaisses et flexueuses; haut., 180 millim.; grand axe, 180. — *Parisien* : La Palarea.

56. M. REUSSI, Edwards et Haime, *Hist. nat. du coral.*, p. 312, 1846. — *M. Cupuliformis*, Reuss, *Denk. der Wien. akad.*, pl. 6, fig. 16 et 17, 1854. = Polypier droit, aussi large que haut; calice ovalaire; 220 cloisons inégales, les principales plus fortes de 4 en 4. — *Turonien* : Zlambach (Alpes orientales).

57. M. JACQUEMONTI, d'Archiac et Haime, *Anim. foss. de l'Ind.*, pl. 12, fig. 6. = Polypier pédicellé, conique, assez allongé; calice elliptique se rapprochant de la forme d'un 8; 120 cloisons bien développées, séparées par autant de cloisons rudimentaires; rapport des axes du calice, 10 : 17. — *Parisien* : Sinde.

58. M. GYENSIS. = Polypier turbiné et pédicellé; calice ovalaire et présentant, au milieu d'un calice superficiel, une fossette oblongue et étroite; 216 cloisons minces, serrées et droites; haut. du polyp., 65 mill.: grand axe, 60; petit, 50. — *Corallien* : Gy (Haute-Saône).

aaa. 6 Cycles seulement.

59. M. DELTOIDES, Edwards et Haime, *Ann. des sc. n., l. c.*, p. 257, pl. 6, fig. 3, 1849. = Polypier deltoïde, courbé dans le sens du petit axe du calice; épithèque bien développée et complète; cloisons minces et un peu débordantes; celles des 3 premiers cycles subégales; haut. du polypier, 50 mill.; grand axe, 65; petit, 25. — Fossile du département de l'Orne.

60. M. RUDIS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 258. — *Thecosmilia id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Montlivaultia id.*, Reuss, *l. c.*, pl. 6; fig. 14 et 15. = Polypier comprimé et un peu courbé à la base; épithèque forte et peu incomplète; calice elliptique; cloisons serrées,

épaisses en dehors et minces en dedans; haut., 30 à 60 millim.; grand axe, 45; petit, 25. — *Turonien* : Gosau; Uchaux, etc.

61. M. PONDEROSA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 74, 1851. — *Turbinolia Deucalionis*, Duchassaing, *Anim. Rad. de l'Ind.*, p. 14, 1850. = Polypier court et gros; calice subelliptique; cloisons serrées et minces; grand axe du calice, 120 mill. — *Terrain tertiaire* : Guadeloupe.

62. M. DILATATA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, p. 83, 1851. — *Caryophyllia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 17, fig. 4. — *Lasmophyllia id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier en cône court et large; calice subovalaire; cloisons minces et droites; celles des 4 premiers cycles subégales; haut., 35 mill.; diam. du calice, 35. — *Corallien* : St-Mihiel; Chaumont.

63. M. TENUILAMELLOSA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, p. 130, pl. 26, fig. 11. = Polypier large et court; calice subovalaire; épithèque incomplète; cloisons peu serrées, très-minces et inclinées vers le centre; celles des 3 premiers cycles égales; haut., 30 mill.; diam. du calice, 50. — *Bajocien* : Dunkerton; English-Batch.

64. M. SUBDISPAR. — *M. dispar (pars)*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, l. c., p. 256, 1849. — *Turbinolia id.*, Phillips, 1829. — *Anthophyllum obconicum*, Goldfuss, 1829. — *Turbinolia obconica*, Blainville, 1830. — *Montlivaultia obconica*, Moreausiaca et dilatata, M'Coy, 1848. — *Thecophyllia arduennensis* et *Lasmophyllia radicensis*, d'Orbigny, *Prod.*, 1859. = Polypier élevé, turbiné; calice ovalaire; fossette columellaire oblongue et restant telle quelle que soit la forme du calice; cloisons droites larges, minces et serrées; hauteur, 80 ou 85 millim.; diamètre du calice, 45 ou 50 millim. — *Corallien* : Malton; Natheim; Damvilliers (Meuse); Is-sur-Thil; Charencey; Champlitte, etc.

MM. Edwards et Haime ont évidemment réuni sous le nom de *Montlivaultia dispar*, deux espèces différentes : l'une ayant l'espace columellaire arrondi, qui est bien le *M. dispar*; l'autre conservant toujours l'espace columellaire allongé et qui est devenu notre *Montlivaultia subdispar*.

Les nombreux échantillons que nous avons étudiés avec soin, ne nous ont laissé aucun doute sur l'existence de ces deux espèces, et nous avons remarqué, pour elles comme pour toutes les autres, que la forme circulaire ou allongée de l'espace columellaire était tout à fait indépendante de la nature du calice, et même des accidents de compression qui auraient pu en modifier la configuration.

aaaa. 5 Cycles et le commencement d'un 6^e.

66. M. HIPPURITIFORMIS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, l. c., p. 254. — *Turbinolia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 65, fig. 7. — *Perismilia id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Polypier élevé, turbiné, à peine courbé; calice ovalaire; 5 cycles et des cloisons d'un 6^e; cloisons minces, droites, peu serrées; épithèque complète; haut., 80 mill.; diam. du calice, 50. — *Turonien* : Corbières.

67. P. EXCELSA. = Polypier allongé, subcylindrique; calice ovale; cloisons bien développées et soudées entre elles au centre. on en compte 120; elles sont serrées et non débordantes; haut., 80 millim.; diam. du calice, 25 sur 30. — *Corallien* : Betaincourt.

68. M. MELANIA. = Polypier pédicellé et court; muraille d'abord turbinée, puis subcylindrique; calice circulaire et peu profond, fossette calicinale petite et oblongue; 107 cloisons inégales et bien développées; haut. du polyp., 35 mill.; diam. du calice, 25. — *Corallien* : Champlitte.

69. *M. GIGAS.* == Polypier très-long, un peu comprimé et arqué à la base; calice subovalaire; 144 cloisons inégales en épaisseur et en largeur; côtes fortes, granulées et couvertes d'une épithèque mince et fragile. Haut. du polypier, 140 mill.; diam. du calice, 28 sur 30. — *Corallien* : Champlitte.

70. *M. CHARCENNENSIS.* == Polypier turbiné et légèrement comprimé; calice ovalaire, peu profond, espace columellaire allongé; 108 cloisons minces et serrées, les 24 premières plus développées et plus saillantes que les autres; traverses très-abondantes. Hauteur du polypier, environ 45 mill.; diam. du calice, 28 sur 35. — *Corallien* : Charcenne (Haute-Saône).

71. *M. CORALLINA.* == Polypier élevé, assez comprimé et ne s'accroissant pas en diamètre avec l'âge; calice un peu ovale et superficiel; 108 cloisons assez épaisses, serrées et inégales. Haut. du polypier, 70 à 90 mill.; diam. du calice, 25 sur 30. — *Corallien moyen* : Betaincourt.

72. *M. PLICATA*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 73, 1851. — *Ellipsosmilia*, id., d'Orbigny, *Prod.*, 1850. == Polypier allongé, presque droit et couvert d'une forte épithèque; calice ovale et peu profond; 120 grandes cloisons alternativement inégales et assez épaisses, séparées par autant de petites. Haut., 80 à 100 mill.; diam. du calice, 30 sur 40. — *Corallien* : St-Puits, etc.

aaaaa. 5 Cycles seulement.

73. *M. CARYOPHYLLATA*, Lamouroux, *Expos. méth. des genres de Pol.*, pl. 79, fig. 8, 9, 10, 1821. — Deslongchamps, *Encycl. Zooph.*, 1824. — Michelin, *Icon.*, pl. 54, fig. 2. — Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, p. 252, 1849. == Polypier conique, droit, un peu courbé à la base; épithèque incomplète; calice subcirculaire; 5 cycles et rarement des cloisons d'un 6°. Haut., 40 mill.; diam. du calice, 30. *Bajocien* : Caen.

74. *M. OBLIQUA*, Munster, *Beitr. zur Petref.*, pl. 2, fig. 8 et pl. 4, fig. 5, — *Thecophyllia obliqua* et *Lasmophyllia venusta*, d'Orbigny, *Prodrome*, 1850. == Polypier subturbiné, un peu courbé à épithèque complète; calice subcirculaire; 90 cloisons minces, flexueuses et serrées. Hauteur, 4 mill.; diam. du calice, 30 à 40. — *Satfréien* : Saint-Cassian.

75. *M. EUGENIA.* == Polyp. trochoïde, adhérent dans le jeune âge; calice circulaire et peu profond; 96 cloisons larges et écartées; traverses très-obliques et peu serrées. Haut. du polypier 40 mill.; diam. du calice, 35. — *Corallien inférieur* : Champlitte.

76. *M. GUERANGERI*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., p. 253. == Polypier court, libre et entouré d'une épithèque incomplète; calice circulaire; cloisons minces, peu inégales et à bord arqué en haut. Haut., 15 mill.; diam. du calice, 25. — *Turonien* : Le Mans.

77. *M. IRREGULARIS*, Edwards et Haime, loc. cit., p. 258. — *Anthophyllum dispar*, Michelin, *Icon.*, pl. 50, fig. 6. — *Lasmophyllia dispar*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. == Polypier assez élevé et un peu irrégulier; calice elliptique; cloisons inégales, les principales épaisses, les autres minces; 5 cycles. Haut., 30 mill.; grand axe, 40; petit, presque 30. — *Turonien* : Le Mans.

aaaaaa. 4 Cycles et des cloisons d'un 5°.

78. *M. SUBCYLINDRICA*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 74. *Caryophyllia*, id., Michelin, *Icon.*, pl. 17, fig. 2, 3. — *Lasmophyllia subrugosa* et *subcylindrica*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. == Polypier allongé,

légèrement courbé; calice subcirculaire; 60 cloisons droites et peu inégales. Haut., 60 à 65 mill.; largeur, 25 à 30. — *Corallien* : St-Mihiel; Oyonnax; Chatel-Censoir, etc.

79. *M. TORTUOSA*. = Polypier allongé, tortueux et pédicellé; calice subtriangulaire et rétréci; cloisons fines et assez serrées; on en compte 84. Haut., 50 à 55 mill.; diam. du calice, 18 à 20 mill. — *Corallien inférieur* : Champplitte.

80. *M. JAPHETI*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 334, *Fungia*, id., Michelotti, 1838. — *Turbinolia*, id., Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 5. = Polypier peu élevé et large; 4 cycles complets et un commencement d'un 5^e; cloisons épaisses et peu inégales. Haut., 40 mill.; grand axe, 60; petit, 40. — *Falunien* : Turin.

AA. — BBB. Polypier largement fixé.

a. 7 Cycles cloisonnaires.

81. *M. LESUEURI*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 257. — *Anthophyllum*, Lesueur, 1843. = Polypier turbiné, peu courbé; épithèque forte et complète; calice circulaire; cloisons minces, droites et peu inégales. Haut., 70 mill.; diam. du calice, 50. — *Kimmeridgien* : Cap la Hève; le Havre.

aa. 6 Cycles et des cloisons d'un 7^e.

82. *M. COMPRESSA*. = Polypier comprimé; calice elliptique et très-superficiel; cloisons minces et contournées; on en compte 288; épithèque mince et n'atteignant que la moitié de la hauteur du polypier. Haut., 30 mill.; grand axe, 50; petit, 30; largeur de la base, 25 à 30. — *Corallien* : Natheim.

aaa. 6 Cycles seulement.

83. *M. SUBTRUNCATA*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, p. 73, 1851. — *Caryophyllia truncata*, Lamouroux, 1821-1824. — *Id.*, Milne-Edwards, 1836. — *Anthophyllum truncatum*, Michelin, *Icon.*, pl. 54, fig. 3. — *Montlivaultia truncata*, Edwards et Haime, *Ann. des sc., loc. cit.* — *Lasmophyllia subtruncata*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier court, à base étalée; épithèque épaisse et incomplète; calice circulaire ou elliptique. Haut., 20 mill.; diam., 30 à 40. — *Bajocien* : Ranville.

84. *M. BONJOURI*, Etallon, *loc. cit.* = Polypier cylindroturbiné, à base étalée; épithèque forte et montant à 1 cent. du calice; calice subcirculaire; cloisons minces, celles des 3 premiers cycles subégales. Haut., 70 mill.; diam., 35. — *Corallien* : Valfin.

aaaa. 5 Cycles et des cloisons d'un 6^e.

85. *M. UNDULATA*. = Polypier comprimé, largement fixé et présentant deux dépressions latérales, ce qui donne au calice la forme de 8 élargi; calice subplane; cloisons minces et serrées; traverses abondantes; on compte 180 cloisons. Haut., 50 mill.; grand axe, 55; petit, 50. — *Corallien inférieur* : Gy (Haute-Saône).

aaaaa. 5 Cycles seulement.

86. *M. INFLATA*. = Polypier renflé au centre, rétréci à la base et au sommet; épithèque complète; calice ovalaire; 96 cloisons assez minces

un peu courbées vers le centre. Haut. du polypier, 45 mill.; grand axe du calice, 30; petit, 25. — *Corallien inférieur* : Champlitte.

87. *M. SUBEXCAVATA*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, p. 75. — *Anthophyllum excavatum*, Michelin, *Icon.*, pl. 17, fig. 10. — *Lasmophyllia subexcavata*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier court, subcylindrique, à bourrelets saillants; calice circulaire et profond; cloisons droites et subégales. Haut., 35 à 40 mill.; largeur, 40 à 45. — *Corallien* : Montsec (Meuse).

88. *M. PATERIFORMIS*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., p. 263, 1849. — *Anthophyllum pateriforme*, Michelin, *Icon.*, pl. 50, fig. 3, 1845. — *Lasmophyllia pateriformis*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier turbiné, se développant rapidement en largeur; calice circulaire; cloisons serrées, épaisses et à bord entier. Haut., 20 mill.; diam. du calice, 40. — *Turonien* : Le Mans; ile d'Aix. — Cette espèce est probablement une *Epismilie*.

89. *M. GOLDFUSSANA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc.*, loc. cit., p. 254, 1849. = Cette espèce diffère du *M. Caryophyllata*, par sa large base et son épithèque plus complète. Hauteur, 50 mill.; largeur, 30. — *Corallien* : Natheim.

aaaaaa. 4 Cycles et des cloisons d'un 5^e.

90. *M. CRASSISEPTA*. = Polyp. court et largement fixé; calice circulaire, à fossette oblongue; cloisons épaisses écartées et très-inégales; on en compte 84; traverses rares, mais bien développées. Haut., 25 mill.; diam., 30. — *Corallien* : Champlitte.

91. *M. CUPULIFORMIS*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 27, fig. 1, 1851. = Polyp. allongé, droit, subturbiné et à base élargie; épithèque complète; calice circulaire; 4 cycles et un 5^e rudimentaire; les primaires et secondaires égales. Haut., 30 mill.; largeur, 23. — *Bajorien* : Dundry.

aaaaaaa. 4 Cycles seulement.

92. *M. DETRITA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., p. 254, 1849. — *Anthophyllum detritum*, Michelin, *Icon.*, pl. 10, fig. 1. = Polyp. élevé cylindrique, à base large; calice subcirculaire; cloisons épaisses en dehors et minces en dedans, larges et peu serrées; 5 mill. ne comprennent que 3 cloisons à leur partie externe. Haut., 35 mill.; diam. du calice, 25 mill. — *Parisien* : Castel-Comberto; Turin.

93. *M. INÆQUALIS*, Edwards et Haime, loc. cit., p. 254. — *Anthophyllum inæquale*, Michelin, *Icon.*, pl. 50, fig. 4. — *Ellipsosmitia inæqualis*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Ce polypier est plus court que l'espèce précédente et a des cloisons encore plus grosses. Haut., 15 mill.; diam. du calice, 20 à 22. — *Turonien* : St-Croix, près le Mans.

Species incertæ sedis.

94. *M. VALFINENSIS*, Etallon, loc. cit. = Polyp. allongé; épithèque forte; calice elliptique; cloisons fines et un peu épaisses au centre; 5 cycles et des cloisons du 6^e; les cloisons des 4 premiers cycles égales, dents internes simulant une columelle papilleuse. Haut., 80 à 90 mill.?.; largeur du calice, 35 sur 25. — *Corallien* : Valfin.

95. *M. GRANDIS*, Etallon, loc. cit. = Polypier droit et allongé; épithèque forte; calice elliptique et profond; 6 cycles et des cloisons d'un

7^e, les cloisons primaires plus fortes que les autres ; fossette linéaire longue de 10 mill. Haut., 100 à 120 mill. ? ; largeur, 40 sur 30. — *Corallien* : Valfin.

La partie inférieure de ces deux fossiles est brisée et n'offre plus de caractère d'adhérence ou de liberté.

Nous devons encore citer les espèces suivantes qui sont mal connues et très-douteuses, que MM. Edwards et Haime regardent comme des Montlivaulties.

96. *TURBINOLIA CYCLOLITES*, Quenstedt, *id.*, *Handb. der Petref.*, pl. 59, fig. 22, 1852. — *Corallien* : Natheim.

97. *CYCLOLITES LANGI*, Quenstedt, *id.*, pl. 59, fig. 23. — *Bajocien* : Hummel.

98. *ANTHOPHYLLUM EXCAVATUM*, Roemer, 1839, — *Corallien* : Hanovre.

99. *LASMOPHYLLIA ICAUNENSIS*, d'Orbigny, *Prod.* — *Néocomien* : Cheuay.

100. *THECOPHYLLIA ELONGATA* (M. STRICTA, Edwards et Haime), d'Orbigny, *Prod.* — *Lias* : Calvados.

101. *CARYOPHYLLIA CORNUTA*, Michelin, pl. 17, fig. 5. — *Corallien* : St-Mihiel.

102. *CARYOPHYLLIA ELONGATA* (M. COQUANDI, Ed. et H.), Michelin, *Icon.*, pl. 17, fig. 7. — *Corallien* : St-Mihiel.

103. *CYATHOPHYLLUM GRANULATUM*, Munster, pl. 2, fig. 24. — *Saliférien* : St-Cassian.

104. *THECOPHYLLIA NUMISMALIS*, d'Orbigny, *Prod.* — *Bajocien* : Marquises.

105. *THECOPHYLLIA LUCENSIS* (M? TESSONI, Edwards et Haime), d'Orbigny, *Prodrome*. — *Bajocien* : Luc.

106. *MONTLIVALTIA RICORDEANA*, d'Orbigny, *Prod.* — *Néocomien* : Gurgy.

107. *ELLIPSOSMILLIA HUMILIS*, d'Orbigny, *id.* — *Turonien* : ile d'Aix.

108. *PERISMILIA MARTINANA*, d'Orbigny, *id.* — *Turonien* : Bains de Rennes.

109. *PERISMILIA ELONGATA* (M? MATHERONI, Edwards et Haime), d'Orbigny, *id.* — *Turonien* : Figuières.

110. *THECOPHYLLIA ELONGATA* (M? DUFRENOYI, Edwards et Haime), d'Orbigny, *Prod.* — *Lias* : Landes.

GENRE XXXVIII. — LEPTOPHYLLIA.

Leptophyllia, Reuss, *loc. cit.*, p. 101, 1854.

Trochosmilia (pars), Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, 1849.

Polypier pédonculé, muraille nue et couverte de côtes granuleuses ; cloisons minces, serrées et finement dentelées ; columelle rudimentaire ou nulle.

Les *Leptophyllies* ont beaucoup d'analogie avec certaines *Montlivaulties*, alors que celles-ci ont accidentellement perdu leur épithèque. Aussi doit-on dans la détermination de ces fossiles chercher avec soin si ce tissu épithélique a ou n'a pas existé.

a. *Plus de 6 cycles cloisonnaires.*

1. *L. IRREGULARIS*, Reuss, *Denks. der Wiener Akad.*, etc., pl. 7, fig. 2-3, 1854. = Polyp. élevé et droit, aussi haut que large; 268 cloisons serrées minces et peu inégales. Grand axe du calice large du double du petit. — *Turonien* : Gosau.

b. *Plus de 5 cycles.*

2. *L. CENOMANA*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 295, 1858. — *Acromilia id.*, d'Orbigny, *Prod.*, = Polyp. élevé, turbiné, fixé par une large base; calice circulaire; 5 cycles et un commencement d'un 6^e. — *Turonien* : Le Mans.

3. *L. CLAVATA*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 6, fig. 3-6. = Polypier largement fixé, allongé, grêle, mais renflé près du calice; calice subcirculaire; 126 cloisons minces, serrées et inégales. — *Turonien* : Gosau.

4. *L. DEPRESSA*, Etallon, *loc. cit.* = Polypier étalé, turbiné, à pédoncule étroit; cloisons fines et un peu courbées; 5 cycles, le 6^e manquant dans un des systèmes. Haut., 10 à 12 mill.; diam. du calice, 15 à 22 mill. — *Corallien* : Valfin.

5. *L. FROMENTELI*, Etallon, *loc. cit.* = Cette espèce diffère de la précédente, par son calice elliptique, son pédoncule plus étroit et le manque de fossette calicinale. Haut., 18 à 20 mill.; grand axe du calice, 12; petit, 10. — *Corallien* : Valfin.

6. *L. MONTIS*. = Polypier trochoïde, rétréci au sommet; calice circulaire, peu profond; cloisons minces et finement dentelées, on en compte 120 et autant de côtes assez fortes, granuleuses et subégales. Haut., 40 mill.; diam. de la plus grande largeur, 29 à 30; diam. du calice, 24. — *Corallien* : Mont-les-François (Haute-Saône).

7. *L. SÆMANNI*. = Polypier trochoïde, à base grêle, puis étalée; calice oblique et subcirculaire; cloisons fines, séparées par des traverses ondulées et bien développées; côtes fines, égales, régnant sur toute la hauteur du polypier et s'entrecroisant sur les côtés; 108 cloisons. Haut., 25 à 28 mill.; diam. du calice, 20; du pédicule au-dessus de la base, 6 à 7. — *Oxfordien supérieur* : Vieil-St-Remi (Ardennes).

c. *6 Cycles complets.*

8. *L. CALLOVIENSIS*. = Polyp. cône, coudé, légèrement pédicellé; cloisons débordantes, subégales, assez épaisses et finement granulées; côtes subégales et bien marquées; calice circulaire, 192 cloisons. Haut., 15 mill.; diam. du calice, 40. — *Callorien* : Chaumont, (St-Claude). Communiqué par M. Etallon.

d. *5 Cycles complets.*

9. *L. STRANGULATA*. = Polypier élevé, subcylindrique et présentant de distance en distance des étranglements; calice circulaire; espace columellaire allongé; 96 cloisons fines; côtes subégales et distinctes depuis la base. Hauteur, 30 mill.; diam. du calice, 20. — *Corallien* : Natheim.

10. *L. ? COMPRESSA*. = Polypier élevé, trochoïde, un peu comprimé et largement fixé; fossette allongée; côtes fines, subégales et serrées; 12 grandes cloisons, 12 moyennes, 24 petites et 48 rudimentaires. Hauteur, 40 mill.; grand axe, 28; petit, 25. — *Corallien* : Natheim.

11. *L. CRASSA*. = Polypier épais, trapus, à base large, mais à pédicule assez étroit; calice subcirculaire et profond; cloisons minces et écartées; traverses bien développées; côtes peu serrées et bien marquées. Haut., 15 à 18 mill.; diam. du calice, 26 à 28. — *Oxfordien supérieur*: Vieil-Saint-Remi (Ardennes).

GENRE XXXVIII. — LITHOPHYLLIA.

Lithophyllia, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, p. 290, 1856.

Caryophyllia, id., id., *Ann. des sc. nat.*, 3^e série, t. XI, p. 239, 1846. — (*pars*) Lamarck, *Hist. nat. des Anim. sans vert.* 1816.

Polypier fixé par une large base; calice peu profond; columelle bien développée et spongieuse; cloisons fortes et bien dentelées surtout à leur partie interne; muraille nue et couverte de côtes épineuses; traverses vésiculeuses abondantes.

L. BASTEROTI, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 291. — *Caryophyllia* id., *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., p. 239. = Polypier allongé subcylindrique; épines costales peu développées; 6 cycles complets, les cloisons primaires et secondaires très-épaisses. Hauteur, 20 à 30 mill.; diam. du calice, 30 à 40. — *Falunien*: Dax.

GENRE XXXIX. — CIRCOPHYLLIA.

Circophyllia, Edwards et Haime, *Compt. rend. de l'Acad. des sc.* t. XXVII, 1848.

Anthophyllum (*pars*), Goldfuss, *Petref. Germ.*, p. 46, 1826.

Polypier trochoïde; cloisons larges, débordantes et lobées; columelle bien développée et papilleuse; muraille nue; côtes simplement granuleuses; traverses abondantes et placées dans la loge, suivant des lignes spirales et concentriques.

1. *C. TRUNCATA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., pl. 8, fig. 3. — *Anthophyllum truncatum*, Goldfuss, pl. 43, fig. 9. — Alex. Rouault, *Mém. de la Soc. géol.*, 2^e série, t. III, pl. 14, fig. 1, 1850. = Polyp. turbiné et courbé à la base; côtes nombreuses et crénelées; columelle bien développée et à surface plane; 6 cycles et des rudiments d'un 7^e; cloisons très-minces et très-serrées. Haut., de 30 à 40 mill.; diam. du calice, 25 à 30. — *Parisien*: Parnes; Valmondois, etc.

2. *C?* *VERTEBRALIS*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, p. 294. — *Cyathina vertebrata*, d'Archiac, 1850. — *Trochosmilia vertebralis*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 47, 1851. = Polyp. court, largement fixé et rétréci dans son milieu; côtes inégales; columelle distincte et profonde; 24 grandes cloisons et 72 petites. Diam. du calice, 15 mill. — *Suëssonien*: Biarritz; la Palaréa.

3^e Tribu. — **Fongidées** (1).

FUNGIDÆ (*pars*), LOPHOSERINÆ (*pars*) Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 123 et 125, 1851.

Polypiers simples, ayant les loges interseptales divisées par des synapticules.

VIII^e Famille. — **Anabaciens**.

FUNGINÆ (*pars*), Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 121, 1850.

Polypiers discoïdes; muraille ou plateau dépourvu d'épithèque, échinulé et percé d'un grand nombre d'ouvertures.

Cette famille et celle des Genabaciens, ont beaucoup d'analogie avec les Zoanthaires Perforés; aussi Alc. d'Orbigny a-t-il placé les fossiles qu'elles renferment dans ce Sous-Ordre. Mais à l'exemple de MM. Edwards et J. Haime, nous les laissons parmi les Zoanthaires Apores, attendu que les ouvertures de la murailles doivent être considérées comme provenant d'un développement imparfait du tissu mural, le reste du polypier présentant au contraire un sclérenchyme bien développé et compacte.

GENRE XL. — **MICRABACIA**.

Micrabacia, Edwards et Haime, *Compt.-rend. de l'acad. des sc.*, vol. XXIX, p. 71, 1849.

Polypier plano-convexe et lenticulaire; cloisons nombreuses et libres par leur bord interne, leur bord externe et inférieur alternant avec des côtes fines et granulées; muraille peu développée et perforée.

M. CORONULA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 10, fig. 4, 1850. — *Fungia id.*, Goldfuss, pl. 14, fig. 10. = Polypier petit, subhémisphérique; synapticules placées selon des lignes concentriques; 78 cloisons inégales et libres par le bord interne. Haut., 2 mill.; diam., 7. — *Cénomaniens* : Le Mans; Warminster; Essen.

GENRE XLI. — **ANABACIA**.

Anabacia, d'Orbigny, *Not. sur les pol. foss.*, p. 11, 1849.

Polypier lenticulaire à fossette peu profonde; cloisons nombreuses, minces, généralement soudées par leur bord interne et s'avancant sur le bord inférieur du polypier, sans former de murailles basilaires distinctes.

1. A. ORBULITES, d'Orbigny, *Prodrome*, 1851. — *Bajociana*, *id.* — *Fungia orbulites*, Lamouroux, *Exp. met.*, pl. 83, fig. 1, 2, 3. — *Fungia*

(1) L'espèce type de cette tribu est le *Fungia patellaris*, Lamarek, 1801, qui est vivante et habite la Mer Rouge.

lævis Goldfuss. *Pctref. Germ.*, pl. 14, fig. 1. — *Cyclolites lævis*, de Blainville, *Dict.*, t. LX, p. 301. == Polypier petit, discoïde, à fossette assez marquée; 5 cycles complets, les cloisons des deux premiers ordres égales et épaisses, celles du 3^e assez épaisses aussi; les autres plus minces et inégales selon les ordres. Haut., 2 mill.; diam., 8. — *Bathonien*: Caen, Bath. — MM. Edwards et Haime citent encore Conlie et Dundry de l'étage *Bajocien*, ce qui nous fait penser que le *A. Bajociana* (d'Orbigny) est une espèce différente, bien qu'ayant de grandes ressemblances avec la précédente.

2. A. BOUCHARDI, Edwards et Haime. *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 122. — *Fungia orbulites (pars)*, Michelin, *Icon.*, pl. 45 fig. 1. == Polypier subhémisphérique, à fossette bien marquée; 6 cycles incomplets; cloisons très-fines et très-serrées, Haut., 12 mill.; diam., 23. — *Bajocien*: Marquise, près Boulogne.

3. A? NORMANIANA, d'Orbigny, *Prod.*, t. I, p. 241. — *Lias*: Laudes.

IX^e Famille. — Cycloseriens.

LOPHOSERINÆ et CYCLOLITINÆ, Edwards et Haime, *Compt.-rend. de l'acad.*, 1849.

Muraille ou plateau, ni perforé, ni échinulé.

GENRE XLII. — CYCLOLITES.

Cyclolites, Lamarck, *Syst. des Anim. sans vert.*, p. 369, 1801.

Polypier circulaire ou ovulaire; cloisons nombreuses et anastomosées; fossette columellaire étroite et profonde; columelle spongieuse rudimentaire; muraille horizontale recouverte d'une forte épithèque plissée.

A. Espèces décrites et figurées.

a. Plus de 7 cycles cloisonnaires.

1. C. ELLIPTICA, Lamarck, *loc. cit.*, p. 234. — Michelin, *Icon.*, pl. 64, fig. 1. == Polypier subelliptique, peu élevé; 7 cycles et des cloisons du 8^e dans plus de la moitié des systèmes; fossette columellaire assez profonde et longue de 50 mill. Les cloisons des 5 premiers cycles égales et plus développées que les autres. Grand diam., 85 mill.; petit, 60. — *Turonien*: Corbières; Royan.

2. C. PLACENTA. Reuss, *Beit. zur charakt. der Kreid.*, etc., p. 125, pl. 27, fig. 4-6, 1854. == Polypier pouvant atteindre jusqu'à 75 mill. de largeur; la hauteur est le quart de la largeur; les cloisons sont très-nombreuses et plus fortes de 5 en 5. — *Turonien*: Gosau.

Le texte indique 527 cloisons, et la figure n'en montre que 460.

aa. Plus de 6 cycles cloisonnaires.

3. C. HEMISPHERICA, Lamarck, *loc. cit.*, p. 233. — Michelin, *Icon.*, pl. 64, fig. 2. — *C. Corbieriaca*, id., pl. 73, fig. 5. — *Funginella hemispherica*, d'Orbigny, *Prod.* == Polypier hémisphérique; fossette columellaire superficielle et presque ronde, 6 cycles et des cloisons du 7^e dans la moitié des systèmes. Haut., 30 mill.; diam. du calice, 70. — *Turonien*: Corbières; Martigues; Le Bausset; Périgueux.

4. *C. POLYMORPHA*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 125; — *Fungia id.*, Goldfuss, *Petref.*, pl. 14, fig. 6. = Polypier subcirculaire peu élevé; fossette columellaire allongée et longue de 12 mill.; 6 cycles et des cloisons du 7^e dans 5 des systèmes (308 cl.). Haut., 18 à 25 mill. diam. 35 à 50. — *Turonien* : Gosau.

5. *C. UNDULATA*, Blainville, *loc. cit.*, p. 301. — *C. semiradiata*, *Fungia undulata et radiata*, Goldfuss, pl. 14, fig. 7-8. = Polypier irrégulier déprimé sur les bords, élevé au centre; fossette oblongue; 36 grandes cloisons plus fortes que les autres et ondulées; 36 cloisons moyennes assez épaisses et 216 petites. Haut.; 25 mill.; diam., 35 à 40. — *Turonien* : Gosau; Corbières; Martigues, etc.

6. *C. DEPRESSA*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 22, fig. 4-6. = Polypier elliptique, large de 35 à 37 mill. sur 30; fossette calicinale, longue de 18 mill. On compte jusqu'à 360 cloisons subégales. — *Turonien* : Gosau.

7. *C. SCUTELLUM*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 22, fig. 1-3. = Polypier peu élevé, à fossette calicinale peu allongée; cloisons subégales et minces. On en compte 300 sur un échantillon de 28 mill. de largeur. — *Turonien* : Gosau.

Le fossile auquel M. Reuss a donné le nom de *C. MACROSTOMA* diffère des *Cyclolites* par sa muraille d'abord horizontale et qui devient ensuite verticale, ce qui lui donne l'aspect de certaines Montlivaulties, et nous fait croire que cette espèce appartient à un autre genre. Ce fossile a 60 mill. de hauteur, sur environ 70 de largeur. Sa surface latérale est couverte par des bandes épithéliques qui laissent çà et là apercevoir les côtes. On compte environ 380 cloisons assez fortes et épaisses. — Ce fossile est de l'étage *Turonien* de Gosau. Nous proposons pour lui le nom générique de *EPISERIS*.

aa. 6 Cycles complets seulement.

8. *C. DISCOÏDEA*, Blainville, *Dict.*, t. LX, p. 301. — *Fungia id.*, Goldfuss, *Petref.*, pl. 14, fig. 9. — *Funginella id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Polypier criculaire, déprimé sur les bords et élevé au centre; fossette ronde, cloisons droites. Haut., 25 mill.; diam., 50. — *Turonien* : Gosau.

5. *C. RUGOSA*, Michelin, *Icon.*, pl. 64, fig. 6. = Polypier élevé et irrégulier; surface supérieure aplatie; 96 grosses cloisons séparées par autant de petites. Haut., 35 mill.; diam. supérieur, 50; inférieur, 70. — *Turonien* : Corbières.

aaa. Plus de 5 cycles cloisonnaires.

9. *C. GUETTARDI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 125. — *C. numismatis*, Lamarck. — *C. discoïdea*, Michelin, *Icon.*, pl. 4, fig. 1. = Polypier lenticulaire et arrondi, fossette calicinale longue et profonde; 5 cycles et les 3/4 du 6^e (environ 168 cl.); cloisons très-fines et très-serrées. Diam., 25 mill. — *Turonien* : Uchaux.

10. *C. CANCELLATA*, de Blainville, *loc. cit.*, p. 301. — *Fungia id.*, Goldfuss, pl. 14, fig. 5. = Polyp. lenticulaire; fossette profonde et oblongue; environ 120 cloisons. Largeur, 30 mill.; hauteur, 12. — *Turonien* : Macstricht; Royan.

11. *C. HAUSERI*. — *C. HAUSERANA*, Michelin, *Icon.*, pl. 64, fig. 4. — *Funginella id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Polypier irrégulièrement arrondi; fossette subcirculaire et peu profonde; 116 cloisons droites et assez écartées. Diam. du polypier, 40 mill. — *Turonien* : Corbières; Gosau.

12. C. BORSONI, Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 4. = Polypier régulièrement rond et peu élevé; fossette arrondie et superficielle; 118 cloisons environ. Diam., 28 mill. — *Falunien* : Turin.

13. C. ETURBENSIS, E. de Frementel, *Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 47, pl. 1^{re}, fig. 3-4. = Polyp. discoïde, rond; 160 cloisons minces et anastomosées. — *Néocomien* : St-Dizier (Haute-Marne).

14. C. NUMMULUS, Reuss, *loc. cit.*, pl. 23, fig. 5-8. = Polypier peu élevé; fossette calicinale, longue de 3 à 4 mill.; environ 100 cloisons inégales de 3 en 3 ou de 4 en 4. Diam. du polypier environ 15 mill. — *Turonien* : Gosau.

B. Espèces douteuses et non figurées.

15. C. ELEGANS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 126, 1851. = *Funginella id.*, d'Orbigny, *Prodrome*. — *Cénomanien* : île d'Aix.

16. C. VARIOLATA, d'Orbigny, *Prod.* — *Turonien* : Soulage.

17. C. GIGANTEA, d'Orbigny, *id.* — *Turonien* : Le Bausset.

18. C. MARTINIANA, Edwards et Haime, *loc. cit.* = *Funginella id.*, d'Orbigny. — *Turonien* : Martigues.

19. C. LIGERIENSIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* = *Funginella numismalis*, d'Orbigny. — *Senonien* : Royan; Silex de Lanquais.

20. C. ASSILINA, Edwards et Haime, *loc. cit.* = *Funginella id.*, d'Orbigny. — *Néocomien* : St-Auban.

GENRE XLII. — PALÆOCYCLUS.

Palæocyclus, Edwards et Haime, *Compt.-rend.*, t. XXIX, p. 71, 1849.

Polypier circulaire et subdiscoïde; muraille couverte d'une forte épithèque plissée, fossette columellaire profonde et large; columelle rudimentaire; cloisons épaisses et libres.

1. P. PORPITA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals., Intr.*, p. 46. — *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 204. — *Madrepora porpita*, Linné, 1767. = 28 à 30 cloisons épaisses, serrées et droites, séparées par autant de petites. Diam. du polypier, 13 à 15 mill.; haut., 3. — *Silurien* : île Gotland; Dudley.

2. P. PRÆACUTUS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Cyclolites præacuta*, Lonsdale in Murchison, 1839. — *Discophyllum præacutum et lenticulatum*, d'Orbigny, *Prod.* = 48 cloisons subégales, peu élevées et alternant avec des cloisons rudimentaires. Largeur, 30 mill.; haut., 3. — *Silurien* : Marloes Bay.

3. P. FLETCHERI, Edwards et Haime, *loc. cit.* = 36 à 38 cloisons subégales alternant avec autant de petites. Diam. du polypier, 20 mill.; haut., 10. — *Silurien* : Dudley.

4. P. RUGOSUS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — 26 à 30 cloisons épaisses et droites, alternant avec un nombre égal de petites. Diam. du calice, 9 à 11 mill.; haut., 10 à 12. — *Silurien* : Wenlock; Dudley.

GENRE XLIV. — CYCLOSERIS.

Cycloseris, Edwards et Haime, *Compt.-rend.*, t. XXIX, p. 72, 1849.

Actinoseris. d'Orbigny, *Not. sur les pol. foss.*, p. 12, 1849.

Polypier discoïde et libre; cloisons nombreuses et anastomosées; muraille nue, horizontale, et garnie de côtes très-finement granulées.

a. *Plus de 6 cycles.*

1. C. PEREZI, J. Haime in d'Archiac, *Hist. des Prog.*, etc., 1850. — *Funginella* id., d'Orbigny, *Prod.* — *Cyclolites Borsonis*, Michelin, pl. 61, fig. 2, 1846. = Polypier nummiforme; cloisons droites, minces, assez serrées; celles des 3 premiers cycles plus développées en hauteur. Haut., 10 mill.; diam., 50 ou 40. — *Suessonien*: Nice; Sinde.

aa. *6 Cycles seulement.*

2. NICIENSIS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 127, 1851. — *Funginella* id., d'Orbigny, *Prod.* — *Cyclolites* id., Michelin, pl. 64, fig. 1. = Polypier mince et irrégulier; fossette peu marquée; cloisons droites; celles des 3 premiers ordres plus fortes et plus épaisses. Haut., 10 mill.; grand axe, 8; petit, 6. — *Suessonien*: Nice.

aaa. *Plus de 5 cycles.*

3. C. ANDIANENSIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Cyclolites* id., d'Archiac, 1858. = Polypier plat et circulaire; fossette ronde; 5 cycles et des cloisons du 6^e dans 4 des systèmes, cloisons inégales, minces et droites. Haut., 1 1/2 mill.; diam., 12 à 16. — *Suessonien*: Biaritz.

aaaa. *5 Cycles seulement.*

4. C. SEMIGLOBOSA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Cyclolites* id., Michelin, *Icon.*, pl. 50, fig. 1. — *Funginella* id., d'Orbigny, *Prod.* = Polypier plano-convexe; fossette centrale arrondie; cloisons des 4 premiers cycles fortes et inégales. Haut., 3 mill.; diam., 7 à 9. — *Cénomancien*: Le Mans.

5. C. CENOMANENSIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Actinoseris* id., d'Orbigny, *Prod.* = Polypier plat, peu convexe en-dessus, légèrement concave en-dessous; fossette calicinale petite et circulaire; cloisons droites et saillantes. Haut., 2 ou 3 mill.; largeur, 10 à 15. — *Cénomancien*: Le Mans.

Espèces douteuses.

6. C. LENTICULARIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Suessonien*: Rocca Esteron; San Dalmazzio.

7. C? PROVINCIALIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Actinoseris* id., d'Orbigny, *Prod.* — *Turonien*.

8. C? FILAMENTOSA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Fungia* id., Forbes, 1826. — *Sénonien*: Pondichery,

GENRE XLV. — TROCHOSERIS.

Trochoseris, Edwards et Haime, *Compt.-rend.*, 1849.

Polypier trochoïde, adhérent, cloisons nombreuses, fortement granulées et unies par des synaptiques surtout vers leur partie internes. Muraille nue, côtes fines et nombreuses.

a. *Plus de 7 cycles.*

1. T. DISTORTA, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, 1859. — *Anthophyl-lum distortum*, Michelin, *Icon.*, pl. 21, fig. 9. == Polypier trochoïde. à large base, à bords étalés et lobés. Haut., 20 à 30 mill.; largeur, 30 à 60. — *Parisien* : Auvert; Valmondois; Assy, etc.

aa. *Plus de 6 cycles.*

2. T. SINUOSA, E. de Fromentel, *Descript. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 18, pl. 1, fig. 11, 12, 1857. == Calices à bords sinneux. Environ 240 cloisons fines et inégales. — *Néocomien* ; St-Dizier.

2. T. TENUILAMELLOSA, E. de Fromentel, *loc. cit.*, pl. 1, fig. 15, 16. == Cloisons très-fines, nombreuses et un peu flexueuses. Un mill. en comprend 405 dans sa longueur. Le polypier est comprimé et pédicellé. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

aaa. *Plus de 5 cycles.*

4. T. POCULUM, E. de Fromentel, *loc. cit.*, pl. 1, fig. 5, 6. == Polypier trochoïde; calice superficiel; 120 cloisons minces et inégales; columelle papilleuse. Diam. du calice, 15 mill. — *Néocomien*: Saint-Dizier.

5. T. CLAVUS, E. de Fromentel, *loc. cit.*, pl. 1, fig. 7. == Polypier pédicellé; calice ovale, large de 22 mill., sur 12; environ 150 cloisons divisées en faisceaux par les cloisons primaires. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

6. T. ETURBENSIS, E. de Fromentel, *loc. cit.*, pl. 1, fig. 8. == Polypier court et largement fixé; 172 cloisons fines et peu inégales. Diam. du calice, 25 à 27 mill. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

7. T. TOMBECKI, E. de Fromentel, *loc. cit.*, pl. 1, fig. 10. == Polypier largement fixé, court et présentant un étranglement entre la base et le sommet; 156 à 160 cloisons; calices elliptiques, large de 20 mill., sur 15. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

8. T. CORALLINA. == Polypier court cône, s'accroissant rapidement en largeur; calice rond et profond; cloisons fines, serrées; synaptiques bien visibles et en grand nombre; côtes fines, égales, bien développées dans le voisinage du calice. On compte 120 cloisons inégales. Haut. du polypier, 20 à 23 mill.; diam. du calice, 24 à 25. — *Corallien* : Champlitte.

aaaa. *5 Cycles seulement.*

9. T. SESSILIS, E. de Fromentel, *loc. cit.*, pl. 1, fig. 13, 14. == Polypier petit, allongé, subcylindrique, large de 7 à 8 mill.; côtes peu marquées; les cloisons des 3 premiers cycles sont subégales. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

Le T. LOBATA, Reuss, *Beit. zur Karakt. der Kreides.*, etc., pl. 18, fig. 1-2, 1854, est un fossile mal conservé; il est large de 55 mill., sur 90, et haut de 80 à 90 mill.; les cloisons sont nombreuses, serrées et sinneuses. — *Turonien* : Gosau.

M. Reuss a fondé un genre nouveau pour un fossile de l'étage Turonien de Gosau, qui fait encore partie de la famille des Cyclosériniens. C'est un polypier trochoïde, libre et couvert d'une épithèque complète; le calice est circulaire et large de 25 à 30 mill.; au centre se montre une

columelle papilleuse bien développée. On y compte environ 127 cloisons minces, serrées et inégales. Ce fossile qui appartient à l'étage Turonien de Gosau, a reçu de M. Reuss le nom de *GYROSERIS PATELLARIS*.

Disastrées Apores.

X^e Famille. — Euhéliens.

OCULINIDES (*pars*), Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, p. 102, 1856.

Chambres divisées par des traverses rares et tendant à se remplir inférieurement par le développement de la columelle ou de l'endothèque; les jeunes polypières sont toujours libres depuis la base, mais ils s'empâtent plus tard par les progrès de l'âge.

GENRE XLVI. — EUHELIA.

Euhelia, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 3^e série, t. XIII, p. 90, 1850.

Polypier dendroïde; gemmation régulière; bourgeons opposés deux à deux et naissant sur le bord des calices: cloisons entières; columelle nulle; côtes distinctes dans le voisinage des calices.

1. *E. GEMMATA*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 91. — *Oculina id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 54, fig. 5. — *Enallhelia id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Polypières turbinés, et très-granulés: souvent un des deux bourgeons qui naissent en même temps, avorte; 24 cloisons fortes et inégales. Diam. des calices, 3 mill. — *Bajocien*: Langrune (Calvados).

2. *E. CLAUDIENSIS*, Etallon, *loc. cit.* = Polypier fasciculé; polypières alternes, opposés et soudés par un de leurs côtés; 4 cycles; muraille granulée et costulée près des calices. Diam., 4 à 5 mill. — *Corallien*: Valfin.

GENRE XLVII. — ENALLOHELIA.

Enallohelia (*Enallhelia*), d'Orbigny, in Milne Edwards et J. Haime, *Compt. rend. de l'acad. des sc.*, t. XXIX, p. 69, 1849.

Polypier dendroïde, gemmation alterne, distique et très-régulière; cœnenchyme presque nul sur les jeunes tiges et assez développé sur les premières branches; columelle petite et peu saillante; cloisons subentières et présentant des lobes paliformes près de la columelle; muraille nue et costulée seulement près des calices.

A. Type hexaméral.

a. 3 Cycles complets.

1. *E. COMPRESSA*, (*Enallhelia id.*), d'Orbigny, *Prodrome*, t. I, p. 385. — *Lithodendron compressum*, Goldfuss, *Petref. germ.*, pl. 37, fig. 11. — *Oculina compressa*, Bronn, *Ind. pal.* = Polypier en rameaux comprimés; calices externes, peu profonds; côtes peu développées et granuleuses;

columelle petite ; 3 cycles. Diam. des calices, 2 à 2 1/3 mill. — *Corallien* : Natheim ; Heidenheim.

2. *E. CORALLINA*, d'Orbigny, *Prod.* == « Espèce voisine de l'*E. compressa*, mais avec des tiges ramuleuses, très-étroites, rondes ; avec des calices seulement sur les cotés. Ceux-ci également striés en dehors. » — *Corallien* : Angoulins.

aa. 2. *Cycles cloisonnaires seulement.*

3. *E. MINIMA*. == Polypier formé de branches très-écartées et très-grêles ; polypierites régulièrement alternes, ayant des calices aussi larges que les rameaux ; calices un peu élargis et ronds : cloisons épaisses et inégales ; columelle petite et tuberculeuse ; 6 grandes cloisons, 6 petites ; côtes peu visibles. Diam. des calices, 1 1/2 mill., longueur des polypierites, 2 à 3 mill. — *Corallien* : Champlitte.

4. *E. CRASSA*. == Polypier assez épais ; branches fortes et inégales en grosseur ; calices ronds, et assez profonds ; columelle large, mais non saillante ; 6 grandes cloisons épaisses et dentelées près de la columelle ; 6 cloisons rudimentaires ; côtes presque nulles. Diam. des calices, 3 1/2 à 4 mill ; longueur des polypierites, 6 mill. ; diam. des petites branches, 4 à 5 mill. ; des grosses, 8 à 9. — *Corallien inférieur* : Champlitte (Haute-Saône).

5. *E. ELONGATA*. == Polypier en rameaux allongés ; polypierites longs, alternes, tous inclinés du même côté et peu divergents ; 6 grandes cloisons, 6 petites ; calices ovales et larges de 1 1/2 mill. Longueur des polypierites, 4 à 5 mill. ; diam. des branches, 3 mill. au plus. — *Kimmeridgien* : Arc, près Gray.

B. *Type octoméral.*

6. *E. ELEGANS*, d'Orbigny, *Prodrome*, t. 1, p. 385, 1850. — *Lithodendron elegans*, Goldfuss, pl. 37, fig. 10. — *Enallohelix cutigera*, Etallon, *loc. cit.* == Polypier à rameaux assez grêles ; côtes fines, égales et visibles sur toute la surface ; calices assez irréguliers et dirigés dans le même sens, 8 grandes cloisons, 8 petites. Diam. des calices, 1 1/2 mill. — *Corallien* : Heidenheim ; Valfin.

C. *Type décaméral.*

7. *E. JURENSIS*, Etallon, *loc. cit.* == Polypier à rameaux épais et comprimés ; côtes égales et bien développées ; columelle styliforme peu épaisse ; 10 grandes cloisons, 10 moyennes, 20 rudimentaires. Diam. des calices, 3 mill. ; longueur des polypierites, autant. — *Corallien* : Valfin.

8. *E. DECAPHYLIA*. — *E. gracilis*, Etallon, *loc. cit.*, (non d'Orbigny). == Cette espèce diffère de la précédente par ses calices saillants, sa columelle rudimentaire et ses polypierites allongés. Diam. des calices, 3 mill. ; longueur des polypierites, 6 à 7. — *Corallien* : Valfin.

Espèces non décrites.

9. *E. RATHIERI*, d'Orbigny, *Prod.*, t. II. p. 91. — *Néocomien* : Fyé ; Cheney (Yonne).

10. *E. GRACILIS*, d'Orbigny, *loc. cit.* — *Néocomien* : Cheney (Yonne).

GENRE XLVIII. — DIPLOHELIA

Diplohelias, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 120, t. II. — *Diplhelias*, *Brit. foss. corals.*, 1850.

Polypier dendroïde ayant un cœnenchyme assez développé sur les anciens rameaux; polypiérites alternes et distiques; columelle spongieuse bien développée; cloisons finement dentées et peu débordantes. Les jeunes polypiérites restent libres depuis la base, mais les anciens s'empatent par suite du développement du cœnenchyme mural.

A. *Point de stries costales.*

1. D. RARISTELLATA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, 1850. — *Oculina id.*, DeFrance, 1825. — *Lithodendron virgineum*, Goldfuss, pl. 13, fig. 1. — *Oculina raristellata* et *Solanderi*, Michelin, pl. 43, fig. 16 et 15. — *Oculina incerta ? id.*, pl. 63, fig. 11. — *Oculina compressa et raristellata*, d'Archiac, 1847 et 1850. — Rameaux cylindriques et coalescents; calices égaux et assez profonds; columelle bien développée; 3 cycles; cloisons minces et granulées. Diam. des calices, 2 mill. *Parisien* : Biaritz; environ de Paris.

2. D. PAPILLOSA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 2, fig. 1, 1850. — *Oculina raristellata*, Lonsdale in Dixon, 1850. — Rameaux soudés et irréguliers; quelques calices fissipares; granulation du cœnenchyme inégale et oblongue; 3 cycles, les deux premiers égaux. Largeur des calices. 2 mill. et plus. — *Suëssonien* : Bracklesham; Highgate, près Londres.

3. D. MULTISTELLATA, d'Orbigny, *Prod.*, t. II, p. 403, 1850. — *Lithodendron multistellatum*, Galeotti, *Mém. sur la géol. du Brab.*, pl. suppl., fig. 11. — Cœnenchyme couvert de grains allongés et peu visibles; 3 cycles; cloisons minces; les primaires et les secondaires égales; calices serrés et profonds; columelle bien développée. Diam. des calices, 3 mill. — *Parisien* : Lacken; Jette.

B. *Des stries costales.*

4. D. REFLEXA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 122, 1856. — *Oculina reflexa*, Michelotti, 1847. — *Oculina virginea*, Michelin, *Icon.*, pl. 13, fig. 6, 1842. — *Astrelia virginea*, d'Orbigny, 1852. — Rameaux coalescents; cœnenchyme couvert de stries fines et flexueuses; calices élevés, irréguliers, mais alternes sur les jeunes branches; 3 cycles, les 2 premiers égaux. Diam. des calices, 3 mill. — *Falunien* : La Superga.

MM. Edwards et Haime rapportent au genre *Lophohelia* un fossile de l'étage subapennin, qui a été décrit pour la première fois par DeFrance dans le *Dictionnaire des sciences naturelles*, t. XXXV, p. 356, 1825. C'est le LOPHOHELIA DEFRANCEI.

Les Lophohelias se distinguent des Diplohelias par l'absence totale de columelle et par la profondeur des calices.

XI^e Famille. — Aplosmiliens.

Eusmiliens (pars), Edwards et Haime. *Hist. nat. des coral.*, 1856.

Chambres divisées par des traverses lamelleuses; cloisons entières, ne présentant ni lobes, ni dents; multiplication par fissarité.

GENRE XLIX. — APLOSMILIA.

Aplosmilia, d'Orbigny, *Note sur les Pol. foss.*, p. 6. 1849.

Polypier cespiteux, en cyme le plus souvent dichotome; cloisons entières; calice rond ou très-allongé; columelle lamellaire entière et bien développée; muraille nue et garnie de côtes cristiformes.

1. A. ASPERA, d'Orbigny, *Prod.*, p. 37, t. II. — *Lobophyllia* id., Michelin, *Icon.*, pl. 20, fig. 4. == Polypiérites serrés, subcylindriques; côtes distinctes depuis la base et cristiforme; largeur des calices, 12 à 15 mill. — *Corallien*: Verdun; St-Mihiel; Oyonnax; Poisat; Ecuelle.

2. A. SEMISULCATA, d'Orbigny, *Prod.*, p. 37, t. II. — *Lobophyllia* id., Michelin, *Icon.*, pl. 17, fig. 8. == Cette espèce voisine de la précédente a des côtes interrompues, mais très-fortes près des calices; ceux-ci sont larges d'environ 10 mill. — *Corallien*: Maxey; St-Mihiel; Verdun; Vagnon, Pointe-du-Ché et Ecuelle.

3. A. ELEGANS. == Polypier en cyme dichotome; polypiérites élevés et très-rapprochés; calices généralement comprimés, peu profonds, et larges de 7 à 8 mill.; columelle forte et bien développée; cloisons appartenant à 3 ordres; les primaires épaisses et un peu renflées à leur partie interne, les 2^{es} et les 3^{es} très-minces et moins développées. On compte généralement 24 grandes cloisons dans les grands calices, 24 cloisons moyennes, et 48 rudimentaires; les côtes sont cristiformes et serrées près du calice; la moitié seulement descend le long des polypiérites et est bien marquée jusqu'à la base. — *Corallien moyen*: Ecuelle (Hte-Saône).

4. DISTANS. == Polypier en cyme trichotome, assez semblable au polypier du *Thecosmilia trichotoma*; calices comprimés, larges de 6 à 7 mill.; longs de 8 à 20 mill. En général on remarque 10 cloisons principales par calice, elles sont épaisses et correspondent aux côtes; entre chaque grande cloison, on aperçoit 3 petites cloisons excessivement minces et peu visibles; la columelle est entière et très-mince; les polypiérites s'écartent fortement et sont couverts sur toute leur hauteur de côtes fortes, subégales et un peu flexueuses. Les polypiérites ne sont pas libres dans une étendue de plus de 20 mill. — *Corallien moyen*: Ecuelle (Hte-Saône).

5. A. MAGNIFICA. == Polypier formant une touffe élevée d'environ 40 à 50 centim.; polypiérites libres dans une grande étendue et médiocrement serrés; calices superficiels, larges de 10 à 12 mill., longs de 20 à 33 mill., droits ou contournés; columelle bien développée; cloisons primaires, fortes et très-épaisses près de la columelle; cloisons secondaires moins épaisses que les primaires, mais renflées aussi au centre; cloisons tertiaires, minces et unies. On compte 36 grandes cloisons par calices, 36 moyennes et 72 petites; les côtes sont alternativement grosses et petites, visibles seulement vers le calice; le reste de la muraille est nu et parfaitement uni. — *Kimmeridgien*: Arc, près Gray (Hte-Saône).

6. A. CRASSA. == Polypier épais, polypiérites courts et renflés au-dessous du calice; celui-ci est ovalaire et présente des cloisons excessi-

vement épaisses; 10 grandes cloisons aussi épaisses au centre que près de la muraille, 10 cloisons secondaires allant en s'amincissant de la muraille au centre et 20 petites cloisons assez minces; columelle épaisse et bien développée; diamètre des calices, 25 mill.; murailles garnies de grosses cloisons cristiformes. Hauteur des polypières, 35 à 40 mill. — *Corallien* : Gy (Hte-Saône).

7. A. SPATULA, Etallon, *loc. cit.* = Rameaux flabelliformes très-comprimés; murailles couvertes de côtes distinctes depuis la base, interrompues et cristiformes près du calice; 3 ordres de cloisons. Hauteur des branches 90 mill.; diam. du calice, 30 à 50 sur 8. Cette espèce très-voisine du *A. elegans*, paraît en différer par ses calices plus larges, ses côtes moins développées et ses cloisons moins épaisses. — *Corallien* : Valfin.

8 A. NUDA, d'Orbigny, *Prodrome*, t. II, p. 38. = Cette espèce encore mal connue, paraît différer des précédentes par ses murailles étranglées de distance en distance, et par l'absence de côtes. — *Corallien* : Saint-Mihiel; Valfin, etc.

9. A. GREGARIA. = Polypier peu élevé et affectant assez la forme extérieure des Barysmilies; côtes rudimentaires; cloisons et columelle épaisses; calice oblong. On compte de 8 à 12 cloisons par calice, séparées par autant de petites cloisons. Hauteur du Polypier, 50 à 60 mill.; diam. des calices, 8 sur 12. — *Corallien moyen* : Ecuelle (Hte-Saône).

10. A. DUMOSA. = Polypier formant des buissons élevés et épais; polypières peu épais, subcylindriques, se dichotomisant de 3 centim. en 3 centim.; murailles nues, couvertes de granulations très-fines; côtes visibles seulement au bord des calices; le reste de la muraille est lisse et présente seulement çà et là des bourrelets peu saillants, qui sont le résultat de la présence d'anciennes côtes qui se sont effacées ensuite; calices subcirculaires ou allongés. On compte 24 à 28 cloisons alternativement inégales dans les grands calices; elles sont débordantes et épaisses. Haut. du polypier, 15 à 18 cent.; diam. des polypières, 10 à 16 mill.; largeur des calices, 10 à 12 mill. — *Corallien* : Theuley (Haute-Saône).

GENRE L. — BARYSMILIA.

Barysmilia, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, t. XXVII, p. 463, 1848.

Dendrophyllia, Michelin, *Icon. Zooph.*, p. 17, 1841.

Polypier submassif; polypières libres dans une petite étendue, et placés au sommet d'un tronc épais et qui s'accroît constamment par l'addition de couches murales superposées; côtes fines, granuleuses, distinctes depuis la base; cloisons peu ou point débordantes.

1. B. CORDIERI, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 3^e série, t. X, p. 273, pl. 5, fig. 4, 1849. = Polypier élevé à pédoncule épais; calices ronds ou ovales; cloisons très-minces et très-serrées; 4 ou 5 cycles. Haut., du polypier, 110 mill.; diam. des calices ronds, 10, des calices ovales, 15 sur 8. — *Turonien* : Mamers.

2. B. TUBEROSA, Reuss, *Denkschr. der Wien. acad.*, t. VII. pl. 91, pl. 10, fig. 14 et 15, 1854. = Polypier convexe à pédoncule bien développé; calices peu élevés et irréguliers; 3 cycles et des cloisons d'un 4^e, elles sont inégales et un peu courbées. Petit axe des calices, 5 à 6 mill. — *Turonien* : Gosan.

3. *B. BREVICAULIS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Dendrophyllia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 4, fig. 5. = Polypier assez petit; pédoncule épais et étalé; 4 cycles complets; côtes fines; cloisons épaisses et un peu débordantes. Haut. du polypier, 30 mill.; diam. des calices, 6 sur 8 ou 10. — Turonien : Uchaux (Vaucluse).

Espèces non décrites.

4. *B. CONFUSA*, d'Orbigny, *Prod.*, t. II, p. 182. — Turonien : ile d'Aix.

5. *B. COMPRESSA*, *ibid.*, p. 203. — Turonien : Uchaux.

6. *B. CORBARICA*, *ibid.*, p. 204. — Turonien : Soulage.

Le *B. gregaria* du même auteur appartient à un autre genre.

XII^e Famille. — Calamophylliens.

LITHOPHYLLIACÉES (*pars*) Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, p. 288, 1856.

Chambres divisées par des traverses lamelleuses; multiplication par fissiparité; cloisons dentées.

Les Calamophylliens se distinguent des Aplosmiliens par les dents qui garnissent le bord supérieur de leurs cloisons.

GENRE LI. — DASYPHYLLIA.

Dasyphyllia, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, *loc. cit.*, p. 492, 1848.

Polypier en cyme dichotome et fasciculé; polypiérites devenant libres de bonne heure et dans une grande étendue, muraille nue, costulée et formée de feuillets emboîtés; côtes échinulées et spiniformes; columelle spongieuse; cloisons débordantes et présentant des dents internes plus grandes que celles qui sont vers la partie extérieure; traverses bien développées.

1. *D. MICHELOTTI*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, p. 340. = Polypiérites longs et droits; expansions murales en forme de colle-rettes, unissant souvent les individus; 48 cloisons; columelle peu développée. Diam. des calices, 10 mill. — Parisien : Colline-St-Marguerite; Vallée de la Bormida.

2. *D. ? TAURINENSIS*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1849. — *Lobophyllia contorta*, Michelin, *Icon.*, pl. 10, fig. 12, (la partie droite de la figure seulement). 1842. = Point de collerettes; côtes fines et nombreuses; 3 cycles; calices elliptiques, larges de 10 à 12 mill. — Falunien : Turin; Belforte; Dego.

Les deux espèces fossiles que MM. Edwards et Haime ont fait rentrer dans ce genre créé pour un polypier vivant, sont douteuses et pourraient bien appartenir aux Calamophyllies.

GENRE LII. — APLOPHYLLIA.

Aplophyllia, d'Orbigny, *Not. sur les pol. fos.*, p. 8, 1849.

Lithodendron (pars), Michelin, *Icon.*, p. 88, 1843.

Calamophyllia (pars), Edwards et Haime, *Ann. des sc., loc. cit.*, p. 264, 1849.

Polypier en touffe dendroïde; polypiérites allongés, cylindriques ou subpolygonaux; murailles nues. granuleuses et ne présentant des stries costales qu'au voisinage des calices; point de columelle; cloisons peu débordantes.

1. A. GUETTARDI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 83, 1851. = Polypiérites longs et assez serrés; côtes droites, inégales et granulées; 3 cycles; cloisons minces et unies près du centre; columelle rudimentaire. Diam. des polypiérites, 3 à 4 mill. — *Corallien*: Nancy.

2. A. DICHOTOMA, d'Orbigny, *Prod.*, t. II, p. 32, 1850. — A. Orbigny, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 83, 1851 — *Lithodendron dichotomum*, Michelin, *Icon.*, pl. 19, fig. 6. = Polypiérites petits, cylindriques; côtes bien marquées près des calices et inégales; calices circulaires, larges de 4 mill.; — *Corallien*: Verdun: Wagnon; Dun.

3. A. CRASSA, Reuss, *loc. cit.*, pl. 11, fig. 7-9. = Rameaux cylindriques et larges de 10 à 12 mill.; columelle spongieuse, 48 à 50 cloisons alternativement inégales et flexueuses. — *Turonien*: Weisenbach. La présence de la columelle fait supposer que cette espèce pourrait être une *Rhabdophyllie*.

GENRE LIII. — CALAMOPHYLLIA.

Calamophyllia (pars), Blainville, *Dict. des sc. nat.*, t. LX, p. 312, 1830. — Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 80, 1851.

Eunomia, Lamouroux, *Exp. nat.*, 1821.

Lithodendron, Michelin, *Icon.*, p. 94, 1843.

Polypier fasciculé; polypiérites longs et devenant libres de très-bonne heure; côtes bien développées et formant çà et là, par suite d'un grand développement de l'exothèque, des collerettes plus ou moins saillantes, situées souvent à la même hauteur chez les différents polypiérites et s'unissant quelquefois avec leurs voisines; columelle nulle; cloisons nombreuses et dentées; traverses abondantes et obliques.

A. Collerettes murales bien développées et se soudant aux collerettes voisines.

1. C. SPEUDOSTYLINA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.* p. 263, 1849, — *Lithodendron id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 19, fig. 9 = Polypiérites cylindriques, et assez rapprochés; collerettes saillantes, horizontales et soudées aux collerettes voisines; la base des collerettes est souvent couverte d'une épithèque fine et plissée transversalement; les côtes sont minces et égales sur les tiges, mais au bord des calices, elles sont inégales et saillantes; on en compte 48 alternativement grandes et petites; 48 cloisons inégales selon les ordres, assez épaisses et serrées. Diam. des calices, 10 à 12 mill. — *Corallien*: Dun (Meuse); Chatel-Censoir.

2. C. FENESTRATA, Reuss, *loc. cit.*, pl. 5, fig. 20 et 21. = Polypiérites

cylindroïdes ; larges de 6 mill. et réunis par des collerettes très-développées ; côtes fortes et égales ; de 24 à 36 cloisons assez épaisses. — *Turonien* : Zlambach (Alpes Orientales).

B. Collerettes murales bien développées, mais ne se soudant pas aux collerettes voisines.

3. *C. CRASSI-TORQUATA*. == Polypier très-élevé ; polypiérites cylindriques, peu écartés ; murailles épaisses, couvertes de côtes fortes et très-granulées et formant, de 10 mill. en 10 mill., des collerettes très-développées et quelquefois épaisses de 2 mill. ; 64 cloisons assez épaisses et serrées. Diam. des calices, 12 à 18 mill. — *Corallien* : Environs d'Auxerre (Yonne).

4. *C. STOKESI*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 16, fig. 1. == Polypiérites longs et subprismatiques ; côtes droites, subégales et très-fines ; 70 cloisons peu inégales ; celles du dernier cycle, rudimentaires. Largeur des calices, 10 mill. — *Corallien* : Steeple-Aston.

5. *C. STRIATA*, Blainville, *Dict. des sc. nat.* pl. 52, fig. 4, 1830. — *C. Flabellum*, *ibid.* — *Lithodendron flabellum*, Michelin, *Icon.*, pl. 21, fig. 4. — *C. striata et flabellum*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., p. 202. — *C. striata et Eunomia flabella*, d'Orbigny, *Prod.*, t. II. p. 31-32. == Polypiérites serrés et garnis de petites collerettes qui semblent terminer des feuilletés muraux ; 4 cycles ; cloisons fines ; côtes nombreuses et serrées. Largeur des calices, 8 à 10 mill. — *Corallien* : Verdun ; Maxey-sur-Vaize ; Besançon, etc.

6. *C. ARTICULOSA*, Edwards et Haime, loc. cit., p. 265, 1849. — *Caryophyllia articulosa*, DeFrance, Mss. — *Lithodendron pseudostylina (pars)*, Michelin, *Icon.*, pl. 20, fig. 4. == Polypiérites subcylindriques ; collerettes espacées de 12 mill. ; côtes égales fines et nombreuses ; 4 cycles de cloisons, minces et serrées. Diam. des calices, environ 15 mill. — *Corallien* : Verdun.

7. *C. RADIATA*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 22, fig. 1. *C. Lucensis*, d'Orbigny, *Prod.* — *Eunomia radiata*, Lamouroux, 1824. — Bronn, 1824. — DeFrance, 1826. — Hall, 1830. — Morris, 1843. — *Lithodendron eunomia*, Michelin, *Icon.*, pl. 34, fig. 6. == Rameaux grêles et peu ramifiés ; collerettes bien développées ; calices ovalaires ; 16 à 20 cloisons inégales et épaisses en-dehors. Hauteur du polypier, de 10 à 15 centim. ; diam. des calices, 2 à 3 mill. — *Bajocien* : Caen ; Bath ; Billy, etc., etc.

C. Collerettes peu développées et peu saillantes.

8. *C. FLABELLATA*. == Polypier fasciculé ; polypiérites assez serrés et très-comprimés ; côtes fines, granuleuses, donnant lieu à des collerettes peu saillantes ; calices déformés et comprimés. On compte de 58 à 60 cloisons dans les grands calices. Grand axe des calices, 15 à 16 mill. ; petit, 6 à 10. — *Corallien* : Environs d'Auxerre (Yonne).

9. *C. UNDULATA*. == Polypier fasciculé ; polypiérites petits, longs et ondulés ; côtes fines, formant des collerettes minces et très-rapprochées. Diam. des polypiérites, 5 à 8 mill. — *Corallien* : Environs d'Auxerre.

10. *C. KIMMERIDGIENSIS*. == Polypier en touffes serrées ; polypiérites longs et subprismatiques ; côtes fines, granuleuses et subégales ; collerettes peu saillantes et irrégulières ; 48 à 66 cloisons minces, serrées et

inégales ; les 12 premières arrivent seules au centre du calice. Diam. de ceux-ci, 5 à 7 mill. — *Kimmeridgien* : Arc, près Gray.

11. *C. COMPRESSA*, d'Orbigny, *Revue et magas. de Zool.*, p. 174. — E. de Fromentel, *Pol. foss. de l'étage Néocomien*, pl. 11, fig. 5, 1857. = Polypières se fissiparisant tous les 2 ou 3 centim., collerettes murales assez bien développées ; côtes fines et cristiformes. Diam. des tiges, 5 à 7 mill. ; calices inconnus. — *Néocomien* : Gy-l'Evêque ; Leugny (Yonne).

12. *C. SEQUANA*. = Cette espèce diffère du *C. Kimmeridgiensis*, dont elle est voisine, par la forme très-comprimée de ses polypières et par ses collerettes plus fortes et plus ondulées. — *Portlandien* : Gray.

Espèces douteuses.

13. *C. MARTINIANA*, d'Orbigny, *Prod.* — *Turonien* : Martigues.

14. *C. GRACILIS*, *ibid.* — *Turonien* : Soulage.

15. *C. STRANGULATA*, *ibid.* — *Corallien* : Oyonnax ; St-Puits, etc.

16. *C. SUBGRACILIS*, *ibid.* — *Corallien* : Angoulins.

17. *C. COTTEAUANA*, Edwards et Haime, *Pol. fos. des ter. Pal.* — *Eunomia Cottaldina*, d'Orbigny, *Prod.* — *Corallien* : Auxerre.

GENRE LIV. — DACTYLOSMILIA.

Dactylosmilia, d'Orbigny, *Not. sur les pol. foss.*, p. 6, 1849.

Polypier dendroïde, à branches dichotomes ; columelle spongieuse. Des palis devant tous les cycles qui précèdent le dernier. Murailles nues et costulées sur toute leur surface.

1. *D. CARANTONENSIS*, d'Orbigny, *Prod.*, t. II, p. 182. = Polypières se bifurquant suivant un angle aigu ; calices elliptiques ; 3 ou 4 cycles ; cloisons inégales ; palis étroits. Diam. des polypières, 10 mill. — *Turonien* : île d'Aix.

2. *D. CENOMANENSIS*, d'Orbigny, *Prodrome*, t. II, p. 182, 1850. — « Jolie espèce dont les cellules sont peu élevées ; cylindriques. » — *Cénomaniens* : Le Mans.

GENRE LV. — RHABDOPHYLLIA.

Rhabdophyllia, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 83, 1851.

Calamophyllia (pars), *ibid.* — *Ann. des sc. nat.*, 1849.

Lithodendron (pars), Michelin, *Icon.*, p. 95, 1843.

Polypier en touffes dendroïdes ; polypières longs et subcylindriques ; muraille nue et couverte de côtes granuleuses qui s'étendent sur toute la hauteur des tiges sans former de collerettes ; columelle spongieuse bien développée ; cloisons fortes et peu débordantes.

a. Cinq cycles.

1. *R. GRANDIS*. = Polypières allongés, cylindriques et un peu ondulés ; côtes fines et nombreuses ; cloisons minces et serrées ; columelle

bien développée. Diam. des calices, 11 à 12 mill. — *Portlandien* : Gray-la-ville ; Arc.

2. R. KIMMERIDGIENSIS. = Polypiérites allongés et parallèles ; côtes fines et bien prononcées ; calices comprimés et larges de 6 à 10 mill. ; de 60 à 72 cloisons par calice ; columelle petite. — *Kimméridgien* : Le Havre ; Arc-les-Gray.

3. R. VALFINENSIS. — *R. undata*, Etallon, *Etudes Pal. sur le Haut-Jura*. = Polypier en touffe serrée ; polypiérites ronds, ovalaires ou subtriangulaires ; côtes bien marquées ; cloisons minces et nombreuses ; 5 cycles. Diam. des tiges, 10 mill. ; haut. du polypier, 18 à 20. — *Corallien moyen* : Valfin.

aa. 4 Cycles complets.

4. R. ELEGANS. = Polypiérites s'écartant rapidement et généralement comprimés ; calices ovalaires assez profonds ; 48 cloisons minces, finement dentées et alternativement inégales ; columelle bien développée et large de 2 mill. ; côtes inégales et granuleuses. Diam. des calices, 6 mill. sur 4. — *Corallien inférieur* : Champlitte (Haute-Saône).

5. R. PORTLANDICA. = Cette espèce diffère de la précédente par ses rameaux moins comprimés, couverts de côtes plus fortes et par ses calices ronds et profonds. — *Portlandien* : Mantoche (Haute-Saône).

aaa. 3 Cycles et des cloisons d'un 4^e.

6. R. PHILLIPSI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Brit. foss. corals.*, pl. 15, fig. 3, 1851. — *Lithodendron Edwardsi*, M^r Coy, *Ann. and Mag. of. hist. nat.*, 1848, = Polypier en buisson ; polypiérites se dichotomisant souvent et couverts de renflements assez rapprochés, columelle bien développée ; 3 cycles et des cloisons d'un 4^e dans 2 des systèmes. Diam. des rameaux, 5 à 7 mill. — *Corallien* : Malton ; Cunnor Hill.

7. R. SALSSENSIS, J. Haime, *Bull. de la Soc. Géol. de France*, t. XI, pl. 2, fig. 5, 1854. = Polypier formant des branches qui se séparent suivant un angle très-ouvert ; polypiérites allongés et très-comprimés ; côtes inégales ; environ 36 cloisons. Diam. des branches, 7 mill. — *Thuronien* : Bains de Rennes.

8. R. GRACILIS, Edwards et Haime, *Hist. nat. du coral.*, p. 349, t. II, 1856. — *Lithodendron gracile*, Goldfuss, pl. 18, fig. 2. = Polypierites très-grêles ; on compte environ 32 côtes. Diam. des rameaux, 2 mill. — Fossile de Hercynie.

9. R. EDWARDSI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 83, 1851. — *Lithodendron id.*, Michelin, pl. 21, fig. 2. = Polypiérites cylindriques, larges de 8 à 10 mill., se bifurquant suivant un angle aigu ; côtes fines et nombreuses. — *Corallien* : Verdun.

10. R. MOREAUANA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Lithodendron Moreau-siacum*, Michelin, pl. 21, fig. 3. = Polypiérites cylindriques, serrés, un peu courbés et larges de 5 mill. ; côtes fines et subégales. — *Corallien* : Verdun ; Angoulins.

11. R. UNDATA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Calamophyllia id.*, d'Orbigny (non Etallon, *Pol. du Ht-Jura*). = Rameaux cylindriques, formés d'une suite d'étranglements et larges de 15 mill. ; côtes droites, égales et non saillantes ; 4 cycles incomplets, cloisons minces et fines. — *Corallien* : Wagnon.

12. R. NODOSA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Eunomia id.*, d'Orbigny. — Cette espèce diffère de la précédente par des bourrelets plus saillants, des côtes inégales, et des rameaux plus petits et larges de 10 mill. — *Corallien* : Oyonnax ; Landeyron.

aaaa. 3 Cycles seulement.

13. R. REUSSI, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, p. 351, 1856. — *Cladocora manipulata* Reuss, *loc. cit.*, p. 111, pl. 6, fig. 22, 23. — Polypierites ronds, écartés et larges de 3 à 4 mill.; côtes fortes, égales, saillantes; cloisons minces et inégales. — *Turonien* : Gosau.

14. R. SOLITARIA. — Polypier formé de rameaux longs et ne se dichotomisant que rarement; muraille formée d'une suite d'ondulations arrondies; calice rond et profond; columelle peu développée; cloisons serrées, peu ou point débordantes; 12 grandes et 12 petites. Diam. des tiges, 8 mill.; longueur, 50 à 60. — *Corallien* : Champlitte.

15. R. TRICHOTOMA. — Polypier petit; calice souche, donnant naissance à 3 polypierites placés en séries, mais qui s'écartent rapidement; 24 cloisons, dont 12 un peu plus développées. Diam. du tronc, 7 mill. des jeunes calices, 3. — *Corallien inférieur* : Champlitte.

16. R. SUBDICHOTOMA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.* — *Lithodendron subdichotomum*, Munster, *Beil. zur Petref.*, 4^e partie, p. 33, 1851. — Polypierites larges de 5 mill.; cloisons minces et inégales; 3 cycles. — *Saliférien* : St-Cassian.

17. R. FAXOLENSIS, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 352, t. II, 1856. — *Calamophyllia id.*, d'Orbigny. — Polypierites larges de 4 à 5 mill. et n'ayant que 18 ou 20 cloisons. — *Sénonien* : Faxoé, etc.

18. R. TENUICOSTA, Reuss, *loc. cit.*, pl. 6, fig. 18-21, 1854. — Rameaux cylindriques, flexueux, larges de 4 à 5 mill.; 24 cloisons inégales; côtes très-inégales en saillie; columelle petite. — *Turonien* : Gosau; St-Wolfgang.

Espèces douteuses.

19. R. SIMPLEX, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 83, 1851. — *Calamophyllia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Corallien* : Poizat ; Wagon ; Oyonnax, etc.

20. R. BERNARDANA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Calamophyllia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Corallien* : Landeyron.

21. R. MICHELOTI. — Polypier en touffes serrées et épaisses; rameaux bosselés et sans direction bien arrêtée. Les bosselures des murailles ressemblent à des polypierites qui auraient eu de la tendance à se fissipariser sans avoir pu y parvenir; côtes fines et inégales; calices inconnus. Diam. des polypierites, de 5 à 12 mill. — *Kimméridgien* : Montureux (Haute-Saône).

GENRE LVI. — BARYPHYLLIA.

Baryphyllia, E. de Fromentel, *Desc. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 26, 1857.

Polypier ayant un tronc élevé, à la partie supérieure duquel les polypierites sont libres dans une petite étendue seulement; muraille nue et couverte de côtes granuleuses; le tronc s'accroît constamment en épaisseur par la superposition de couches costales

qui descendent du sommet à la base; columelle nulle; cloisons serrées, peu débordantes et régulièrement dentées.

Ce genre correspond exactement aux Barysmilies, de la famille des Aplosmiliens. Il ne s'en distingue que par ses cloisons dentées. Il serait même possible que des auteurs eussent placé dans les Barysmilies des fossiles qui devraient prendre place ici.

a. 5 Cycles.

1. B. GREGARIA, E. de Fromentel, *Pol. fos. de l'ët. Néoc.*, p. 27, pl. 11, fig. 7. — *Barysmilia id.*?, d'Orbigny, *Prod.*, t. 11, p. 91. — Polypier élevé; calices irréguliers et resserrés à leur partie supérieure. On compte jusqu'à 100 cloisons dans les grands calices; elles sont minces et finement dentées. — *Néocomien* : St-Dizier.

2. B. DUBIA, E. de Fromentel, *loc. cit.*, pl. 11, fig. 8. — Calices assez réguliers et placés en série transversale; 60 à 96 cloisons inégales en largeur et en épaisseur. — *Néocomien* : St-Dizier.

aa. 4 Cycles et des cloisons d'un 5^e.

3. B. CRASSA, Etallon, *loc. cit.* — Polypier élevé et largement fixé; cloisons peu épaisses et non débordantes; on en compte 60 par calice. Diam. des calices, 8 mill.; intervalles calicinaux, 5; hauteur totale, 110. — *Corallien* : Valfin.

4. B. HAIMEI, E. de Fromentel, *loc. cit.*, pl. 111, fig. 1. — Polyp. court, submassif; côtes fortes et cristiformes; calices déformés et subpolygonaux; 48 à 52 cloisons fines, anastomosées et dentées seulement près du centre. — *Néocomien* : Leugny (Yonne).

aaa. 4 Cycles seulement.

5. B. LOBATA, Etallon, *loc. cit.* — Polypier élevé et formant des lobes arrondis; polypiérites déformés et libres seulement dans une étendue de 2 à 3 mill., cloisons fortes et débordantes; 4 cycles; côtes égales, grenues et un peu flexueuses. Diam. des calices, 5 mill.; intervalles, 2 mill.; hauteur du pied, 80 à 100. — *Corallien* : Valfin.

6. B.? IRREGULARIS, Etallon, *loc. cit.* — Cette espèce très-voisine de la précédente; n'en paraît différer que par ses polypiérites plus serrés et libres dans une plus grande étendue. — *Corallien* : Valfin.

aaaa. 3 Cycles seulement.

7. B. MINIMA, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 28. — Polypier court, étalé; calices libres dans une assez grande étendue et larges de 2 à 3 mill.; on compte 18 à 24 cloisons par calice. — *Néocomien* : St-Dizier.

GENRE LVII. — PLEUROPHYLLIA.

Pleurophyllia, E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. Géol. de France*, 2^e série, t. XIII, p. 860, 1856.

Polypier à rameaux dichotomes et souvent trichotomes; polypiérites cylindriques, couverts d'une épithèque épaisse qui forme

cà et là des bourrelets circulaires. La multiplication se fait par fissiparité et non par bourgeonnement comme il l'a été imprimé par erreur; les cloisons sont peu nombreuses et dépendent du type heptaméral; une des sept grandes cloisons est plus développée que les autres et avance jusqu'au centre sans s'amincir et y tient lieu de columelle.

1. *P. TRICHOTOMA*, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 860, 1856. — Polyp. formant des branches le plus souvent trichotomes et larges de 7 à 8 mill.; 2 cycles complets, les 7 cloisons du premier cyclé beaucoup plus développées que les autres. — *Portlandien* : Mantoche (Haute-Saône).

GENRE LVIII. — HYMENOPHYLLIA.

Hymenophyllia, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, p. 82, 1851.

Polypier en touffe fasciculée; polypiérites enveloppés d'une épithèque complète qui ne repose pas sur la muraille, mais seulement sur des côtes qui l'en éloignent; calices déformés; columelle nulle; traverses nombreuses.

1. *H. HAUERI*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Hist. nat. des coral.*, p. 368, t. II, 1856. — « Calices de forme irrégulière, larges de 8 à 10 mill.; » systèmes cloisonnaires inégaux; les uns composés de 3 cloisons dérivées, les autres de 7 cloisons granuleuses latéralement, bien développées; » les principales épaisses et terminées par un petit lobe paliforme étroit » et épais. Celles du dernier cycle très-minces. » — *Turonien* : Gosau.

2. *H. ? CORALLINA*. — Polypier en masse fasciculée; calices inégaux, les uns arrondis, les autres oblongs; fossette septale allongée; épithèque épaisse, plissée et éloignée de la muraille de 2 à 4 mill.; on compte 60 à 72 cloisons dans les grands calices; les jeunes en ont moitié moins; les cloisons sont droites, minces, arquées, bien dentelées et peu serrées; les traverses ne sont pas très-nombreuses, mais elles sont bien développées et inclinées. Grand axe des grands calices, 25 mill.; petit axe, 15; diam. des calices ronds, 10 mill. — *Corallien* : Charcenne.

GENRE LIX. — THECOSMILIA.

Thecosmilia, Edwards et Haime, *Compt.-rend. de l'acad. des sc.*, t. XXVII, p. 468, 1848.

Lithodendron (pars), Goldfuss, 1826. — *Lobophyllia (pars)*, Blainville, 1830.

Lasmosmilia et Amblophyllia, d'Orbigny, *Not. sur les Pol. fos.*, p. 6 et 8, 1849.

Polypier en touffes cespiteuses; polypiérites à calices distincts et libres dans une étendue variable; épithèque forte, plissée, mais fragile; columelle rudimentaire ou nulle; cloisons fortes, peu débordantes et régulièrement dentées; traverses nombreuses.

Nous avons cru devoir limiter ce genre aux espèces à polypiérites distincts et libres, et nous avons placé dans un autre celles qui

ont des calices confluent et dont les murailles ne circonscrivent pas entièrement chaque individu.

A. *Polypières s'individualisant rapidement.*

a. *Plus de 5 cycles.*

1. T. TURBINATA, d'Orbigny, *Prodrome*. — Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, 1856. — Etallon, *loc. cit.* — *Lobophyllia id.*, Michelin, pl. 19, fig. 1. = Polypières s'écartant rapidement; 110 à 115 cloisons fines et subégales. Diam. des polypières, 20 mill. — *Corallien*: Oyonnax; Valfin; Sampigny.

2. T. CLAUDIENSIS, Etallon, *loc. cit.* = Polypier élevé, polypières allongés; épithèque complète; calices circulaires peu profonds; 110 cloisons droites et subégales. Diam. des calices, 15 mill. — *Corallien*: Valfin.

3. T. NEOCOMIENSIS, E. de Fromentel, *Descript. des pol. fos. de l'étage Néocomien*, pl. 11, fig. 6, 1857. = Calices arrondis, larges de 15 mill. et renfermant 120 cloisons, minces et serrées. — *Néocomien*: St-Dizier.

aa. 4 ou 5 Cycles.

4. T. MARTINI. = Polypier en buisson, constitué par des polypières dichotomes, cylindriques et couverts d'une forte épithèque plissée et complète; les polypières s'individualisent rapidement et restent libres dans une grande étendue avant de se fissipariser de nouveau; les traverses sont très-développées, inclinées vers le centre et distantes de 1 à 2 mill.; les calices sont circulaires ou à peine ovales; les cloisons sont minces et écartées; on en compte 16 grandes qui vont jusqu'au centre, 16 moyennes et 48 petites (type octoméral?). Diam. des grandes calices 14 à 15 mill.; diam. moyen des tiges, 10 à 12 mill. — *Sinémurien*: Vic-de-Chassenay (Côte-d'Or).

5. T. TRICHOTOMA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1849. — *Lithodendron trichotomum*, Goldfuss, pl. 13, fig. 6 (mauvaise figure). = Polypières s'isolant rapidement en cymes dichotomes ou trichotomes; 4 ou 5 cycles de cloisons serrées et débordantes. Largeur des calices; 15 à 20 mill. — *Corallien*: Natheim; Geingen; Champlitte, etc.

6. T. SEMINUDA, d'Orbigny, *Prod.* = Diffère de l'espèce précédente par des cloisons plus minces. — *Corallien*: Trouville, etc.

7. T. RAMOSA, d'Orbigny, *Prod.* = Calices larges de 8 à 10 mill.; 4 cycles de cloisons inégales. — *Bajocien*: Langres, etc.

8. T. ANNULARIS, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 13, fig. 1 et 14, fig. 1. — *cylindrica et trilobata*, id., *Ann. des sc. nat.*, 1849. — *Caryophyllia annularis*, Flenning, 1828, etc., = Polypières écartés; calices ronds et larges, 20 mill.; 5 cycles de cloisons débordantes inégales et serrées. Haut. du polypier, 30 centim. — *Corallien*: Steeple-Aston; Malton; Wiltshire, etc., etc.

9. T. ELONGATA. = Polypier très-long et fasciculé; polypières cylindriques, libres dans une grande étendue et recouverts d'une forte épithèque plissée; calices subcirculaires, larges de 20 à 25 mill.; cloisons inégales en largeur et en épaisseur; on en compte environ 72 par calice, 12 sont beaucoup plus développées que les autres. Longueur des polypières, 6 à 7 cent. — *Corallien*: Environs d'Auxerre.

10. T. LOBATA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, 1849. — *Lasmosmilia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Lobophyllia id.*, Michelin, pl. 67, fig. 3. — Polypier court; les polypières s'isolent rapidement, 4 ou 5 cycles de cloisons minces et inégales. Diam. des calices, 18 mill. — *Turonien* : Corbières.

11. T. BUVIGNIERI, d'Orbigny, *Prodrome.* — *Lobophyllia id.*, Michelin, pl. 17, fig. 9. — Polypier allongé; calices subelliptiques; côtes fortes et espacées. Larg. des calices, 15 mill. — *Corallien* : Maxey-sur-Vaise (Meuse).

12. T. KONINCKI, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.* — Polypier court; polypières trilobés et trichotomes; épithèque complète; 5 cycles: cloisons inégales et serrées. Diam. des calices, 20 mill. — *Turonien* : Montignies-sur-Roc.

aaa. *Moins de 4 cycles.*

13. T. COSTATA. Polypier élevé et formant un ensemble en cyme dichotome; polypières libres dans une grande étendue ou restant très-courts, épithèque pelliculaire très-mince, manquant le plus ordinairement et laissant alors voir des côtes alternativement fortes et petites, distantes d'un millimètre et cristiformes; calices généralement ronds et assez profonds; cloisons inégales et n'allant jamais jusqu'au centre du calice; 20, plus développées que les autres, débordent le calice de 2 à 3 mill. et correspondent aux côtes les plus fortes; 20 autres cloisons, placées entre celles-ci, sont moins développées et à peine débordantes. Diam. des calices, 18 à 20 mill. — *Corallien* : Champlitte.

B. *Polypières ne s'individualisant que tard et restant libres dans une petite étendue.*

b. *5 Cycles et plus.*

14. T. LAEVIS, Etallon, *loc. cit.* — Polypier à pédoncule étroit; polypières peu nombreux; calices profonds, larges de 15 mill.; 6 cycles complets. — *Corallien* : Valfin.

15. T. PALMATA, Etallon, *id.* — Polypier dendroïde; tiges aplaties au moment de se fissipariser; calices subelliptiques et larges de 8 à 10 mill.; 60 cloisons épaisses et élevées. — *Corallien* : Valfin.

16. T. CONNECTA, Etallon, *id.* — Polypier submassif; calices irréguliers et profonds de 2 à 3 mill.; larges de 8 à 9 mill.; 50 à 60 cloisons larges, saillantes et un peu débordantes. — *Corallien* : Valfin.

17. T. SOCIA. — Polypier peu élevé et se constituant en masse arrondie; polypières courts et revêtus d'une forte épithèque; la fissiparité est abondante, aussi les polypières n'ont-ils pas le temps de grandir; calices déformés, peu profonds; cloisons minces, assez serrées et inégales; on en compte jusqu'à 106 dans les grands calices. Diam. des calices, de 8 à 15 mill.; hauteur du polypier, 40. — *Corallien* : Ecuelle (Hte-Saône).

18. T. EDWARDSI, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, p. 362, 1856. — *Gyrosmitia id.*, Reuss, *loc. cit.* — Polypier submassif; polypières tendant à se fissipariser en 2 ou 3 individus sans trop se séparer; 70 à 96 cloisons. Largeur des calices, 20 à 30 mill. — *Turonien* : Gosau.

19. T. DEPRESSA, Edwards et Haime, *Pol. fos. des terr. Pal.* — *Lobophyllia id.*, Michelin, pl. 11, fig. 2. — Calices peu élevés, larges de 40 à 50 mill.; 80 à 96 cloisons peu inégales et presque droites; épithèque complète. — *Falunien* : Turin.

bb. 4 Cycles seulement.

20. T. GREGARIA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 18, fig. 1. — *Montlivaltia id.*, M' Coy, 1848. = Polypier composé de faisceaux de polypiérites enveloppés d'une même épithèque; 4 cycles complets; calices circulaires et larges de 20 mill. — *Bajocien*: Dundry; Chaltenham, etc., etc.

21. T.? OBTUSA, Edwards et Haime, *loc. cit.*, — *Amblophyllia id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Calices ayant de la tendance à rester en série et larges de 40 à 50 mill.; 4 cycles et quelquefois des cloisons d'un cinquième. — *Corallien*: Villers; Neuvisi.

bbb. 3 Cycles et des cloisons d'un 4°.

22. T. SUBCYLINDRICA, d'Orbigny, *Prod.* — *Lobophyllia cylindrica*, Michelin, pl. 20, fig. 2. = Polypiérites restant longtemps unis, mais libres par leurs calices qui sont larges de 30 mill.; on compte environ 40 cloisons qui sont fortes et inégales. — *Corallien*: Verdun.

Espèces douteuses.

23. T.? MULTICINCTA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, p. 358. — *Calamophyllia id.*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 6, fig. 22 et 13. — *Turonien*: Gosau.

24. T.? BAJOCIENSIS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 77, 1851. — *Lasmomilia Bajocina*, d'Orbigny, *Prod.* — *Bajocien*: Langres.

25. T.? RUPELLENSIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Amblophyllia id.*: d'Orbigny, *Prod.* — *Corallien*: Vauligny; La Rochelle, etc.

26. T.? CONFLUENS, d'Orbigny, *Prod.* — *Corallien*: Vauligny, etc.

27. T.? CRETACEA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Amblophyllia cretacea*, d'Orbigny, *Prod.* — *Turonien*: île d'Aix.

28. T.? GRACILIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Lasmomilia id.*, d'Orbigny; *Prod.* — *Turonien*: Figuières.

29. T.? GLOMERATA, d'Orbigny, *Prod.* — *Lobophyllia id.*, Michelin. — *Corallien*. Meuse.

30. T.? CRASSA, *ibid.* — *Corallien*: Meuse.

GENRE LX. — CLADOPHYLLIA.

Cladophyllia, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 81, 1851.

Polypier en touffes cespiteuses; polypiérites allongés, cylindroïdes et recouverts d'une épithèque complète et souvent plissée; calices circulaires; cloisons peu nombreuses et assez fortes; columelle nulle; traverses assez rares.

Les fossiles qui composent ce genre ont tous les caractères des Thécosmilies, et nous n'aurions pas hésité à les réunir à ces dernières, si la forme générale, la petitesse des individus et surtout le nombre peu considérable des cloisons ne distinguaient les Cladophyllies des Thécosmilies. MM. Edwards et Haime bien que recon-

naissant la parenté qui existe entre ces deux genres n'ont pas voulu les fondre en un seul.

a. *Plus de 3 cycles cloisonnaires.*

1. C. ARTICULATA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 81. — *Lithodendron articulatum*, Michelin, pl. 21, fig. 1. == Polypiérites présentant des nœuds sur les murailles, séparés par des étranglements; calices circulaires, larges de 6 mill. — *Corallien*: Besançon; Dun; Verdun.

2. C. PIETETI, Etallon, *loc. cit.* == Polypiérites se bifurquant à de longues distances; calices circulaires, larges de 5 mill. et contenant 60 cloisons. — *Corallien*: Valfin.

3. C. FURCATA, Etallon, *loc. cit.* == Muraille ondulée; calices ovulaires, larges de 6 mill.; 64 cloisons dont 18 ou 20 plus fortes que les autres. — *Corallien*: Valfin.

4. C. LÆVIS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, 1851. — *Lithodendron læve*, Michelin, pl. 19, fig. 8. — *Eunomia lævis*, d'Orbigny, *Prod.* == Epithèque épaisse et plissée; calices circulaires, larges d'environ 10 mill. — *Corallien*: Maxey; Verdun, etc.

5. C. FUNICULUS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Lithodendron id.*, Michelin, pl. 19, fig. 7. == Murailles presque lisses; calices larges d'un centim. — *Corallien*: Saint-Mihiel; Wagnon, etc.

6. C. GRACILIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Eunomia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Cyathophyllum gracile*, Munster, pl. 2, fig. 15. == Polypiérites courts et arrondis; calices larges de 3 mill.; 34 à 36 cloisons peu inégales. — *Saliférien*: Saint-Cassian.

7. C. KLIPSTEINI, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Cyathophyllum granulatum*, Klipstein, 1843. — *Acrosmilia granulata*, d'Orbigny, *Prod.* == Polypiérites peu élevés et larges de 8 mill.; 78 cloisons droites, minces et inégales. — *Saliférien*: Saint-Cassian.

aa. *3 Cycles cloisonnaires seulement.*

8. C. CONYBEAREI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 16, fig. 2. == Polypiérites obliques, irréguliers et se bifurquant suivant un angle très-ouvert; calices circulaires, larges de 3 à 4 mill.; cloisons larges et minces; 3 cycles complets. — *Corallien*: Steeple-Ashton.

9. C. BABEAUL. — *C. Babeauana*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 22, fig. 2. — *Eunomia Babeana*, d'Orbigny, *Prod.* — *Calamophyllia prima*, *ibid.* == Polypiérites longs et ondulés; calices subelliptiques, larges de 4, 5 et même 6 mill.; souvent deux cloisons opposées plus fortes que les autres. — *Bajocien*: Bath; Langres; Marquises, etc.

10. C. DICHOTOMA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 81, 1851. — *Lithodendron dichotomum*, Goldfuss, pl. 15, fig. 3. — Michelin, pl. 19, fig. 6. — *Eunomia id.*, d'Orbigny, *Prod.* == Polypiérites se bifurquant de 2 en 2 centim. Diam. des calices, 14 mill. — *Corallien*: Geingen.

L'*Eunomia ringosa* de A. d'Orbigny est une variété de cette espèce, elle est de Wagnon et de Saulce-aux-Bois (Corallien).

aaa. *Plus de 2 cycles.*

11. C. SUBLÆVIS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.* — *Cyathophyllum gracile* et *sublæve*, Munster, 1841. — *Eunomia sublævis*, d'Or-

bigny, *Prod.* = Polypières courts et larges de 3 mill.; 20 cloisons égales et peu serrées. — *Saliférien* : Saint-Cassian.

12. C. CLEMENCIA, E. de Fromentel, *Descript. des Pol. foss. de l'étage Néoc.*, pl. 3, fig. 2-3. = Polypier en touffes serrées; calices subcirculaires; 18 cloisons subégales; souvent une, plus forte que les autres, s'avance seule au centre. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

13. C. HUMBERTI, Etallon, *loc. cit.*, 1850. = Calices circulaires, épithèque forte dont on ne voit que des traces circulaires; 18 cloisons plus fortes que les autres. Largeur des calices; 7 à 8 mill.; *Corallien* : Valfin.

aaaa. 2 Cycles seulement.

14. C.? NANA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Lithodendron nanum*, Römer, 1836. — *Amblocyathus conicus*, d'Orbigny, 1850. — *C. nana*, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 29. = Polypières cylindriques inégaux, larges de 4 à 5 mill. — *Néocomien* : Schæppenstedt.

Espèce dont le nombre de cloisons est inconnu.

15. C. LOMBRICALIS, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.* — *Calamophyllia id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Epithèque forte à plis séparés. Larg. des polypières, 8 mill. — *Corallien* : Oyonnax.

XIII^e Famille. — Stylosmiliens.

Stylinacées (pars), Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, 1856.

Chambres divisées par des traverses lamelleuses; multiplication par bourgeonnement latéral; cloisons entières ne présentant ni lobes, ni dents à leur partie supérieure.

GENRE LXI. — DONACOSMILIA.

Polypier fasciculé, atteignant une hauteur considérable; muraille couverte d'une épithèque complète et qui forme des bourrelets circulaires; calices ronds; cloisons larges, un peu débordantes et s'unissant au centre du calice; point de columelle; traverses nombreuses et bien développées.

1. DONACOSMILIA CORALLINA. — Polypier fasciculé, formant un cône renversé très-élargi à la base et haut d'environ 80 centim.; polypières cylindriques et très-longs; murailles souvent disposées en forme d'entonnoirs emboîtés les uns dans les autres. Il arrive quelquefois que les murailles de ces cornets ne se touchent pas directement, et qu'elles laissent entre elles un espace circulaire dans lequel se montre la partie externe des cloisons. L'épithèque bien développée qui recouvre ces cornets, cesse dans les points où les murailles ne se touchent pas, mais partout ailleurs elle recouvre exactement les murailles et forme des plis circulaires en forme d'escaliers; les calices sont circulaires et les cloisons assez épaisses et bien développées; on en compte de 24 à 48 suivant l'âge des calices. Les bourgeons se développent d'abord suivant un angle très-ouvert, puis ils s'inclinent du côté du polypière souche et montent parallèlement avec lui. Diam. des calices, 15 mill.; longueur des polypières de 12 à 18 centim. — *Corallien* : Ecuelle (Haute-Saône).

2. D. COTTEAU. = Cette espèce dont nous possédons des fragments, diffère de la précédente par des polypières plus étroits et moins droits ; les murailles sont toujours continues et l'épithèque forme des bourrelets arrondis et généralement très-réguliers. Les calices sont circulaires ; les cloisons assez épaisses ; on en compte environ 36 par calice. Diam. des calices, 10 à 12 mill. ; hauteur des polypières, de 7 à 10 cent. — *Corallien* : Environs d'Auxerre (Yonne).

GENRE LXII. — DENDROSMILIA.

Dendrosmilia, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, loc. cit., p. 468, 1848.

Polypier dendroïde ; gemmation latérale et alterne ; polypières courts ; muraille nue garnie de côtes granuleuses ; columelle spongieuse ; cloisons larges et granulées latéralement.

D. DUVALANA, Edwards et Haime, loc. cit. — *Ann. des sc. nat.*, t. X, p. 274, pl. 5, fig. 7, 1859. — *Parisien* : Auvert.

GENRE LXIII. — STYLOSMILIA.

Stylosmilia, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, loc. cit., p. 468. 1848.

Polypier fasciculé ; polypières libres entre eux, longs et cylindriques ; gemmation latérale ; épithèque bien développée et cachant des côtes subcristiformes ; calices ronds ; cloisons débordantes ; columelle styliforme et saillante ; traverses peu abondantes.

1. S. MICHELINI, Edwards et Haime, loc. cit. — *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., pl. 6, fig. 2. = Calices circulaires ; larges de 2 1/2 mill. ; 3 cycles, le dernier rudimentaire ; traverses simples et inclinées ; polypières très-longs. — *Corallien* : Chaudefontaine (Doubs) ; Raidersdorf.

2. S. NÉOCOMIENSIS, E. de Fromentel, *Descript. des pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 23, pl. 11, fig. 1-2. = Calices ronds et larges de 2 1/2 mill. ; polypières assez courts ; 24 cloisons inégales. — *Néocomien* : Gy-l'Evêque (Yonne).

3. S. GRACILIS, E. de Fromentel, loc. cit., p. 23, pl. 11, fig. 3-4, 1857. = Calices ronds, creux et larges de 1 1/2 mill. ; 12 cloisons inégales. — *Néocomien* : Gy-l'Evêque (Yonne).

Espèces non décrites.

4. S.? ORGANIZANS, d'Orbigny, *Revue et mag. de Zool.*, 1850, p. 174. — *Néocomien* : Saint-Sauveur ; Venay (Yonne).

5. S.? COTTEAUANA, d'Orbigny, loc. cit. — *Néocomien* : St-Sauveur.

6. S.? BREVIS, d'Orbigny, loc. cit. — *Néocomien* : St-Sauveur ; Leugny.

GENRE LXIV. — PLACOPHYLLIA.

Placophyllia, d'Orbigny, *Not. sur les Pol. foss.*, p. 8. 1849.

Polypier fasciculé, subastréiforme ; gemmation latérale ; polypières très-serrés et souvent soudés par l'épithèque ; dans ce dernier cas les polypières peuvent devenir polygonaux ainsi que les

calices ; columelle forte et styloforme ; cloisons bien développées non débordantes ; traverses vésiculeuses et abondantes.

Ce genre présente tous les caractères du précédent. il ne s'en distingue que par son aspect général, et ses polypierites moins libres ; les calices ont aussi des traverses plus nombreuses et des cloisons moins débordantes.

1. P. DIANTHUS, d'Orbigny, *Prod.*, t. 1, p. 385, 1850. — *Lithodendron Dianthus*, Goldfuss, pl. 13, fig. 8. — *Corallien* : Geingen ; Natheim.

2. P. SCHIMPERI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 51. — *Corallien* : Rupt (Haute-Saône).

La première de ces deux espèces est bien un Disastrée, ses polypierites sont souvent libres, arrondis et larges de 8 ou 10 mill. ; il y a 4 cycles de cloisons alternativement inégales.

La seconde nous laisse des doutes sur la véritable place qu'elle doit occuper. En effet, ce polypier est plutôt astréiforme que dendroïde, il est formé de couches minces comme les styloines et devrait peut-être rentrer parmi les astrocénies, il y a 3 cycles cloisonnaires et les calices ont 4 mill. de largeur.

XIV^e Famille. — Gladocoriens.

CLADOCORACÉES (*pars*), Edwards et Haime, *Hist. nat. du corail*, t. II, 1846.

Polypier en touffes dendroïdes, chambres divisées par des traverses ; gemmation latérale ; cloisons dentées.

GENRE LXV. — GONIOCORA.

Goniocora, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 96, 1851.

Polypier dendroïde, polypierites cylindriques et généralement écartés ; calices circulaires ; cloisons bien développées et peu nombreuses ; columelle petite et quelques fois styloforme ; point de palis. Muraille bien costulée et souvent munie d'une épithèque incomplète.

A. Type hexaméral. — a. 3 Cycles.

1. G. SOCIALIS, Edwards et Haime, *Brit. fos. corals.*, pl. 15, fig. 2. — *Lithodendron sociale*, Römer, 1839. — Polypierites cylindriques, égaux écartés et larges de 3 à 3 1/2 mill. ; calice circulaire ; 4 cycles de cloisons droites et inégales ; 4 cycles de côtes bien développées, et un peu inégales. — *Corallien* : Steeple-Ashton ; Knebel, etc.

2. G. GEMMATA. — Polypier en touffes fasciculées à l'extrémité des rameaux ; polypierite souche assez long et donnant d'abord un seul ou deux bourgeons ; puis de l'extrémité des polypierites secondaires naissent à la fois 3, 4 ou 5 bourgeons d'égale grandeur, cloisons larges ; columelle petite et styloforme ; 6 grandes cloisons, 6 moyennes et 12 petites ; murailles régulièrement costulées. Diam. des calices, 2 mill. — *Corallien* : Malan (Haute-Saône).

3. *G. KIMMERIDGIENSIS*. — Polypier assez court et bourgeonnant sou-vent; calices circulaires et peu profonds; côtes fortes et granuleuses; columelle assez bien développée et presque styloforme; 24 cloisons, dont 6 plus développées que les autres. Diam. des calices, un peu plus de 2 mill.; diam. des rameaux supérieurs, 3 mill.; des rameaux inférieurs, 6. — *Kimmeridgien* : Arc, près Gray.

4. *G. CRASSA*, Etallon, *loc. cit.* == Polypier peu rameux, rameaux cylindriques; 3 cycles de cloisons; celles des 2 premiers cycles égales; columelle bien développée. Diam. des calices, 5 1/5 mill. — *Corallien* : Valfin.

A. — aa. 2 Cycles seulement.

5. *G. STELLARIÆFORMIS*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 605, t. II, 1856. — *Cladophyllia id.*, *ibid.*, *Pol. foss. des tcr. Pal.* — *Lithodendron stellariæforme*, Zenker, 1835. == 6 grandes cloisons, minces au centre, 6 plus petites; 24 côtes égales; branches cylindriques, larges de 3 à 5 mill. — *Lias* : de Speckenbrinke à Dniester.

B. — Type octoméral.

6. *G. ELONGATA*, Etallon, *loc. cit.* == Rameaux cylindriques, longs et flexueux; 32 côtes fines et serrées; 16 cloisons fortes débordantes, dont 8 plus fortes et soudées à une columelle spongieuse. Diam. des calices, 2 mill. — *Corallien* : Valfin.

Cette espèce est peut-être une *Cladocora* ou une *Dendrosmilie*.

C. — Type décaméral.

7. *G. HAIMEL*. == Polypier petit, dendroïde; polypierite souche très-long et portant des bourgeons qui s'écartent à angle droit; côtes serrées et extrêmement fines; cloisons minces et débordantes; 10 grandes et 10 petites. Diam. des calices, 2 à 2 1/2 mill. — *Corallien* : Champlitte.

Espèce douteuse.

8. *G. ? VERTICILLATA*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 96, 1851. — *Lithodendron verticillatum*, Munster, *Beit. zur Petref.*, 4^e partie, pl. 11, fig. 22. == Polypier cylindro-turbiné, atténué à la base et large en haut de 3 mill., et portant des bourgeons disposés en verticille. — *Saliférien* : Saint-Cassian.

Ce dernier fossile nous paraît être une *Blastosmilie* et devrait alors porter le nom de *Blastosmilie verticillata*.

GENRE LXVI. — CLADOCORA.

Cladocora (pars), Ehrenberg et Hemprich, *Corall. des roth. Meer.*, p. 85, 1834.

Cladocora, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 3^e série, t. XI, p. 305, 1849.

Polypier en buisson; polypierites allongés, cylindriques et libres; épithèque peu développée ou nulle; calices circulaires et peu profonds; columelle papilleuse; cloisons subégales, débordantes et finement dentées; palis bien développés et dentés, se trouvant de-

vant tous les cycles qui précèdent le dernier; la columelle est due aux dents internes des palis. Muraille costulée dans toute sa hauteur.

Les espèces fossiles que les auteurs ont fait rentrer dans ce genre, qui a pour types des polypiers vivants, sont encore douteuses et ne présentent pas toujours les véritables caractères des Cladocores.

A. — 4 Cycles complets.

1. C.? SIMONYI, Reuss, *loc. cit.*, pl. 12, fig. 5-7, 1854. == Polypières larges de 6 à 8 mill.; des collerettes murales en certains points; calices circulaires; 4 cycles de cloisons inégales et un peu flexueuses. — Turonien : Gosau. — Cette espèce est peut être une *Calamophyllie*.

B. — 3. Cycles et des cloisons d'un 4^e.

2. C.? HUMILIS, Geinitz, 1846. — Edwards et Haime, 1849. — d'Orbigny, 1850. — *Lithodendron humile*, Michelin, pl. 6, fig. 9, 1841. == Polypier en buisson; polypières portant des collerettes murales très-développées, côtes égales, distinctes; 32 à 36 cloisons. Diam. des calices, 5 mill. — Turonien : Uchaux; Figuières, etc.

Cette espèce est probablement encore une *Calamophyllie*.

3. C. PREVOSTANA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, 40 cloisons inégales. Diam. des calices, 6 mill. (Cette espèce dépend probablement du type décaméral.) Subapennin : Sicile; Castel-Arquato.

4. C. MULTICAULIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Lithodendron multi-caule*, Michelin, pl. 75, fig. 4. == Polypier en touffe peu élevée; bourgeonnement très-fréquent; cloisons minces, soudées entre elles; columelle bien développée. Diam. des calices, 5 mill. — Falunien : Manthelán.

5. C. GRANULOSA, Geinitz, 1846. — Edwards et Haime, *loc. cit.* == Polypières cylindriques, larges de 4 mill.; 28 à 32 cloisons; cloisons inégales. — Subapennin : Castel-Arquato; Val d'Arno.

6. C.? TENUIS, Reuss, *loc. cit.*, pl. 6, fig. 24, 25. == Rameaux cylindriques, larges de 2 mill.; 24 à 28 cloisons, palis petits. — Turonien : Saint-Wolfgang.

C. — 3 Cycles seulement.

7. C. MANIPULATA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, 1851. — *Lithodendron manipulatum*, Michelin, pl. 10, fig. 4. == Polypières serrés, larges de 3 à 4 mill.; 25 cloisons. — Falunien : Turin.

8. C. MICHELOTTII, Edwards et Haime, *loc. cit.* — C. *cæspitosa*, d'Orbigny, *Prod.* — *Lithodendron flexuosum*, Michelin, pl. 10, fig. 2. == Polypières courts, larges de 5 mill.; 20 à 24 cloisons. — Falunien : Tortone.

D. — 2 Cycles seulement.

9. C. INTRICATA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Lithodendron intricatum*, Michelin, pl. 10, fig. 5. == Polypières petits, allongés, larges de 3 mill.; 12 cloisons inégales. — Falunien : Turin.

10. C. REUSII. — C. *cæspitosa*, Reuss, *Natur. Abhandl. v. Haidinger*,

t. II, p. 20, pl. 3, fig. 6 et 8. = Polypiérites petits, côtes inégales et cristiformes. — *Falunien* : Vienne; Moravie.

GENRE LXVII. — PLEUROCORA.

Pleurocora, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, etc., p. 494, 1848.

Polypier dendroïde; polypiérites cylindriques et assez courts; calices circulaires et peu profonds; columelle papilleuse; palis bien développés devant tous les cycles qui précèdent le dernier; cloisons non débordantes, minces, serrées et finement dentelées; point d'épithèque; côtes fortes et bien développées, droites près des calices et un peu vermiculées sur le reste de la muraille.

Ce genre très-voisins du précédent, ne s'en distingue que par sa forme générale, ses murailles entièrement nues et les dents plus fines et plus régulières des cloisons.

A. — 4 Cycles complets.

1. P. GEMMANS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, 1849. — *Lithodendron gemmans*, Michelin, *Icon.*, pl. 72, fig. 6, 1847. = Polypiérites courts et inclinés sur leur base; calices circulaires et larges de 2 1/2 mill.; columelle bien développée; 48 cloisons minces et serrées. — *Turonien* : Corbières.

2. P. RAMULOSA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Lithodendron ramulosum*, Michelin, pl. 72, fig. 8. = Diffère du précédent en ce que celui-ci a ses bourgeons sur une seule face, tandis que le second est arborescent. — *Turonien* : Corbières.

3. P. EXPLANATA, Edwards et Haime, *Ann. loc. cit.*, pl. 7, fig. 10. = Polypier en espalier, ayant tous les calices tournés du même côté; calices circulaires, larges de 4 mill.; profonds de 2; on compte 52 cloisons, (4 cycles et plus). Epaisseur du polypier, 7 mill. — *Turonien* : Obourg, près Mons.

4. P. REUSSI, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, p. 602, 1856. — *P. Haueri*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 6, fig. 26 et 27. = Polypier largement fixé; polypiérites libres dans une petite étendue; calices circulaires, larges de 7 à 8 mill.; 4 cycles et quelques cloisons d'un 5^e; cloisons droites, serrées, étroites et inégales. — *Turonien* : Gosau.

B. — 3 Cycles et des cloisons d'un 4^e.

5. P. HAUERI, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, 1849. — *P. rudis*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 11, fig. 13-15, 1854. = Polypier dendroïde; côtes grosses et flexueuses; 32 cloisons épaisses en dehors et minces en dedans; palis étroits. Diam. des calices, 6 à 7 mill. — *Turonien* : Gosau, etc.

6. P. KONINCKI, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Calices larges de 3 1/2 mill., peu élevés et placés à la partie supérieure d'un tronc épais, costulé et haut de 20 mill.; 42 cloisons. — *Turonien* : Obourg.

7. P. ALTERNANS, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypiérites naissant l'un de l'autre alternativement à droite et à gauche; côtes fines et

flexueuses; calices circulaires, en saillie, peu profonds et larges de 3 mill.; 36 cloisons peu débordantes. — *Turonien* : Obourg.

M. d'Orbigny cite encore, sans le décrire, le P. PAILLETTEANA. — *Turonien* : Source-Salée (Aude).

XV^e Famille. — Rizangiens.

ASTRANGIACÉES (*pars*), Edwards et Haime, *His. nat. des coral.*, t. II, 1856.

Chambres divisées par des traverses lamelleuses; bourgeonnement basilaire; polypiérites généralement courts.

GENRE LXVIII. — CRYPTANGIA.

Cryptangia, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, etc., p. 496, 1848.

Les polypiérites bourgeonnent sur des stolons qui ne se durcissent pas, car on ne les retrouve jamais à l'état fossile, ils deviennent donc libres; ils sont cylindroturbinés, entourés d'une épithèque complète; les calices sont circulaires à fossette bien marquée; la columelle est papilleuse et bien développée; les cloisons minces, serrées et dentelées.

1. C. WOODI, Edwards et Haime, *Brit. foss. coral.*, pl. 1 fig. 4. — *C. curiosa*, d'Orbigny, *Prod.* == Polypiérites immergés dans des masses de Cellepores; 16 à 20 cloisons minces et un peu courbées; calices circulaires, larges de 3 ou 4 mill. — *Falunien* : Ramsholt; Sutton.

2. C. PARASITA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit. — *Lithodendron parasitum*, Michelin, *Icon.*, pl. 75, fig. 3. == Polypiérites plus grêles que dans l'espèce précédente; 24 cloisons, dont 8 plus développées (type octoméral?), calices circulaires et larges de 2 à 2 1/2 mill. — *Falunien* : Manthelan.

A. d'Orbigny cite encore sans le décrire, le *C. intermedia*, qui aurait des calices plus larges que le *C. parasita*, il est aussi du *Falunien* de Manthelan.

GENRE LXIX. — RIZANGIA.

Rizangia, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, loc. cit., p. 496, 1848.

Polypiérites assez rapprochés et unis par des stolons qui se durcissent ordinairement; ils sont courts, subcylindriques et largement fixés; épithèque complète et bien développée; calices circulaires et superficiels; columelle papilleuse; cloisons larges, minces et finement dentées.

A. — 5 Cycles complets.

1. R. BRAUNI, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit. 1849. — *Anthophyllum Braunii*, Michelin, pl. 63, fig. 9 (calice isolé). == Polypiérites petits; épithèque mince; calices superficiels, larges de 7 mill.;

columelle petite. Haut. des polypières, 4 mill. — *Turonien* : Corbières.
 2. R. SEDGWICKI, Reuss, *Denk. der Wiener acad.*, pl. 7, fig. 11, t. VII.
 == Stolons peu développés; polypières courts; calices superficiels, larges de 10 mill.; plus de 100 cloisons minces, serrées et anastomosées.
 — *Turonien* : Gosau.

B. — 4 Cycles complets.

3. R. BREVISSIMA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit. — *Astrea id.*, Deshayes in Ladoucette, *Hist. des Hautes-Alpes*, pl. 13, fig. 13, 1834. — Michelin, *Icon.*, pl. 63, fig. 8, 1846. == Stolons striés longitudinalement; calices superficiels, larges de 6 mill.; hauteur des polypières, 3 mill. MM. Edwards et Haime rapportent cette espèce aux terrains *éocène et miocène*, et indiquent Faudon et St-Bonnet pour le premier et Gaas pour le second. Ce passage, d'un terrain dans un autre, d'une même espèce a besoin d'être bien vérifié pour être accepté.

4. R. MARTINI, Edwards et Haime, loc. cit. == Polypières hauts de 15 mill.; épithèque forte et plissée; columelle développée; 4 cycles; calices larges de 6 à 7 mill. *Fatunien* : Carry.

5. R. MICHELINI, Reuss, loc. cit., pl. 7, fig. 7 et 8. == Stolons très-développés et en réseau; polypières peu élevés; calices circulaires, larges de 4 mill.; columelle bien développée; 18 cloisons minces, serrés et inégales. — *Turonien* : Gosau.

Syrtrastrées Apores.

XVI^e Famille. — Eugyriens.

Euphylliacées (pars), Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, p. 183, 1856.

Polypier ayant les chambres divisées par des traverses; séries libres par leurs côtés ou soudées par les murailles, ou réunies au moyen d'un cœnenchyme abondant; cloisons entières, ne présentant ni dents, ni lobes sur leur bord supérieur. Multiplication par fissiparité.

GENRE LXX. — STENOGYRA.

Polypier massif, épais; séries libres par les côtés et constituant des lames épaisses et peu pliées; murailles nues et garnies de côtes cristiformes, séparées par des sillons profonds, et très-saillantes près du bord calicinal; cloisons entières, généralement très-épaisses et présentant des stries transversales sur leur partie interne qui est aplatie et de fortes granulations sur leurs faces latérales; columelle nulle; traverses rares.

Ce genre diffère des Eusmilies par sa forme lamellaire et par le développement et la constitution de ses cloisons.

1. S. CORALLINA. == Polypier pédiculé et épais; muraille nue et présentant des côtes en forme de crêtes élevées de 3 à 7 millimètres et séparées par des sillons larges de 6 à 7 millimètres; entre ces grandes

côtes se trouvent des côtes moins prononcées à la partie supérieure du polypier seulement, et qui correspondent aux cloisons secondaires; les cloisons tertiaires n'ont pas de côtes correspondantes; cloisons primaires épaisses de 3 millimètres au centre, à bord aplati, et garnies de stries transversales, formant des petites pointes qui vont joindre souvent celles des cloisons voisines; la partie supérieure des cloisons est amincie comme les côtes et débordante; les cloisons secondaires sont minces au centre ou peu aplaties et les tertiaires sont rudimentaires; les faces latérales des cloisons sont garnies d'aspérités assez semblables à celles qu'on remarque sur la carapace de certains crustacés. Il arrive quelquefois que deux grandes cloisons opposées se soudent par leur bord interne et interrompent ainsi les séries. Diam. des séries, 25 à 30 mill. — *Corallien* : Champlitte.

2. *S. PLICATA*. — Cette espèce diffère de la précédente par ses lames plus contournées, ses cloisons moins épaisses, et ses côtes plus superficielles; les cloisons sont aussi très-débordantes, aplaties sur leur bord interne, mais épaisses seulement de 2 mill.; les séries sont aussi interrompues quelquefois par l'union de grandes cloisons. — *Corallien* : Champlitte.

3. *S.?* *PERRONI*. — Nous rapportons encore à ce genre un fossile du *Corallien* inférieur de Champlitte dont nous n'avons pu examiner qu'un fragment; les cloisons sont encore moins épaisses que dans l'espèce précédente, mais beaucoup plus débordantes et plus amincies au sommet; elles sont très-aplaties sur leur bord interne et présentent des stries transversales bien prononcées. Les côtes sont aussi plus régulières et descendent moins le long de la muraille. — *Corallien* : Champlitte.

GENRE LXXI. — EUGYRA.

Eugyra, E. de Fromentel, *Desc. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 30, 1857.

Polypier pédiculé, étalé, un peu convexe à la partie supérieure; plateau couvert d'une épithèque complète et plissée; vallées calicinales contournées au centre, puis devenant droites en se dirigeant vers la circonférence; séries intimement soudées par les murailles; cloisons entières à bords arqués; columelle nulle, calices indistincts; endothèque bien développée.

1. *E. COTTEAUI*, E. de Fromentel, *loc. cit.*, pl. 111, fig. 4-5, 1857. — Polypier turbiné, convexe en-dessus; cloisons épaisses alternativement grandes et petites; les petites cloisons sont adossées aux grandes cloisons de la série voisine; on compte 5 cloisons dans une longueur de 2 mill. — *Néocomien* : Gy-l'Évêque (Yonne).

2. *E. NECOMIENSIS*, E. de Fromentel, *loc. cit.*, pl. 111, fig. 6-7, 1857. — Polypier étalé; cloisons alternativement inégales; on en compte 9 dans une longueur de 2 mill. — *Néocomien* : Gy-l'Évêque (Yonne).

GENRE LXXII. — RHIPIDOGYRA.

Rhipidogyra, Edwards et Haime, *Pol. fos. des ter. Pal.*, 1851. — (*Pars*) *ibid.*, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, 1849.

Stylogyra et *Lasmogyra*, d'Orbigny, *Not. sur les Pol. fos.*, 1849.
Lobophyllia (pars), Michelin, *Icon. Zool.*, p. 92, 1843.

Polypier pédiculé, composé de lames assez épaisses et libre par ses murailles latérales; centres calicinaux indistincts; columelle lamellaire, mince et non interrompue; côtes droites, souvent cristiformes près du calice; cloisons minces ou épaisses suivant les espèces: les cloisons épaisses ont ordinairement le bord interne aplati et strié transversalement.

A. — 3 Ordres de cloisons.

1. R. FLABELLUM, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, 1849. *Lobophyllia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 18, fig. 1, *Stylogyra id.*, d'Orbigny, *Prod.* == Polypier flabelliforme, pédonculé; côtes saillantes en haut, cristiformes, alternativement longues et courtes; vallée superficielle. Largeur de la série, 15 à 25 mill. — *Corallien*: Saint-Mihiel; Chatel-Censoir.

2. R. CRASSA. == Polypier formant des lames assez épaisses, étendues, hautes et presque droites; côtes fortes, cristiformes et un peu ondulées; cloisons à bord supérieur débordant, mais horizontal; cloisons primaires, épaisses de 3 mill., à bord interne, aplati; souvent les cloisons primaires se dédoublent pour donner naissance à une cloison secondaire ou tertiaire; columelle lamellaire bien développée. Largeur de la série, 20 à 22 mill. — *Corallien*: Champlitte; Selongey (Hte-Marne); environs d'Auxerre (Yonne).

3. R. MARTINI. — R. *Martiniana*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.* — *Hist. des coral.* p. 215, 1856. — *Lobophyllia Martiniana*, Michelin, *Icon.*, pl. 66, fig. 4. == Polypier à lame flexueuse; cloisons minces et serrées. Largeur de la série calicinale, 13 mill. — *Turonien*: Martignes; Fignières.

4. R. INSIGNIS. == Polypier en masses considérables; lames contournées; murailles élevées, nues et couvertes dès la base de côtes cristiformes interrompues, comme dans l'*Aptosmia elegans*; cloisons du premier ordre épaisses, mais minces et saillantes par leur bord supérieur, et aplaties par leur bord interne; cloisons secondaires moins épaisses, mais s'élargissant par leur bord interne et présentant comme les primaires une surface plate à la columelle; les cloisons tertiaires sont assez larges, mais restent minces; les vallées sont longues et, arrivées à une certaine étendue, elles s'interrompent au moyen de la soudure de deux cloisons principales opposées et là s'opère peu à peu un étranglement qui amène bientôt une séparation entre les deux vallées et donne lieu à deux lames libres par leur sommet; les lames ont jusqu'à 14 et 15 cent. de hauteur; les vallées sont larges de 15 à 20 mill. Une longueur de 5 mill. renferme les cloisons des 3 ordres. — *Corallien*: Champlitte.

B. — Deux ordres de cloisons.

5. R. OCCITANICA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, — *Lasmogyra id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Lobophyllia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 67, fig. 2. == Cloisons alternativement grandes et petites, elles sont serrées et minces; largeur de la vallée, 20 à 25 mill. — *Turonien*: Corbières; Gosau.

6. R. UNDLATA, Reuss, *loc. cit.*, pl. 20, fig. 10-12. == Cloisons alternativement épaisses et minces; côtes inégales et saillantes près du bord calicinal; largeur des séries, 5 mill. — *Turonien*: Gosau.

GENRE LXXIII. — PHYTOGYRA.

Phytogyra d'Orbigny, *Not. sur les Pol. foss.*, p. 6, 1849.

Polypier composé, formant des séries libres par leur côté, peu élevées et qui rampent horizontalement; muraille nue, couverte de granulations et garnie à sa partie supérieure seulement de côtes fortes et de stries fines sur le reste de son étendue; centres calicinaux indistincts; columelle lamellaire et continue; branches souvent ramifiées.

La forme courte des rameaux et leur ramifications horizontales distinguent bien ce genre des *Rhipidogyres*.

1. P. MAGNIFICA, d'Orbigny, *Prod.*, t. II, p. 58, 1850. — *Cours élém. de Paléon.*, t. II, fig. 301. — Séries rameuses peu épaisses, larges de 15 mill. et hautes d'autant; columelle très-mince; 3 ordres de cloisons, les primaires et les secondaires épaisses et débordantes. — *Corallien*: Oyonnax.

2. P. FROMENTELI, Etallon, *Etud. Pal. sur le Haut-Jura*. — Polypier formant des expansions rameuses très-étendues et compliquées et dont l'ensemble peut avoir 60 centim. de diam.; les séries sont horizontales, très-rameuses et partent d'un point central; les séries en se ramifiant se rencontrent souvent et sont déviées de leur direction ou se soudent avec leur voisine. Il existe 3 ordres de cloisons, les primaires sont épaisses, débordantes, mais amincies à leur partie supérieure et se continuent avec de côtes très-courtes et très-saillantes; les secondaires sont moins épaisses et moins saillantes et les tertiaires sont très-minces; le bord interne des cloisons des premier et second ordres est aplati en face de la columelle; la muraille est nue et couverte de stries granuleuses. Diam. des séries, de 18 à 22 mill.; hauteur des séries, 25 mill.; hauteur totale du polypier, 80 mill. — *Kimmeridgien*: Montureux (Hte-Saône).

3. P. DESHAYESI. — *Lobophyllia Deshayesiaca*, Michelin, *Icon.*, pl. 20, fig. 1. — *Caryophyllia* id., Geinitz, 1846. — *Phytogyra Deshayesiaca*, d'Orbigny, *Prod.* — *Rhipidogyra Deshayesana*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, 1851. — Cette espèce encore douteuse a des côtes fortes, saillantes, alternativement inégales; ses cloisons sont larges; les primaires fortes et aplaties près de la columelle; les secondaires et tertiaires très-minces. Diam. des séries, 15 mill.; hauteur des branches, 20 à 25 mill. — *Corallien*: Saint-Mihiel; Tonnerre; Nantua. M. Etallon cite aussi Valfin.

GENRE LXXIV. — PACHYGYRA.

Pachygyra, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, loc. cit., p. 468, 1848.

Polypier fixé par un pédoncule et formé de lames pliées diversement; ces lames ne sont pas soudées entre elles par les murailles, mais elles sont réunies par un cœnenchyme compact, abondant et très-granulé; la columelle est lamellaire, mince et continue; les cloisons sont entières et débordantes; les côtes sont peu développées et l'épithèque nulle.

A. — *Trois ordres de cloisons.*

1. *P. DELUCI*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 285, 1849. — *P. Deluci* et *tuberosa*, d'Orbigny, *loc. cit.* — Etallon, *loc. cit.* == Polypier subhémisphérique à pédoncule très-développé ; séries écartées entre-elles et peu saillantes ; cloisons inégales en largeur et en épaisseur suivant les ordres. Largeur des séries, 6 à 8 mill. — *Corallien* : Chatel-Censoir ; Valfin.

2. *P. COTTEAUL*. — *P. cottaldina*, d'Orbigny, *Prod.* — *P. cottellana*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.* — *P. cotteana*, *id.*, *Hist. nat. des coral.* == Diffère de l'espèce précédente par des vallées plus contournées et plissées. Largeur des séries, 8 à 10 millim. — *Corallien* : Chatel-Censoir ; Nantua.

3. *P. KNOBRI*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 285, 1849. == Diffère du *P. Deluci* par ses séries plus élevées au-dessus du cœnenchyme et plus larges. Largeur des séries, 10 mill. — *Corallien* : Département du Lot.

4. *P. EXCELSA*, Etallon, *loc. cit.* == Polypier très-élevé à surface supérieure subplane ; séries très-rapprochées, très-plissées et larges de 7 mill. ; 6 cloisons primaires par centim. — *Corallien* : Valfin.

5. *P. CAUDATA*, Etallon. == Cette espèce nous paraît très-voisine du *P. Deluci* et n'en diffère que par ses cloisons plus minces. On compte 8 primaires par centim. — *Corallien* : Valfin.

6. *P. EXPANSA*, Etallon, *loc. cit.* == Polypier étalé, fixé par un pédoncule étroit ; cœnenchyme abondant entre les séries et formant des ambulacres larges de 30 à 40 mill. ; séries profondes et larges de 6 mill. ; cloisons peu saillantes ; on en compte 6 par centim. — *Corallien* : Valfin.

7. *P. ORNATA*, d'Orbigny, *Prod.*, t. II, p. 38, 1850. == Polypier massif ; vallées larges de 3 mill., séparées par des ambulacres larges de 3 à 6 mill. ; cloisons primaires seules épaisses, les autres minces. — *Corallien* : Nantua.

B. — *Deux ordres de cloisons seulement.*

8. *P. LABYRINTHICA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 284, 1849. — *Lobophyllia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 66, fig. 3, 1846. == Polypier massif résultant des plis d'une seule série ; cœnenchyme formant des ambulacres larges de 10 à 20 mill. et creux ; les côtes sont subégales et flexueuses ; cloisons alternativement épaisses et minces. Largeur des séries, 5 à 6 mill. — *Turonien* : Bains de Rennes.

9. *P. PRINCEPS*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 3, fig. 1-3. == Cette espèce ne diffère de la précédente que par ses séries plus superficielles, moins libres et par un cœnenchyme plus développé. — *Turonien*. Gosau.

10. *P. DÆDALEA*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 14, fig. 3-4. == Polypier petit ; séries irrégulièrement contournées et larges de 3 mill. ; ambulacres montrant des côtes épaisses et crenelées ; cloisons alternativement grandes et petites, — *Turonien* : Gosau.

GENRE LXXV. — DENDROGYRA.

Dendrogyra, Ehrenberg, *Corall. des Roth. Meer.*, p. 100, 1834.

Polypier composé, massif ; séries plus ou moins flexueuses et

complètement soudées par les murailles; collines larges et sub-planes; centres calicinaux subdistincts; columelle lamellaire souvent interrompue et renflée vers les points qui paraissent des centres calicinaux; les cloisons sont épaisses et serrées; les traverses bien développées, mais écartées; le plateau commun est couvert d'une épithèque plissée; les cloisons sont entières et arquées à leur bord supérieur.

1. *D. RASTELLINA*. — *Meandrina id.*, Michelin; pl. 18, fig. 7. — *Myriophyllia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Meandrina angustata ibid.*, *Prod.* == Polypier polymorphe, hémisphérique, gibbeux ou étalé; collines simples présentant au sommet un sillon, qui n'est que le résultat de la saillie des cloisons; cloisons larges, cristiformes, entières, subégales, légèrement inclinées cà et là vers des points qui représentent des centres calicinaux; columelle formée d'une lame quelquefois interrompue et renflée cà et là. Diam. des séries, 6 mill.; il y a 12 cloisons par centimètre. — *Corallien*: Lifol (Vosges); St-Mihiel; Chatel-Censoir; Oyonnax; Ecuelle (Hte-Saône; Selongey, etc.

2. *D. æQUICOSTATA*. == Polypier convexe; plateau recouvert d'une forte épithèque plissée; séries peu tortueuses; centres calicinaux très-peu distincts; cloisons fortes, épaisses quelquefois d'un mill. et sub-égales. Cependant on peut voir qu'alternativement elles sont un peu différentes en épaisseur; columelle mince, souvent interrompue et représentée par des renflements successifs; vallées parallèles, creuses et larges de 5 mill.; 12 cloisons par centim. — *Corallien*: Environs d'Auxerre.

3. *D. ELEGANS*. — *Meandrina id.* d'Orbigny. *Prod.* == Polypier gibbeux; séries très-tortueuses et larges de 3 à 3 1/2 mill.; cloisons minces, peu serrées; on en compte 17 à 18 par centim.; elles sont de deux ordres et peu inégales; columelle interrompue et formée le plus souvent d'une suite de tubercules allongés. — *Corallien*: Environs d'Auxerre; Chatel-Censoir.

4. *D. ARCENSIS*. — Cette espèce assez voisine du *D. Rastellina*, en diffère par sa forme aplatie, ses collines superficielles, ses vallées moins profondes et plus larges; la columelle est aussi moins développée. Largeur des séries 7 à 8 mill., on compte 9 ou 10 cloisons par centim. — *Kimmeridgien*: Arc-les-Gray.

Il est probable que d'autres fossiles indiqués sous le nom de *Meandrina*, tel que le *M. Salisburgensis*, Edwards et Haime, doivent rentrer dans ce genre, mais n'ayant point examiné nous-mêmes ces espèces, nous nous abstenons, quant à présent, de les changer de genre.

XVII^e Famille. — Latimeandriens.

ASTREACÉES (*pars*), Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 454, 1856.

Syrastrées ayant les chambres divisées par des traverses lamelleuses. Multiplication par bourgeonnement; cloisons dentées.

GENRE LXXVI. — LATIMEANDRA.

Latimeandra, (*Latomæandra*), d'Orbigny in Milne. Edwards et J. Haime, *Ann. des sc. nat.*, 3^e série, t. XI, p. 270, 1849.

Latomeandra, *Axophyllia*, *Microphyllia*, *Comophyllia*, *Outophyllia*, d'Orbigny, *Not. sur les Pol. foss.*, p. 8, 9, 1849.

Polypier massif ou dendroïde ; polypières toujours soudés par les murailles et disposés en séries plus ou moins longues ; les murailles qui limitent les séries sont plus hautes que les autres et forment des collines ; l'épithèque est rudimentaire ou nulle ; les murailles sont couvertes de côtes fines , simples , granuleuses et peu saillantes ; les cloisons sont finement et régulièrement dentées et anastomosées ou libres.

A. — *Séries larges de 15 à 20 millimètres.*

1. L. *MAGNIFICA*. = Polypier en masse arrondie et élevée ; vallées longues ; calices bien délimités et polygonaux : cloisons épaisses et régulièrement dentées ; on en compte de 48 à 52, dans les grands calices. elles sont peu inégales et assez épaisses ; l'espace columellaire est parfaitement rond et creusé en tube. Diam. des séries de 15 à 20 mill. — *Corallien inférieur* : Charcenue (Hte-Saône).

B. — *Séries larges d'environ 15 millimètres.*

2. L. *CORRUGATA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.* — *Outophyllia* et *Microphyllia* id., d'Orbigny, *Prodrome*. = Polypier massif et pédonculé à surface convexe ; 70 à 80 cloisons par calice , elles sont minces , serrées et anastomosées. Profondeur des calices, 3 mill. — *Corallien* : Saint-Mihiel (Meuse).

3. L. *MICHELOTH*, J. Haime, *Mém. de la Soc. Géol. de France*, t. IV, p. 287, 1852. = Vallées peu profondes , centres bien distincts ; 40 cloisons serrées , minces , inégales et anastomosées. — *Parisien* : Castel-Gomberto.

4. L. *GASTALDI*, J. Haime, *loc. cit.* = Polypier turbiné ; côtes inégales ; cloisons très-nombreuses et très-fines et alternativement inégales ; collines en arêtes minces et saillantes. Largeur des vallées , 12 à 15 mill. ; profondeur, 5 à 6 mill. — *Parisien* : Castel-Gomberto.

5. L. *STELLATA*. = Polypier massif , à surface subplane , séries assez longues et larges de 12 à 15 mill. ; calices bien marqués et peu profonds ; cloisons fines , écartées et inégales ; on en compte 18 à 24 par calice. Il arrive souvent que 6 cloisons seulement arrivent au centre où elles s'unissent ; traverses bien développées. — *Corallien* : Environs d'Auxerre.

C. — *Séries larges d'environ 10 millimètres.*

6. L. *SÆMMERINGI*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, 1849. — *Meandrina* id., Goldfuss, pl. 38, fig. 1. — *Microphyllia* id., d'Orbigny, *Prod.* = Polypier subplane ; séries courtes , larges de 10 mill. et profonde de 3 ; 60 cloisons par calice ; columelle rudimentaire. — *Corallien* : Natheim ; Gy ; Champlitte (Haute-Saône).

7. L. ? *FLEMINGI*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 27, fig. 9. = Polypier élevé à surface subplane ; séries courtes ; calices restant le plus souvent circoncrits et polygonaux comme chez les Isastrées ; 60

cloisons dans les grands calices. Diamètres des calices de 12 à 15 mill. : des séries, 10 seulement. — *Bajocien* : Cheltenham.

8. *L. ASPERRIMA*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 18, fig. 3-4. = Vallées irrégulières, mais dirigées presque toutes dans le même sens; centres calicinaux distincts; cloisons subégales et assez épaisses. Largeur des séries, 8 à 10 mill. — *Turonien* : Gosau, etc.

9. *L. CARYOPHYLLATA*. = Ce fossile qui est voisin pour la forme du *L. corrugata* a les crêtes moins aigues, les vallées moins larges et plus profondes, les cloisons très-fines et très-serrées; on en compte 10 dans une longueur de 3 mill. au sommet des collines. Largeur des vallées, 7 à 10 mill. — *Corallien* : Eueulle.

10. *L. FLOSCULUS*, E. de Fromentel, *Descript. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 33, pl. 111, fig. 8-9 (les séries ne sont pas représentées assez larges). = Polypier pédonculé; séries irradiant du centre; de 24 à 60 cloisons suivant l'âge des calices; elles sont fines et anastomosées; il arrive quelquefois que, sur les bords, les séries sont réunies au moyen des côtes qui sont fines et serrées. — *Néocomien* : Gy-l'Evêque (Yonne).

11. *L. PELISSIERI*, E. de Fromentel, *Not. sur les Pol. foss. de l'étage Portland. de la Haute-Saône*, 2^e série, t. XIII, p. 863, 1856. = Polypier peu élevé à surface convexe; séries assez courtes et larges de 10 à 11 mill.; calices bien circonscrits et polygonaux; environ 72 cloisons assez épaisses, inégales, anastomosées; 12 seulement atteignent le centre. — *Portlandien* : Mantoche; Gray-la-Ville (Hte-Saône).

D. — Séries larges de 5 à 8 millimètres.

12. *L. SULGATA*. = Polypier en masse hémisphérique; vallées très-profondes et très-tortueuses; cloisons bien dentées et très-serrées; centres calicinaux distincts et creux; on compte 28 à 30 cloisons par centre. Diam. des séries, 7 à 8 mill., cependant il y en a qui atteignent 10 millimètres. — *Corallien* : Champlitte.

13. *L. MEANDRINOIDES*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea id.*, Reuss, 1846. = Polypier massif et convexe; vallées courtes et larges de 5 à 7 mill.; 40 à 50 cloisons par calice; collines minces. — *Turonien* : Koriczan.

14. *L. ATACIANA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.* — *Meandrina id.*, Michelin, pl. 69, fig. 1. — *Outophyllia et Microphyllia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *L. tenuisepta*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 11, fig. 1-2, 1854. = Vallées peu sinueuses; centres peu distincts; on compte 25 cloisons dans l'espace d'un centim. Largeur des vallées, 5 à 7 mill. — *Turonien* : Bains de Rennes; Wolfgang.

15. *L. CONCENTRICA*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 17, fig. 1. = Diffère de la précédente par ses vallées concentriques, et ses cloisons plus épaisses. — *Turonien* : Piesting.

16. *L. RAULINI*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.* — *Microphyllia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Meandrina id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 18, fig. 8. = Polypier convexe; vallées courtes et sinueuses; calices profonds et distincts; vallées larges de 5 à 8 mill.; cloisons minces, serrées, peu inégales et dentées, on en compte environ 60 par calice. — *Corallien* : St-Mihiel; Andeyron; Salins; Valfin.

17. *L. BRACHYGYRA*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 13, fig. 11 et 12. = Poly-

pier en masse dendroïde ou gibbeuse ; séries flexueuses , larges de 4 à 6 mill. ; centres bien distincts ; 24 cloisons droites ou courbées et peu inégales. — *Turonien* : Gosau.

18. L. MEANDRA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Onolophyllia id.*, d'Orbigny, *Prod.* == Polypier massif ; séries larges de 5 à 6 mill., et profondes de 3 ; environ 30 cloisons minces et serrées. — *Bajocien* : Vonceourt (Haute-Marne).

19. L. LAMELLI-DENTATA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 548, t. II, 1856. — *Meandrina lamello-dentata*, Michelin, *Icon.*, pl. 18, fig. 9. — *Onolophyllia id.*, d'Orbigny, *Prod.* == Cette espèce ne paraît différer du *L. Raulini* que par des séries un peu plus larges ; elles sont courtes et ont 8 mill. de largeur. — *Corallien* : Sampigny ; Pointe-de-Ché.

20. L. DAVIDSONI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 27, fig. 10. == Polypier massif ; vallées courtes et larges de 4 à 5 mill. ; 30 à 40 cloisons, minces et serrées. — *Bajocien* : Cheltenham.

21. L. BRONNI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.* — *Meandrina id.*, Klipstein, 1843. — *Onolophyllia id.*, d'Orbigny, *Prod.* == Polypier massif, séries longues, flexueuses et larges de 4 à 5 mill. ; de 16 à 20 cloisons par calice. — *Saliférien* : Saint-Cassian.

22. L. ETALLONI. — Polypier en rameaux très-épais ayant de 5 à 7 cent. de diam. et formant un buisson très-élevé ; vallées courtes, mais contournées ; calices creux et bien délimités ; on compte de 24 à 48 cloisons par calice, suivant leur développement ; les cloisons sont fines et très-serrées. Largeur des vallées et des calices, 6 à 8 mill. — *Portlandien* : Mantoche (Haute-Saône).

23. L. UNDANS. — *Microphyllia id.*, Etallon, *loc. cit.* == Vallées longues et peu sinueuses, larges de 5 mill. ; 48 cloisons fines et subégales ; on en compte 54 dans une longueur d'un centim., elles sont très-débordantes. — *Corallien* : Valfin.

24. L. CELINA, E. de Fromentel, *Descript. des Pol. foss. de l'époque Néocomien*, p. 32, 1857. == Polypier étalé, peu épais ; séries larges de 7 à 9 mill. ; de 36 à 80 cloisons serrées, flexueuses et nombreuses suivant le développement des calices. — *Néocomien* : Gy-l'Evêque (Yonne).

25. L. CIRCULARIS, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 32, pl. 4, fig. 1-2. == Polypier en cône renversé ; séries larges de 4 à 6 mill., et disposées circulairement ; 24 à 36 cloisons par calice. — *Néocomien* : Gy-l'Evêque.

26. L. LINEARIS, E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. Geol. de France*, 2^e série, t. XIII, p. 862. == Polypier subplane ; vallées longues, dirigées dans le même sens et larges de 7 mill. ; cloisons épaisses, serrées et peu nombreuses ; les collines sont arrondies au sommet. — *Portlandien* : Gray-la-ville.

27. L. CONTORTA. — *Microphyllia id.*, Etallon, *loc. cit.* == Polypier convexe, à plateau conique ; séries longues, irrégulières et larges de 5 mill. ; 30 à 36 cloisons par centre ; elles sont minces, serrées et subégales et un peu débordantes. — *Corallien* : Valfin.

28. L. VARIABILIS. — *Microphyllia id.*, Etallon, *loc. cit.* == Polypier gibbeux ; vallées courtes et presque droites ; les calices souvent sont isolés et sont larges de 4 à 7 mill. ; on compte environ 60 cloisons par calice ; elles sont fines et anastomosées. — *Corallien* : Valfin ; Oyonnax.

29. L. BONJOURI, Etallon, *loc. cit.* == Cette espèce ne paraît différer du *L. Lotharinga* que par ses séries plus larges, ses cloisons plus nom-

breuses et plus débordantes. Largeur des séries, 4 à 5 mill.; environ 50 cloisons. — *Corallien* : Valfin ; Oyonnax.

E. — *Séries larges de 3 à 4 millimètres.*

30. L. GRACILIS. = Polypier en masse subplane; vallées longues, peu contournées et larges de 3 à 4 mill.; centres calicinaux bien distincts; 24 cloisons par calice, elles sont peu inégales et fortement dentées surtout près du centre; collines montrant au sommet une ligne fine et saillante qui indique la soudure des murailles. — *Corallien* : Betailcourt (Haute-Marne); Champlitte; Charcenne (Haute-Saône).

31. L. LOTHARINGA, E. de Fromentel, *Catalogue des polyp. de l'Yonne*, 1856. — *Meandrina id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 22, fig. 2. — *Meandrophyllia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Isastræa id.*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.* = Polypier en masse dendroïde; rameaux comprimés; vallées assez longues, contournées, peu profondes et larges de 3 mill.; centres peu distincts; cloisons assez épaisses et serrées; on en compte 16 à 18 par calice. — *Corallien* : Saint-Mihiel; Rupt; Auxerre, etc.

32. L. PERRONI. = Polypier en touffe dendroïde; rameaux ronds, étroits à la base et allant en s'élargissant jusqu'au sommet où ils se divisent pour former deux rameaux; vallées courtes, peu contournées et larges de 3 à 4 mill.; cloisons épaisses et serrées; on en compte environ 24 par calice, ceux-ci sont bien distincts. — *Portlandien* : Seveux (Haute-Saône).

33. L.? KLIPSTEINI. Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, 1851, — *Meandrina labyrinthica*, Klipstein, 1843, *Oulophyllia id.*; d'Orbigny, *Prod.* = Polypier convexe; vallées longues et sinueuses, larges de 3 mill.; 12 à 24 cloisons par calice. — *Saliférien* : Saint-Cassian.

34. L. RASTELLINIFORMIS. — *Microphyllia id.*, Etallon, *loc. cit.* = Polypier pédonculé; séries peu profondes, assez contournées et larges de 4 mill.; on compte 30 à 36 cloisons par calice et 40 par centim. — *Corallien* : Valfin.

F. — *Séries larges de moins de 3 millimètres.*

35. L. FLEXUOSA; — *Microphyllia id.*, Etallon, *loc. cit.* = Polypier peu élevé, étalé, peu épais; vallées très-contournées et larges de 1 1/2 à 2 mill.; centres calicinaux éloignés dans les séries et renfermant 3 cycles. — *Corallien* : Valfin.

G. — *Species incertæ sedis.*

36. L. SEQUANA. E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. Géol. de France*, *loc. cit.*, p. 862, 1856. = Polypier élevé, à surface subplane; vallées souvent étroites, d'autres fois allant en s'élargissant et renfermant entre elles des espaces couverts de calices subpolygonaux et larges de 2 à 3 mill. — *Portlandien* : Mercey-sur-Saône.

Ce dernier fossile a toute la physionomie des *Comoseris*, mais ne paraît pas en avoir la structure interne.

MM. Edwards et Haime placent encore parmi les Latiméandres les fossiles suivants indiqués dans le Prodrôme de M. d'Orbigny, sans description suffisante :

37. *AXOPHYLLIA NANTUACENSIS*, d'Orbigny, *Prod.*, t. II, p. 39, 1850. — *Corallien* : Landeyron ; Poizat.

38. *COMOPHYLLIA MERIANI*, (*elegans*) *ibid.*, *loc. cit.*, p. 39. — *Corallien* : Poizat.

39. *OULOPHYLLIA ELEGANS*, *ibid.*, t. I, p. 293. — *Bajocien* : Bourg (Haute-Marne).

40. *OULOPHYLLIA MACROPORA*, *ibid.*, t. II, p. 39. — *Corallien* : St-Puits.

41. *OULOPHYLLIA CORALLINA*, *ibid.*, t. II, p. 39. — *Corallien* : Saint-Mihiel, etc.

41. *OULOPHYLLIA ESCAVATA*, *ibid.*, *id.* — *Corallien* : Wagnon.

42. *OULOPHYLLIA DISJUNCTA*, *id.*, *id.* — *Corallien* : Vauligny (Yonne).

43. *COMOPHYLLIA COTTALDINA*, *id.*, *id.* — *Corallien* :?

43. *OULOPHYLLIA TURBINATA*, *id.*, t. II, p. 208. — *Turonien* : Soulage.

43. *OULOPHYLLIA MARTINIANA*, *id.*, *id.* — *Turonien* : Figuières.

44. *LATIMEANDRA DUBIA*, E. de Fromentel, *Catal. des Pol. de l'Yonne*, 1856. = Le Polypier est convexe, à plateau inférieur couvert de stries fines et de sillons d'accroissement ; les calices qui sont au centre de la surface supérieure sont ronds et semblables par leurs cloisons confluentes à ceux des *Thamnastrées*, mais à 15 ou 20 mill. du bord, ils se mettent en séries rayonnantes, séparées par des collines assez saillantes ; les séries et les calices ont 4 mill. de largeur ; on compte de 12 à 18 cloisons par calice, elles sont épaisses, serrées et anastomosées. — *Corallien* : Environs d'Auxerre. — Nous ne savons au juste la place que ce fossile doit occuper, il sert de lien entre les *Syrtrastrées* et les *Polyastrées* et tient autant des *Thamnastrées* que des *Latiméandres*.

Nous avons séparé des *Latiméandres* des fossiles qui présentent bien comme celles-ci des calices réunis en séries, mais dont les séries restent libres par leur côté et ne sont même pas unies par des côtes. Nous avons réunis les quelques espèces qui présentent ce caractère sous le nom générique de *CHORISASTRÆA*.

1. *C. PPLICATA*. — *Lithodendron plicatum (pars)*, Goldfuss, 1826. — *Latimeandra plicata*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, 1849. — *Eumomia plicata* et *confluens*, d'Orbigny, *Prod.* = Polypier peu élevé, séries peu longues et bien séparées ; murailles couvertes de stries costales fines et subégales, cloisons nombreuses et fines (5 cycles). Largeur des séries, 10 mill. — *Corallien* : Natheim ; Heidenheim ; Geingen ; Wagnon ; Valfin.

2. *C. CORALLINA*. = Polypier peu élevé et étalé ; polypiérites formant des séries de 4 à 5 calices, libres par leur côté et éloignées les unes des autres de 5 à 6 mill. ; calices superficiels ; cloisons minces et serrées : on en compte de 24 à 28 par calice ; la muraille est nue et finement costulée ; le bourgeonnement a lieu presque à la base des polypiérites, ce qui fait que la colonie ne tend jamais à s'élever, mais toujours à s'étendre. Haut. des polypiérites, 30 à 35 mill. ; largeur des séries, 8 à 10. — *Corallien* : Champlitte.

3. *C. BERTRANDI*. — *Latimeandra id.*, J. Haime, *Mém. de la Soc. Géol.*, 2^e série, t. IV, p. 287, 1852. = Séries calicinales très-rapprochées, mais non soudées et larges de 20 ou 30 mill. ; cloisons très-nombreuses et inégales ; 12 seulement arrivent au centre. — *Parisien* : Castel-Combertot ; Nice.

C'est encore à ce genre qu'il faudra probablement rapporter le *Lati-*

meandra alpina, de A. d'Orbigny, *Prod.* Ce fossile voisin du *C. plicata* provient de l'étage *Parisien* de Faudon (Haute-Alpes).

XVIII^e Famille. — Symphylliens.

Lithophylliacées (pars) Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, 1856.

Syrtrastrées ayant les chambres divisées par des traverses ; multiplication par fissiparité, calices distincts ou non, cloisons bien dentées.

GENRE LXXVII. — STIBASTRÆA.

Stibastræa, Etallon, *Etudes Pal. sur le Haut-Jura*, 1858.

Polypier étalé ; calices disposés en séries plus ou moins longues et régulières ; les séries sont assez écartées les unes des autres et réunies par des côtes fines, subégales et granuleuses ; cloisons épaisses et munies de dents, surtout près du centre ; columelle papilleuse bien développée ; épithèque forte et plissée ; centres bien distincts.

S. EDWARDSI, Etallon, *loc. cit.* == Polypier étalé ; centre simple et isolé au centre ; séries se dirigeant vers les bords ; elles sont irrégulières, larges de 5 à 12 mill. et séparées par des ambulacres finement costulés et larges de 2 mill. ; 4 à 5 cycles suivant le développement des calices. — *Corallien* : Valfin.

S'il était certain que la multiplication se fit ici par gemmiparité comme le pense M. Etallon, ce genre devrait rentrer dans la famille des *Lati-meandriens*.

Nous possédons un fossile qui nous a été communiqué par M. Etallon et qui a quelques liens de parenté avec le genre précédent, c'est un polypier pédonculé, qui se multiplie par fissiparité ; les calices se mettent en séries, en s'écartant du centre ; chaque série est libre depuis le calice central et couverte d'une forte épithèque ; les cloisons sont larges et espacées ; on en compte environ 60 par calice ; les séries du fossile que nous décrivons ne sont composées que du calice central et d'un calice voisin ; le calice central a 30 mill. de large et les séries ont à peu près la même largeur. La hauteur totale du polypier est de 75 mill., les traverses sont très-abondantes et les côtes peu inégales et granulées. Nous avons donné à ce fossile le nom de *LATIPHYLLIA INSIGNIS* ; c'est encore près de ce fossile qu'il faut placer le *Euphyllia sinuosa* de M. Reuss, dont MM. Edwards et Haime ont fait une *Thecosmilia*, le *Thecosmilia defirmis*, Reuss, pl. 5, fig. 10-12, 1854. — *T. Requieni*, Edwards et Haime, *Ann.* 1849, et le *Lasmomilia mwandra*, d'Orbigny. Ces trois fossiles sont de l'étage *Turonien* de Gosau et de l'île d'Aix.

GENRE LXXVIII. — MÆANDRASTRÆA.

Mæandrastræa, d'Orbigny, *Not. sur les Pol. foss.*, p. 10, 1849, et *Heterophyllia id.* — *Mæandrastræa*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, 1856.

Polypier formé de polypierites réunis en séries assez courtes :

murailles cachées par des rayons septo-costaux; centres bien distincts, occupés par une columelle lamellaire.

1. *M. ARAUSIACA*, d'Orbigny, *Prod.* — *Meandrina id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 6, fig. 8. = Environ 30 cloisons inégales et minces, largeur des calices, 6 à 8 mill. — *Turonien* : Uchaux.

2. *M. PSEUDOMEANDRINA*, d'Orbigny, *Prod.* — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 4, fig. 7. = Environ 38 cloisons subégales. Largeur des calices, 12 à 15 mill. — *Turonien* : Uchaux.

3. *M. MACROREINA*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Meandrina id.*, Michelin, pl. 64, fig. 4. = 12 cloisons larges et épaisses. Largeur des séries, 20 mill.; profondeur, 10. — *Turonien* : Corbières.

4. *M. ? CIRCULARIS*, d'Orbigny, *Prod.* — *Agaricia id.*, Michelin, pl. 68, fig. 3. = Vallées concentriques et larges de 10 mill.; cloisons nombreuses et très-minces. — *Turonien* : Corbières.

Espèces non décrites.

5. *M. CRASSI-SEPTA*, d'Orbigny, *Prod.*, t. II, p. 208. *Turonien* : Soulage; Figuières.

6. *M. RETICULATA*, *id.*, *id.* — *Turonien* : Uchaux.

GENRE LXXIX. — SYMPHYLLIA.

Symphyllia, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, *loc. cit.*, p. 491. 1848.

Gyrophyllia, d'Orbigny, *Not. sur les Pol. foss.*, p. 8, 1849.

Polypier massif, peu élevé; polypiérites formant des séries soudées par leurs côtes; calices toujours distincts; columelle spongieuse; cloisons épineuses, les dents les plus fortes sont les plus externes; endothèque bien développée.

1. *S. ? BISINUOSA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, t. XI, p. 257, 1849. — *Meandrina id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 11, fig. 8. — *Gyrophyllia cerebriformis*, d'Orbigny, *Prod.* = Vallées étranglées de distance en distance; 3 cycles et des cloisons d'un 4^e; cloisons serrées et débordantes, on en compte 16 dans l'espace d'un centim. Largeur des vallées, 6 à 7 mill., profondeur, 2. — *Falunien* : Turin; Vérone; Dego.

2. *S. ? TIEDEMANI*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, 1856. = Vallées profondes et bistellées; columelle rudimentaire; trois cycles. Largeur des séries, 3 centim.; profondeur, 1. — *Parisien* : Castel-Comberto.

Ces deux espèces sont encore douteuses; les espèces types de ce genre habitent les mers actuelles.

GENRE LXXX. — ULOPHYLLIA.

Ulophyllia, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, 1856. — *Oulophyllia id.*, *id.*, *Compt. rend.*, *loc. cit.*, p. 492.

Polypier massif; séries complètement soudées par les murailles; collines simples et en arêtes vives; plateau commun garni d'une épithèque; columelle spongieuse peu développée; cloisons minces,

serrées, garnies de dents surtout vers le centre des calices qui sont généralement bien distincts; endothèque bien développée.

Ce genre a été créé pour deux espèces vivantes, auxquelles on ajoute avec doute les fossiles suivants :

1. U.? PROFUNDA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, 1849. — *Meandrina id.*, Michelin, pl. 11, fig. 3. == Centres calicinaux peu distincts; largeur de vallées, 16 mill.; profondeur, 10; de 18 à 20 cloisons par calice. — *Falunien* : Turin; Dego.

2. U.? MONTANA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Meandrina id.*, Michelin, pl. 22, fig. 2. == Cloisons minces et inégales; on en compte 15 dans l'étendue d'un centim. Largeur des vallées, 10 à 15 mill.; profondeur, 6 à 7. — *Corallien* : Saint-Mihiel.

3. U.? MÆANDRINOIDES, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — U. *Michelini*, d'Orbigny, *Prod.* — *Lobophyllia mæandrinoides*, Michelin, *Icon.*, pl. 19, fig. 3. == Polyp. un peu élevé; séries libres à leur sommet, peu profondes et larges de 20 à 30 mill.; 24 cloisons assez fortes et inégales; centres assez rapprochés. — *Corallien* : Dun (Meuse).

Ce dernier fossile doit probablement rentrer dans notre genre nouveau *Latiphyllia*, car il paraît en présenter tous les caractères.

GENRE LXXXI. — ASPIDISCUS.

Aspidiscus, Koenig, *Icon. foss. sect.*, p. 1, 1825.

Cyclophyllia, Edwards et Haime, *Compt. rend., loc. cit.*, 1848.

Polypier massif et libre; plateau recouvert d'une forte épithèque plissée; séries complètement soudées par les murailles et rayonnant du centre à la circonférence; les calices qui terminent les séries sont placés sur une ligne circulaire, et ont les cloisons marginales beaucoup plus développées que les autres; columelle nulle; centres calicinaux bien distincts.

A. CRISTATUS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, 1849. — *Aspidiscus* Shawis, Koenig, *loc. cit.* — *Cyclolites cristata*, Blainville, 1830. — Lamarck, 1816. — Lamouroux, 1824. — DeFrance, 1818. == Polypier discoïde; collines paraissant se multiplier à l'instar des cloisons; vallées peu profondes, larges de 4 mill.; 2 cycles de cloisons, fines, serrées, subégales. — *Turonien* : Chettabah.

GENRE LXXXII. — MYCETOPHYLLIA.

Mycetophyllia, Edwards et Haime. *Compt. rend.*, t. XXVII, p. 491, 1848.

Polypier massif et fixé; séries intimement soudées par les murailles; vallées peu profondes; columelle nulle; centres calicinaux indiqués seulement par la convergence des cloisons qui sont nombreuses, écartées et fortement dentées; plateau lobé, épineux et nu; traverses vésiculeuses et abondantes.

1. M. ANTIQUA, Reuss, *Dencks. der Wien. acad.*, etc., pl. 23, fig. 9, 1854. == 12 rayons septo-costaux par polypière; calices larges de 20 mill. — *Turonien* : Saint-Wolfgang.

2. M. STELLIFERA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1849. — *Mean-*

drina id., Michelin, *Icon.*, pl. 11, fig. 4. = 24 cloisons par calice. Ceux-ci ont 20 mill. de largeur. — *Falunien* : Rivalba, près de Turin.

GENRE LXXXIII. — LEPTORIA.

Leptoria, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, *loc. cit.*, 1848.

Platygyra (pars), Ehrenberg, *Corall. des Roth. Meer.*, 1834.

Polypier massif et largement fixé; séries calicinales soudées par les murailles; centres calicinaux indistincts; vallées longues; columelle lamellaire, saillante et lobée; cloisons un peu débordantes et souvent unies à la columelle au moyen de trabicules; elles sont garnies de dents, dont les plus fortes sont près de la columelle; plateau commun recouvert par une épithèque mince, mais complète.

a. *Séries irrégulières.*

1. L. DELICATULA, Reuss, *Denks. der Wien. acad.*, pl. 15, fig. 5-7, 1854. = Vallées droites, larges de 3 mill., collines peu élevées et minces; cloisons inégales et droites; on en compte 32 par cent. — *Turonien* : Gosau.

2. L. KONINCKI, Reuss, *loc. cit.*, pl. 15, fig. 1-4. — *Meandrina id.*, Edwards et Haime, 1849. = Collines épaisses; vallées flexueuses, larges de 2 mill.; cloisons inégales en épaisseur; on en compte 36 par centim. — *Turonien* : Gosau; Piesting.

3. L. ANTIQUA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, 1849. — *Meandrina id.*, DeFrance, 1823. = Vallées sinueuses, larges de 5 mill.; cloisons inégales; on en compte 24 par centim. — Fossile de.....?

4. L. TENELLA. — *Meandrina id.*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 21, fig. 4. = Vallées droites ou sinueuses et larges de 3 mill.; collines assez étroites; cloisons minces, écartées, subégales; on en compte 12 à 13 par centim. — *Corallien* : Geingen.

aa. *Séries disposées radiairement.*

5. L. PATELLARIS, Reuss, *loc. cit.*, pl. 14, fig. 9-12. = Vallées rayonnantes depuis le centre, se bifurquant et larges de 2 mill.; cloisons confluentes d'une vallée à l'autre et inégales en épaisseur alternativement. — *Turonien* : Gosau.

6. L. RADIATA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.* p. 409, t. II, 1856. — *Meandrina id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 68, fig. 3. = Vallées parallèles et rayonnantes, larges de 3 à 4 mill.; collines peu élevées; cloisons inégales; on en compte environ 40 par centim.; columelle très-lobée. — *Turonien* : Bains de Rennes.

GENRE LXXXIV. — MCEANDRINA.

Meandrina (pars), Lamarck, *Syst. des anim. sans vert.*, 1801-1816. — Edwards et Haime, *Compt. rend.*, *loc. cit.*, 1848.

Polypier massif et largement fixé; séries se soudant directement entre elles par les murailles; centres calicinaux à peu près indistincts; columelle spongieuse très-développée; cloisons serrées, parallèles, dentées près de la columelle; le bord interne des grandes

cloisons est souvent épaissi et élargi; plateau commun couvert d'une épithèque mince, mais complète.

A. — *Polypier gibbeux.*

1. M. BELLARDII, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., 1849. — *M. venusta* et *Phrygia*, Michelin, pl. 11, fig. 8 et 5. = Vallées sinueuses, larges de 6 mill., profondes de 3; cloisons assez épaisses (17 par centim.). — *Fatunien* : Rivalba, près de Turin.

2. M. PYRENAICA, Michelin, pl. 69, fig. 2. = Vallées assez droites et larges de 5 mill., columelle peu développée; cloisons serrées, inégales (20 par centim.). — *Turonien* : Corbières.

AA. — *Polypier simplement convexe.*

3. M. MICHELINI, Reuss, *Denks. der Wien. acad.*, pl. 15, fig. 8-9. = Vallées courtes ou longues, droites ou flexueuses, larges de 6 à 7 mill.; cloisons serrées, inégales en épaisseur (15 à 16 par mill.) — *Turonien* : Gosau.

4. M. SALISBURGENSIS. Reuss, loc. cit., pl. 15, fig. 12-13, 1854. — *M. Salisburgiana*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1849. — *M. tenella*, Michelin, pl. 66, fig. 5 (non Goldfuss : c'est une Leptorie). = Vallées courtes et sinueuses, larges de 2 à 3 mill.; cloisons serrées et inégales; elles semblent appartenir à 3 ordres; on en compte environ 20 par centim. — *Turonien* : Gosau; Piesting, etc.

Espèces douteuses ou non décrites.

5. M. VENUSTULA, Michelin, *Icon.*, pl. 54, fig. 7. — *Bajocien* : Langrune.

6. M. BERNARDANA, d'Orbigny, *Prod.* — *Corallien* : Poisat; Landeyron, etc.

7. M. RENAUXANA, id., id. — *Turonien* : Uchaux.

8. M. OCEANI, id., id. — *Turonien* : Soulage.

Les deux espèces de l'étage Néocomien que A. d'Orbigny cite sous les noms de *M. Neocomiensis* et *Colteauana*, sont devenus les types de notre genre *Eugyra* (page 154).

GENRE LXXXV. — DIPLORIA.

Diploria, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, t. XXVII, p. 493, 1848.

Platygyra (pars). Ehrenberg, 1834.

Polypier massif et largement fixé; séries de polypières unies par les côtes qui forment des ambulacres costulés entre les vallées; les murailles sont épaisses et toujours écartées; les centres calicinaux sont tout à fait indistincts et les vallées profondes et sinueuses; la columelle est spongieuse et bien développée; les cloisons sont fortes, débordantes et bien dentelées près de la muraille.

1. D. CRASSI-LAMELLOSA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., p. 291, = Vallées sinueuses et larges de 3 mill.; ambulacres d'une largeur double; cloisons alternativement inégales (18 par centim.). — *Turonien* : Gosau.

2. D.? NEPTUNI, d'Orbigny, *Prod.* == Espèce non décrite. — Turonien : Soulage.

GENRE LXXXVI. — STELLORIA.

Stelloria, d'Orbigny, *Not. sur les Pol. foss.*, 1849.

Polypier massif ; séries directement soudées par les murailles ; collines simples, commençant et se terminant en certains points étoilés de la surface, dont elles forment les rayons ; centres calicinaux indistincts ; columelle nulle.

1. S. SULCATA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 410, t. II, 1856. — *Anthophyllum sulcatum*, Michelin, *Icon.*, pl. 50, fig. 5. — *Cælosmilia sulcata*, d'Orbigny, *Prod.* (jeune exemplaire). — *Stelloria elegans*, d'Orbigny, *Prod.* (exemplaire bien développé). == Vallées larges de 1 1/2 mill.; collines minces et peu inégales. — Turonien : Le Mans ; île d'Aix.

2. S.? RUSTICA, d'Orbigny, *Prod.* == « Espèce à profondes cellules garnies de très-grosses cloisons irrégulières. » — Turonien : île d'Aix.

3. S.? AGARICITES, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, p. 411, 1856. — *Meandrina id.*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 38, fig. 2.

Vallées courtes et larges de 2 ou 3 mill.; cloisons minces, serrées ; centres calinaux subdistincts. — Turonien : Gosau ; Piesting.

Ce dernier fossile est peut-être une Latiméandre.

GENRE LXXXVII. — HYDNOPHORA.

Hydnophora, Fischer de Waldheim, *Desc. du Mus. Demidoff*, 1810.

Monticularia, Lamarck, *Hist. des anim. sans vert.*, 1816.

Polypier généralement massif et largement fixé ; séries de polyptérites intimement unies par les murailles ; collines simples, compactes, souvent interrompues d'une manière régulière et présentant des monticules isolés ; centres calicinaux indistincts ; columelle nulle ; cloisons minces, serrées, dentées, surtout près du centre ; traverses droites et assez abondantes.

1. H. MEANDRINOIDES, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1849. — *Monticularia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 11, fig. 9. == Monticules irréguliers et un peu allongés, vallées larges de 10 à 15 mill., profondes de 4 à 5 ; cloisons minces et serrées (16 par centim.). — Falunien : Turin.

2. H. BRONNI, J. Haime in d'Archiac, *Hist. des Prog. de la Géol.*, 1850. — *Mém. de la Soc. Géol.*, 2^e série, t. IV, p. 287, 1852. == Vallées sinueuses et larges de 6 à 10 mill.; collines peu élevées et un peu allongées ; cloisons épaisses et inégales de 2 en 2, ou de 4 en 4 (12 par centim.). — Parisien : Castel-Combert, etc.

3. H. STYRIACA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, loc. cit., 1849. — *Monticularia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 68, fig. 2. == Polypier pédonculé à surface convexe ; collines coniques, petites, serrées, peu inégales et hautes de 1 1/2 mill.; vallées larges de 2 à 3 mill.; cloisons peu serrées et assez épaisses. — Turonien : Gosau ; Piesting (Alpes orientales).

4. H. MULTILAMELLOSA, Reuss, *Denks. der Wien. acad.*, pl. 14, fig. 5-6, 1854. == Polyp. subhémisphérique, monticules coniques, couverts

de 15 à 16 cloisons dentées, subégales et plus minces que dans l'espèce précédente; vallées larges de 5 mill. — *Turonien* : Gosau.

5. H. ATACIANA, d'Orbigny, *Prod.* = « Espèce dont les cellules sont la moitié moindres que celles de l'H. *Styriaca*. » — *Turonien* : Soulage.

XIX^e Famille. — Comoseriniens.

Lophoserinae (pars), Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, p. 125, 1851.

Chambres viscérales divisées par des synapticules; ni traverses, ni planchers; cloisons bien dentées et confluentes; multiplication par bourgeonnement.

GENRE LXXXVIII. — COMOSERIS.

Comoseris, d'Orbigny, *Not. sur les Pol. foss.*, p. 12, 1849.

Polypier massif, épais; calices à cloisons confluentes et séparées çà et là par des collines irrégulières et longues, qui ne limitent par des séries simples; cloisons assez épaisses; columelle rudimentaire; plateau commun recouvert d'une forte épithèque.

1. C. MÆANDRINOÏDES, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — Edwards et Haime, 1851. — *Pavonia* id., Michelin, *Icon.*, pl. 22, fig. 3 et *Meandrina Edwardsis*, pl. 18, fig. 6. = Collines très contournées, peu saillantes; calices superficiels; 12 cloisons épaisses, flexueuses et subégales. Diam. des calices, de 2 à 2 1/2 mill. — *Corallien* : Saint-Mihiel; La Rochelle; Tonnerre; Chatel-Censoir; Theuley (Haute-Saône); Saint-Puits; Valfin, etc.

2. C. IRRADIANS, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 19, fig. 1, = Polypier convexe; vallées allant en rayonnant du centre à la circonférence d'une manière peu régulière; elles sont assez droites et larges; calices superficiels, larges de 2 1/2 mill.; 3 ou 3 cycles 1/2 de cloisons, assez épaisses et flexueuses. — *Corallien*. Steeple-Ashton; Valfin.

3. C. BAJOCIENSIS. = Polypier hémisphérique; collines très-écartés et sineuses; calices larges de 4 mill. et renfermant 24 cloisons alternativement grandes et petites. — *Bajocien* : Musée de Besançon.

GENRE LXXXIX. — OROSERIS.

Oroseris, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*; p. 130, 1851.

Polypier en lames peu épaisses; calices superficiels à cloisons confluentes, et séparés çà et là par des collines cristiformes peu longues, droites et ne formant pas de vallées profondes; columelle rudimentaire; plateau commun nu, ou couvert d'une épithèque.

1. O. SPÆLEA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.* — *Monog. des Fungides*. — *Agaricia* id., Valenciennes, *Cat. du Mus. de Paris*. = Collines concentriques, renfermant plusieurs séries de calices; ceux-ci sont écartés et larges de 4 à 5 mill.; 24 ou 26 rayons septo-costaux, alternativement inégaux. — *Corallien* : Saint-Mihiel.

2. O. APENNINA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Agaricia* id., Michelin,

pl. 12, fig. 1. == Collines courtes et épaisses ; calices superficiels, renfermant environ 20 cloisons inégales et larges de 10 à 12 mill. — *Fa-lunien* : Turin.

3. O. EXPLANATA, E. de Fromentel, *Pol. de l'étage Néocom.*, pl. 4, fig. 5-6. == Collines peu développées ; vallées courtes, renfermant jusqu'à 10 calices ; ceux-ci sont larges de 4 à 5 mill. et contiennent 32 cloisons fines et anastomosées ; plateau finement radié. — *Néocomien* : Gy-l'Evêque.

4. O. REGULARIS, E. de Fromentel, *loc. cit.* p., 34. == Collines peu développées et concentriques ; 50 cloisons fines et anastomosées ; rayons septo-cotaux dirigés du centre à la circonférence. — *Néocomien* : Gy-l'Evêque (Yonne).

Espèces douteuses.

5. O.? PLANA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, p. 131, 1851. — *Agaricia Semmerringii*, Michelin, pl. 23, fig. 2. — *Agaricia plana*, d'Orbigny, *Prod.* — *Corallien* : Mecriu ; Hannonville.

6. O.? GRACIOSA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Agaricia id.*, Michelin, pl. 23, fig. 3. — *Corallien* : Sampigny.

7. O.? SANCTI-MIHIELI, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Agaricia granulata*, Michelin, pl. 23, fig. 1. — *Corallien* : Saint-Mihiel ; Verdun.

8. O.? NEOCOMIENSIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Agaricia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Néocomien* : Fontenoy ; Saint-Sauveur ; Leugny.

9. O.? SULCATA, Edwards et Haime, *loc. cit.* *Agaricia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Bathonien* : Ranville.

10. O.? CONVEXA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Agaricia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Bathonien* : Luc.

11. O.? IRREGULARIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Agaricia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Corallien* : Chatel-Censoir.

12. O.? ELEGANTULA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Agaricia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Bajocien* : Langres.

Polyastrées Apores.

XX^e Famille — Faviens.

FAVIACÉES (*pars*), Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, 1856.

Chambres viscérales divisées par des traverses lamelleuses ; multiplication par fissiparité ; cloisons dentées ; polypières unis par les côtes ou les murailles.

GENRE XC. — FAVIA.

Favia (pars), Oken, *Lehrb. der Naturg.*, 1815.

— Ehrenberg, *Coral. des roth. Meer.*, 1834.

Parastrea, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, 1848.

Ovalastrea. *Ellipsocœnia*, *Thalamocœnia*, d'Orbigny, 1849 et 1850.

Polypier convexe et submassif ; calices ronds, ovales ou déformés et réunis par le grand développement des côtes ; columelle spon-

gieuse, plus ou moins développée; cloisons assez débordantes et dentées surtout près de la columelle; traverses fortes et nombreuses.

a. De 90 à 100 cloisons.

1. F. PLANA, E. de Fromentel, *Descript. des Pol. foss. de l'étage Néoc.*, p. 35, pl. 4, fig. 3-4, 1857. == Polypier turbiné; calices assez serrés et larges de 9 à 10 mill.; 96 cloisons dans les grands calices; elles sont minces et anastomosées. — Néocomien : Gy-l'Evêque.

2. F. KIMMERIDGIENSIS. == Polypier en lames étendues et peu épaisses; calices assez régulièrement ovales et serrés; côtes fines et très-égales; 96 cloisons inégales en largeur et en épaisseur; celles des 2 ou 3 premiers cycles sont plus épaisses que les autres; columelle assez bien développée. Diam. des calices, 10 à 12 mill.; des espaces costaux, 2 à 3 mill. — Kimmérigien : Arc-les-Gray.

3. F.? ABBREVIATA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 440, t. II, 1856. — *Mussa id.*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 4, fig. 4-6. == Polypier peu élevé et largement fixé; calices irréguliers et larges de 10 à 20 mill.; columelle bien développée, environ 100 cloisons dans les grands calices. — Turonien : Gosau.

aa. De 60 à 72 cloisons.

4. F. HEMISPHERICA, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 35, pl. 4, fig. 7, 1857. == Calices peu serrés, irréguliers, superficiels et larges de 7 à 8 mill.; 64 cloisons dans les grands calices; elles sont fines et anastomosées; columelle papilleuse simulant des palis; espaces costaux larges de 2 mill. — Néocomien : Gy-l'Evêque.

5. F. CORALLINA. == Polypier en masse hémisphérique; calices très-écartés et très-irréguliers; il est rare d'en apercevoir un rond; cloisons nombreuses et serrées, on en compte environ 60 dans les grands calices, qui n'ont encore qu'un seul centre. Diam. des calices ronds, 6 mill.; des calices déformés, de 9 à 11 mill.; largeur des espaces costaux, 4 à 5 mill. — Corallien : Environs d'Auxerre (Yonne).

6. F. COTTEAUL. == Polypier hémisphérique et pédiculé; calices plus rapprochés et plus larges que dans l'espèce précédente; ils sont aussi moins déformés; columelle spongieuse bien développée; cloisons un peu épaisses et un peu contournées; on en compte de 48 à 60 par calice; les espaces intercalicinaux sont moins larges et moins superficiels que dans l'espèce précédente. Diam. des calices, 12 à 15 mill. — Corallien : Environs d'Auxerre.

7. F. HAIMEI. == Polypier en masse convexe et mamelonnée, calices peu déformés et saillants, séparés par des intervalles plus ou moins larges et profonds; côtes fines, serrées et subégales; cloisons très-minces et assez serrées; on en compte 66 à 72 par calice; columelle bien développée et comme papilleuse. Diam. des calices, 8 à 9 mill.; largeur des espaces calicinaux, 5 à 7 mill. — Corallien : Betaincourt (Hte-Marne).

aaa. De 40 à 54 cloisons.

8. F. TURBINATA, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 56, pl. 5, fig. 1-2. == Calices peu profonds, espacés, très-irréguliers, larges de 4 mill. sur 8 ou 9; on compte dans les grands calices 50 à 54 cloisons fines et anastomosées; columelle rudimentaire; espaces costaux larges de 3 à 7 mill. — Néocomien : Gy-l'Evêque.

9. F. CONFERTA, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 36, pl. 3, fig. 10-11, 1857. — Polypier turbiné; calices subcirculaires ou subpolygonaux, serrés et larges de 5 mill.: 42 à 48 cloisons minces et anastomosées; plateau couvert de stries fines. — *Néocomien* : Gy-l'Évêque.

10. F. VALFINENSIS, Etallon, *loc. cit.* == Calices assez égaux, ovales, écartés et larges de 10 à 11 mill. sur 8 ou 9; 4 cycles complets; côtes plus épaisses que les cloisons; columelle très-développée. Largeur des espaces costaux, 10 à 11 mill. — *Corallien* : Valfin.

11. F. CARYOPHYLLOIDES, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 440, t. II. — *Astrea id.*, Goldf., pl. 22, fig. 7. == Polypier arrondi; calices rapprochés, à bords minces et larges de 6 à 8 mill.; columelle bien développée; 4 cycles complets; côtes minces et peu inégales. Largeur des espaces costaux, 2 à 3 mill. — *Corallien* : Geingen.

12. F. GERVILLEI, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, 1849. == Calices assez serrés; côtes inégales; columelle peu développée; 4 cycles de cloisons minces et serrées. Largeur des calices, 7 à 10 mill. — Fossile de Golleville (Manche).

aaaa. De 30 à 40 cloisons.

13 F. STRICTA, Edwards et Haime, *Brit. foss. coral.*, pl. 10, fig. 3. == Calices subpolygonaux, oblongs, larges de 4 à 7 mill; côtes fines, serrées, égales; 40 cloisons minces, serrées et inégales; columelle peu développée. Largeur des espaces costaux, 1 à 2 mill. — *Turonien* : Black-down.

14. F. CLAUDIENSIS, Etallon, *loc. cit.* == Calices petits, serrés; 30 à 40 cloisons très-minces. Diam. des calices, 4 à 5 millim. — *Corallien* : Valfin.

Cette espèce diffère de la suivante par ses calices plus petits et n'en est peut-être qu'une variété.

15. F. MICHELINI, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 438. — *Astrea Meandrites*, Michelin, *Icon.*, pl. 24, fig. 2. == Polypier subplane ou gibbeux; calices irréguliers, larges de 10 mill., à bords élevés et écartés. De 30 à 40 cloisons droites et un peu fortes. — *Corallien* : Oyonnax; Landeyron; Valfin : Saint-Mihiel; Dun; Sampigny.

aaaaa. De 24 à 30 cloisons.

16. F. NANTUACENSIS, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 438. == Polyp. convexe; calices très-serrés, elliptiques, saillants et larges de 6 à 8 mill.; environ 30 cloisons minces et très-serrées. — *Corallien* : Nantua.

M. Etallon indique pour cette espèce 4 cycles et des cloisons d'un 5^e; peut-être l'espèce qu'il a étudiée n'est-elle pas identique à celle-ci.

17. F.? IRREGULARIS, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 437. — *Placocœnia id.*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 9, fig. 9. == Calices très-serrés, mais non soudés; 24 cloisons alternativement inégales; la columelle paraît lamellaire. Grand axe des calices, 15 mill. — *Turonien* : Gosau.

Espèces douteuses ou non décrites.

18. F.? GRATISSIMA, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 441. — *Sarcinula id.*, Michelin, pl. 15, fig. 7. — *Falunien* : La Superga.

19. F.? GYROSA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 23, fig. 5. — *Sénonien* : Maestricht.

MM. Edwards et Haime rapportent encore au genre *Favia* les fossiles suivants indiqués par A. d'Orbigny dans son *Prodrome* :

20. *ELLIPSOSMILIA REGULARIS*. — *Néocomien* : Fontenoy.

21. *ELLIPSOSMILIA INÆQUALIS*. — *Néocomien* : Fontenoy.

22. *ELLIPSOSMILIA ORNATA*. — *Néocomien* : Fontenoy.

M. Etallon a créé pour 2 fossiles du Corallien du Haut-Jura, le genre *RHABDASTREA* qui présente tous les caractères des *Favies*, si ce n'est que les murailles sont rarement unies par des côtes et très-rapprochées, sans jamais se souder entre elles. Nous croyons que le rapprochement des polypières n'est ici que le résultat d'une fissiparité très-abondante, et n'est pas assez important pour servir de caractère générique.

23. *F. JURENSIS*. — *Rhabdastrea id.*, Etallon, *loc. cit.* == Calices irréguliers, serrés; murailles rapprochées et unies par des côtes granuleuses; 60 cloisons inégales. Diam. des calices, 6 à 7 mill. sur 4. — *Corallien* : Valfin.

24. *F. FLEXUOSA*. — *Rhabdastrea id.*, Etallon, *loc. cit.* == Calices ovulaires; murailles épaisses, saillantes et unies par des côtes assez bien développées; 48 cloisons épaisses, inégales selon les ordres. Diam. des calices, 9 mill. sur 4. — *Corallien* : Valfin.

GENRE XCI. — GONIASTRÆA.

Goniastrea, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, *loc. cit.*, p. 495, 1848.

Polypier en masse convexe et lobée; polypières intimement unis par leurs murailles qui sont prismatiques; calices polygonaux, assez profonds; cloisons débordantes et régulièrement dentées; palis bien marqués et denticulés; columelle spongieuse, traverses abondantes; plateau couvert d'une épithèque mince et complète.

Ce genre a pour types des espèces vivantes, MM. Edwards et Haime y font rentrer avec doute le fossile suivant :

G. ? SEDGWICKIANA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. *Astrea formosissima*, Michelin, pl. 6, fig. 4. — *Goniastrea id.*, d'Orbigny. (Le nom spécifique de *G. formosissima* étant le plus ancien, doit être conservé). == Calices peu inégaux, larges de 4 à 5 mill.; columelle petite; 3 cycles de cloisons minces et peu inégales. — *Thuronien* : Uchaux.

GENRE XCII. — SEPTASTRÆA.

Septastrea, d'Orbigny, *Not. sur les Pol. foss.*, p. 9, 1849.

Polypier massif, convexe ou subdendroïde; calices polygonaux et soudés directement par les murailles. Il existe souvent une ligne fine qui indique le point de réunion des murailles; cloisons bien développées; point de palis; columelle nulle; traverses abondantes.

a. *Polypier subdendroïde.*

1. *S. RAMOSA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, 1849. == Branches dichotomes; murailles accolées mais distinctes; 3 cycles; les

2 premiers égaux. Grande diagonale des calices, 5 mill. — *Falunien* : Dax.

2. S. FORBESI, Edwards et Haime, *loc. cit.* == Rameaux dichotomes; calices assez réguliers, larges de 4 à 5 mill.; 3 cycles; cloisons inégales; traverses plus espacées que dans l'espèce précédente et distantes de 2 1/2 mill. — *Falunien* : Maryland.

aa. *Polypier massif.*

3. S. EXCAVATA. == Polypier en masse arrondie et assez élevée; polypières intimement soudés par les murailles qui montrent dans une section horizontale une légère ligne qui les sépare; cloisons minces assez écartées et munies de fortes dents, surtout vers le centre; la fissiparité s'opère au moyen de 2 grandes cloisons qui se soudent par leur bord interne et forment dans une partie du calice une loge au fond de laquelle se montre un nouveau centre; on compte dans les calices à centre unique, de 36 à 42 cloisons inégales selon les ordres; type hexaméral bien distinct. Diam. des calices à centre unique, 4 à 6 mill. — *Sinemurien* : Pont-d'Aisy (Côte-d'Or).

4. S. DISPAR. — *Isastrea dispar*, E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. Géol. de France*, 2^e série, t. XIII, p. 801, 1856. == Polyp. en masse étendue et élevée; calices très-irréguliers et larges de 4 à 10 mill., lorsqu'il n'y a qu'un seul centre. De 24 à 48 cloisons dans les calices à centre unique; elles sont très-inégales et souvent courbées. — *Portlandien* : Mercey-sur-Saône.

5. S. EXPLANATA. == Polypier en lames peu épaisses, à surface plane et quelquefois gibbeuse; plateau inférieur couvert de côtes fines et fasciculées; calices peu irréguliers, peu profonds et larges de 7 à 12 mill. suivant leur développement; on compte 24 cloisons dans les plus jeunes calices et 58 dans les plus grands à centre unique; les cloisons sont minces, peu serrées, peu débordantes; les traverses sont nombreuses et bien développées. — *Bajocien* : Matz; Vaucourt (Haute-Marne).

6. S.? MULTILATERALIS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.* — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 12, fig. 2 (nommée par erreur *Polygonalis*). == Calices polygonaux et larges de 8 mill.; 3 cycles; columelle rudimentaire. — *Falunien* : Dax; Turin.

7. S.? HIRTOLAMELLATA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 44, fig. 5. == Calices assez profonds et larges de 7 à 8 mill.; 3 cycles; les 2 premiers subégaux; cloisons minces, peu serrées et légèrement flexueuses. — *Parisien* : Parmes; Grignon.

XXI^e Famille. — Oculiniens.

OCULINIDES (*pars*), Edwards et Haime, *Hist. nat. des corail.*, p. 102, t. II, 1856.

Chambres divisées par des traverses rares, mais bien développées et qui simulent des planchers; loge ayant de la tendance à se remplir et à se retrécir inférieurement; polypières réunis par un cœnenchyme abondant, compacte et généralement granulé; multiplication par bourgeonnement et accidentellement par fissiparité.

GENRE XCIII. — OCULINA.

Oculina (pars), Lamarck, *Hist. des an. s. vert.*, t. II, p. 283, 1816.

Oculina, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, t. XXIX, p. 68, 1849.

Polypier arborescent; calices disposés sur des lignes spirales ascendantes plus ou moins régulières; cœnenchyme lisse entre les calices; columelle bien développée et papilleuse au sommet; palis larges et situés devant toutes les cloisons qui précèdent les dernières; cloisons entières et légèrement débordantes.

Les espèces types habitent les mers actuelles.

1. *O. AMERICANA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, t. XIII, p. 70, 1850. = Calices assez serrés sur des lignes spirales régulières; calices terminaux plus grands que les autres; columelle et palis peu développés; 4 cycles incomplets. Largeur des calices, 3 mill.; les murailles près du bord des calices sont couvertes de stries costales. — *Falunien*: Walnut-Hills; Mississipi.

2. *O. CONFERTA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier encroûtant; calices quelquefois fissipares, assez élevés et larges de 2 mill.; 3 cycles et des rudiments d'un 4^e; cœnenchyme très-granulé; point de stries costales. — *Parisien*: Bracklesham-Bay.

GENRE XCIV. — SYNHELIA.

Synhelia, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, *loc. cit.*, 1849.

Polypier arborescent; calices disposés en spirales sur les rameaux et entourés de rayons septo-costaux confluent; columelle tuberculeuse et styloforme; cloisons fortes, bien développées et présentant au centre un lobe paliforme.

1. *S. GIBBOSA*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, 1850. — *Lithodendron gibbosum*, Goldfuss, pl. 37, fig. 9. = Rameaux épais et gibbeux; calices larges de 5 mill.; 24 cloisons inégales alternativement. — *Turonien*: Bochum; Blaton.

2. *S. SHARPEANA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Rameaux cylindriques; calices peu profonds, larges de 5 mill.; 3 cycles et quelques cloisons d'un 4^e; rayons septo-costaux peu développés. — *Sénonien*: Douvres.

3. *S. MEYERI*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Lithodendron id.*, Roemer, 1840. — *Oculina id.*, Geinitz, 1846. — *Stephanocora id.*, Bronn., 1849. = Diffère des précédentes espèces par des calices plus petits, plus profonds et 16 cloisons seulement. — *Néocomien*: Elliger Brincke.

4. *S. ? GREVENSIS*. — *Diblastus grevensis*, Lonsdale in Dixon, *Geol. and foss. of the ter. ant. cret. format. of Sussex*, p. 253, 1850. — *Sénonien*: Sussex.

GENRE XCV. — PSAMMOHELIA.

Polypier en masse mamelonnée ou arborescente; calices ronds peu saillants, souvent un peu inclinés; columelle styloforme et petite; cloisons entières et bien développées; point de palis; cœnen-

chyme abondant, compacte et finement granulé; côtes granuleuses, visibles seulement au bord des calices.

Les fossiles qui composent ce genre ont beaucoup d'affinité avec les Stylophoriens, mais les loges se remplissent très-vite par suite du développement de la columelle et de l'endothèque, ce qui n'arrive jamais chez ces derniers et le cœnenchyme est compacte au lieu d'être feuilleté ou poreux.

1. *P. GIBBOSA*. = Polypier élevé, arrondi et pédiculé, s'accroissant par superposition de couches dermiques granulées; calices très-peu saillants, irrégulièrement écartés et assez profonds; columelle petite, tuberculeuse et profonde; cloisons entières, à peine débordantes; 6 grandes cloisons, 6 petites; côtes tout à fait rudimentaires; cœnenchyme très-granulé. Diam. des calices, 1 mill.; distance qui les sépare, 2 à 3 mill.; hauteur totale du polypier, 10 centim. — *Corallien*: Charente (Haute-Saône).

2. *P. ASPERA*. = Polyp. pédiculé, gibbeux et subdendroïde; il s'élève de la surface des cônes couverts de calices et qui hérissent la partie moyenne et supérieure du polypier; les calices sont un peu plus petits et plus saillants que dans l'espèce précédente; 6 grandes cloisons, 6 petites; columelle petite et peu saillante; cœnenchyme très-compacte et très-granulé. Diam. des calices, un peu moins d'un mill.; hauteur totale du polypier, 8 à 9 cent. — *Corallien*: Charente; Champlitte (Haute-Saône).

3. *P. DENDROIDEA*. = Polypier arborescent, formant des tiges larges de 3 à 12 mill.; calices peu saillants, épars; columelle assez forte et très-profonde; les calices sont creux et larges de 2 mill.; 12 cloisons peu inégales; cœnenchyme très-compacte et bien granulé; côtes rudimentaires; le bourgeonnement se fait au centre des rameaux. — *Corallien*: Charente; Champlitte.

4. *P. SEQUANA*. = Cette espèce n'est connue que par un rameau cylindrique large de 7 mill.; les calices larges de 1 1/2 mill. sont inclinés et disposés selon des lignes ascendantes, régulières, parallèles et très-rapprochées; 6 grandes cloisons, 6 petites; columelle bien développée. — *Kimmeridgien*: Chargey (Haute-Saône).

GENRE XCVI. — PROHELIA.

Polypier branchu, disposé en espalier; calices placés sur deux rangées parallèles le long des bords de chaque branche et tous dirigés en avant; ils naissent sur la partie postérieure des rameaux et se contournent à droite ou à gauche pour se placer en avant; calices saillants; columelle styliforme; cloisons entières; cœnenchyme très-développé, compacte et fortement granulé.

Trompé par la manière dont le bourgeonnement s'opère dans ces polypiers, nous avons d'abord placé ces fossiles parmi les Astrangiens et nous en avons décrit un sous le nom de *Stylangia Néocomiensis*; mais de meilleurs échantillons nous ont donné la certitude que les branches au lieu d'être horizontales comme nous l'avions d'abord pensé, sont au contraire verticales et disposées en espaliers, et que tous les caractères anatomiques rapprochent ces fossiles des Oculi-

niens. Nous avons donc cru devoir changer le nom de *Stylangia*, dont la terminaison appartient à une autre famille en celui de *Prohelia*, qui rappelle en même temps la forme de ces polypiers et la famille à laquelle ils appartiennent.

1. P. NEOCOMIENSIS. — *Stylangia Neocomiensis*, E. de Fromentel, *Descript. des Pol. foss. de l'Étage Néocomien*, p. 38, pl. 5, fig. 3-4-5, 1857. — Rameaux larges de 5 à 8 mill., aplatis en avant et arrondis en arrière; calices larges de 1 à 1 1/2 mill., peu saillant; 6 grandes cloisons, 6 petites; cœnéchyme très-granulé. — Néocomien : Gy-l'Evêque.

2. P. CORALLINA. — *Stylangia Corallina*, Ed. de Fromentel, *loc. cit.*, (sans description). — Polypier disposé en espalier; branches arrondies en arrière et plates en avant; calices rangés sur les côtés des branches; ils sont saillants, assez espacés et profonds; la columelle est styli-forme, mais peu développée; les côtes sont rudimentaires et le cœnéchyme compacte et très-granulé. Il y a quelquefois trois rangées parallèles de calices sur le même rameau, ce qui n'arrive jamais dans le *P. Neocomiensis*. On compte 16 cloisons dans les grands calices, 8 grandes et 8 petites, cependant parmi les 8 grandes il y en a évidemment 6 qui sont plus fortes et 2 moins développées. Diam. des calices, 2 mill.; diam. des rameaux, 12 à 18 mill. — Corallien : Champlitte.

GENRE XCVII. — ASTROHELIA.

Astrhelia, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, t. XXIX, p. 68, 1849.

Astrohelia, *id.*, *id.*, *Hist. nat. des coral.*, p. 3, t. II, 1856.

Polypier dendroïde, résultant d'une gemmation irrégulière; calices faiblement striés extérieurement; cloisons dentées; columelle rudimentaire; chambre ne se remplissant que très-peu par le développement du tissu mural.

Ce genre nous laisse des doutes sur la véritable place qu'il doit occuper parmi les Polyastrées Apores, il a cependant plus d'affinité avec la famille des *Oculiniens* qu'avec aucune autre.

1. A. PALMATA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, t. XIII, p. 74, 1850. — *Madrepora id.*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 30, fig. 6. — Polypier palmé; calices bien striés, peu profonds, larges de 2 à 3 mill.; de 24 à 40 cloisons alternativement inégales et finement dentelées. — *Falunien* : Chesapeake-Bay, Maryland.

2. A. VASCONIENSIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — Polypier subdendroïde; calices non-saillants, larges de 2 à 2 1/2 mill.; 3 cycles de cloisons minces. — *Falunien* : Saucats (Gironde).

3. A. LESUEURI, Edwards et Haime, *loc. cit.* — Polyp. à branches cylindriques et coalescentes; stries costales faibles et flexueuses; calices peu profonds, larges de 4 mill.; 28 cloisons très-inégales. — *Falunien* : Walnut-Hills.

GENRE XCVIII. — BARYHELIA.

Baryhelia, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, p. 125, 1856.

Polypier massif; cœnenchyme peu développé et finement granulé; cloisons peu nombreuses, peu débordantes, entières, épaisses et étroites; point de columelle ni de palis; calices creux au centre.

1. B. ARCHIACI, Edwards et Haime, *loc. cit.* == Polypier subturbiné à surface convexe; calices peu saillants, larges de 2 centim.; 12 cloisons alternativement inégales. — *Turonien*: Cherk, près de Tournay.

2. B. MICHELINI, Edwards et Haime, *loc. cit.* == Diffère de la précédente par ses calices plus rapprochées, ses cloisons moins inégales et moins débordantes. — *Craie de Rouen*?

XXII^e Famille. — Stylophoriens.

Stylophoriens, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 132, 1856.

Chambres divisées par des traverses lamelleuses très-espacées; polypières ne s'oblitérant pas par le développement de l'endothèque; cœnenchyme subcompacte, le plus souvent lamelleux, vésiculeux, ou poreux; appareil septal bien développé.

Les Stylophoriens ne se distinguent des Oculiniens que par un cœnenchyme moins compacte et des loges toujours creuses; mais ces deux caractères sont souvent effacés par suite de la fossilisation et il peut très-bien arriver que des espèces placées parmi les Oculiniens appartiennent réellement aux Stylophoriens.

GENRE XCIX. — STYLOPHORA.

Stylophora (pars), Schweigger, 1816.

Stylophora et Sideropora, Blainville, *Dict. des sc. nat.*, 1830.

Stylophora, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.* 1850.

Polypier arborescent ou palmé; cœnenchyme subcompacte et fortement granulé à la surface; calices peu saillants et profonds; columelle styloforme; côtes rudimentaires; cloisons inégales.

a. Rameaux comprimés.

1. S. RARISTELLATA, Edwards et Haime, *Ann. des sc.*, *loc. cit.*, p. 105. — *Astrea id.*, Michelin; *Icon.*, pl. 13, fig. 5. == Polypier formant des branches lamellaires minces et lobées; calices espacés, peu saillants et larges de 1 mill.; columelle petite; 6 cloisons bien développées. — *Falunien*: Dax; Turin.

aa. Rameaux subcylindriques.

b. Calices disposés sans ordre.

2. S. CONTORTA, J. Haime, *Mém. de la Soc. Géol.*, 2^e série, t. IV, p. 283, 1852. — *Astrea id.*, Leymerie, 1846, — *Pocillopora raristellata*, Michelin, p. 276, 1846. == Branches larges d'un centim., cœnenchyme costulé; 12 cloisons dont 6 rudimentaires. Largeur des calices, 1 1/2 mill. — *Parisien*: La Palarea; Sinde.

3. *S. RUGOSA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.* — Rameau un peu comprimé et très-granulé; columelle forte; calices ovalaires, larges de $\frac{2}{3}$ de mill., — *Parisien* : Biaritz.

4. *S. COSTULATA*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.* p. 136. t. II, 1856. — Cœnenchyme strié; aire des calices séparée par des lignes polygonales; calices ovalaires, larges d'un mill.; columelle cylindrique, bien distincte; 3 cycles de cloisons dont 6 bien développées. — *Falunien* : Gass.

Ces 4 premières espèces ont le calice non saillant, mais entouré d'un bourrelet circulaire.

aa. — bb. *Calices disposés en séries verticales.*

5. *S. THYRSIFORMIS*, J. Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Michelotti, 1847. — Calices assez saillants, larges d'un mill. et en série assez écartées. — *Falunien* : Belforte.

6. *S. CORALLINA*. — Polypier dendroïde à branches un peu prismatiques; calices peu saillants et placés en petites séries ascendantes irrégulières; cœnenchyme très-granulé, columelle petite et styloforme, 12 cloisons, 6 grandes et 6 petites. Diam. des calices un peu plus d'un mill.; diam. des rameaux, 10 à 12 mill. — *Corallien* : Chatel-Censoir; Ecuelle.

7. *S. REGULARIS*. — Ce polypier ne diffère du précédent que par des calices plus écartés et placés en séries ascendantes longues et très-régulières. — *Corallien* : Chatel-Censoir (Yonne).

GENRE C. — STYLOHELIA.

Polypier massif ou dendroïde; calices très-saillants, en cônes tronqués et fortement costulés au voisinage du calice; les côtes, en descendant se confondent avec les granulations qui couvrent la surface du cœnenchyme; celui-ci est feuilleté et plus ou moins serré et dense; la columelle est forte et styloforme; les grandes cloisons s'unissent avec elle au moyen de trabéculins horizontaux régulièrement espacés; les traverses sont bien développées, mais très-éloignées.

1. *S. MAMILLATA*. — Polypier en masses mamelonnées; bourgeonnement s'opérant le long d'un polypierite souche et s'écartant en tous sens; cœnenchyme formé de feuilletés très-minces et très-serrés, mais visible dans une coupe verticale; sa surface est couverte de stries granuleuses fines et serrées; les calices sont très-élevés, renflés à la base et parfaitement ronds; la columelle est forte et styloforme; 24 cloisons par calice, dont 6 grandes s'unissant à la columelle au moyen de trabéculins réguliers, 6 petites dont le bord interne reste libre et 12 rudimentaires; chaque cloison correspond à 3 côtes granuleuses qui se trouvent réunies près du bord calicinal et qui s'écartent ensuite en descendant le long du calice; il y a en tout 72 côtes subégales et un peu flexueuses; les traverses sont bien développées et distantes d'environ 3 mill. Diam. des calices, 1 $\frac{1}{2}$ mill. — *Corallien* : Gy (Haute-Saône).

2. *S. CONFERTA*. Polypier mamelonné; calices saillants et très-serrés; côtes visibles dans le voisinage des calices, mais se transfor-

mant en granulations qui couvrent les espaces intercalicinaux ; calices ronds, assez creux ; columelle épaisse et peu saillante ; cloisons épaisses ; les primaires unies à la columelle, en tout 24, 6 grandes, 6 petites et 12 rudimentaires ; 3 côtes granuleuses pour chaque cloison. Diam. des calices, un peu plus de 2 mill. — *Corallien* : Chatel-Censoir.

3. S.? DENDROIDEA. = Polypier dendroïde à gros rameaux ; calices très-saillants, inclinés et ronds ; columelle petite, comprimée ; 12 cloisons, 6 grandes et 6 petites ; peut-être y a-t-il 12 cloisons rudimentaires ; côtes bien visibles au pourtour des calices, mais se transformant très-vite en granulations fines et nombreuses. Diam. des calices, 1 1/2 millim. ; diam. des rameaux, de 2 à 8 ou 9 centim. — *Corallien* : Ecuelle (Haute-Saône).

GENRE CI. — ARÆACIS.

Aræacis, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, t. XXIX, p. 70. 1849.

Polypier massif et astreïforme, cœnenchyme spongieux et échinulé à la surface ; murailles minces et bien distinctes du cœnenchyme ; cloisons inégales et entières ; celles du second cycle sont représentées par des séries de pointes cristiformes ; point de columelle.

1. A. MICHELINI, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 3^e série, t. XIII, p. 106, 1850. — *Astrea sphaeroidalis* (pars), Michelin, *Icon.*, 41, fig. 9 b et c. = Polypier convexe ; calices peu saillants, circulaires, larges de 4 mill. ; 3 cycles et le commencement d'un 4^e ; les cloisons des derniers ordres sont rudimentaires. — *Parisien* : Auvert ; Valmondois, etc.

2. A. AUVERTIACA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astreopora id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Astrea id.*, Michelin, pl. 44, fig. 10. = Calices circulaires, inégaux et larges d'environ 2 mill. ; 2 cycles et le commencement d'un 3^e. — *Parisien* : Auvert, etc.

GENRE CII. — HETEROCÆNIA.

Heterocœnia, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, t. X, p. 308, 1849.

Cyclocœnia (pars), d'Orbigny, *Not. sur les Pol. foss.* p. 7, 1849.

Polypier massif ou subdendroïde ; polypiérites réunis par un cœnenchyme abondant, vésiculeux et feuilleté ; calices écartés, circulaires et saillants ; point de columelle, point de palis ; cloisons débordantes et dépendant du type triméral.

A. 2 Cycles (6 cloisons). — a. *Polypier convexe ou gibbeux.*

1. H. EXIGUA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Lithodendron exiguum*, Michelin, *Icon.*, pl. 72, fig. 7. = Calices saillants, obliques, divergents et larges de 1 1/2 mill. ; cœnenchyme très-granulé ; 6 cloisons subégales. — *Turonien* : Martignes.

2. H. CRASSI-LAMELLATA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Stylina id.*, Michelin, pl. 7, fig. 7. — *H. grandis*, Reuss, *Denck. der Wiener*, etc., pl. 10, fig. 1-2. = Polypier étalé et subplane ; calices larges de 4 millimètres ; écartés de 10 ; cœnenchyme granulo-strié ; 6 cloisons alternativement inégales. — *Turonien* : Uchaux ; Gosau.

3. H. CONFERTA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Lithodendron humile*

(pars), Michelin, p. 291. — *H. humilis*, d'Orbigny, *Prod.* = Calices rapprochés, inégaux, larges de 3 à 4 mill.; 3 cloisons épaisses et 3 très-minces. — *Turonien* : Soulage (Corbières).

4. *H. DISTANS*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Dichocænia* id., *ibid.*, *Ann.*, *loc. cit.* — *Cyclocænia rustica*, d'Orbigny, *Prod.* = Calices écartés, circulaires et larges de 4 mill.; cloisons inégales, épaisses et débordantes. — *Turonien* : îles d'Aix.

5. *H. REUSSI*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 284, t. II, 1956. — *H. provincialis*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 10, fig. 3-4, 1854, = Calices superficiels, larges de 2 mill.; distants de 4 à 6; cloisons peu développées et inégales. — *Turonien* : Gosau.

A. — aa, *Polypier dendroïde*.

6. *H. DENDROIDES*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 10, fig. 5-6. = Calices superficiels, larges de 1 1/2 mill.; distants de 4 à 6; cloisons peu développées et peu inégales. — *Turonien* : Gosau.

7. *H. VERRUCOSA*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 10, fig. 7-8. = Rameaux larges de 20 mill.; calices un peu saillants, larges de 1 à 1 1/2 mill., distants de 3; cloisons bien développées et peu inégales. — *Turonien* : Gosau.

B. — 3 Cycles (12 cloisons).

7. *H. PROVINCIALIS*, Edwards et Haime, *Ann. des sc.*, *loc. cit.* — *Stylina* id., Michelin, *Icon.*, pl. 7, fig. 8 = Polypier peu élevé et subplane; polypières peu divergents; calices égaux, écartés, larges de 2 mill.; 12 cloisons dont 6 petites, rudimentaires. — *Turonien* : Uchaux.

C. — Plus de 3 cycles.

8. *H. CRASSA*. = Polypier massif, arrondi; polypières saillants, réunis par un cœnenchyme abondant et granulé; calices ronds et peu profonds; cloisons épaisses et entières, trois principales sont plus développées que les autres; on en compte en tout 18, dont 6 très-petites; côtes nulles; cloisons débordantes. Diam. des calices, 5 mill. — *Coralien* : Chatel-Censoir.

Espèce douteuse.

9. *H. MINIMA*, d'Orbigny, *Prod.*, t. II, p. 207, 1850. — *Turonien* : Le Bausset.

GENRE CIII. — ELASMOCÆNIA.

Elasmocænia, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, p. 69, 1851.

Oculina (pars), Michelin, *Icon.*, 1845.

Cyclocænia (pars), d'Orbigny, *Not. sur les Pol. foss.*, p. 7, 1849.

Polypier sublamellaire et astréiforme; polypières réunis par des expansions murales granuleuses qui constituent un cœnenchyme feuilleté; murailles épaisses; point de columelle; point de palis; plateau commun, couvert d'une épithèque bien développée; cloisons inégales, granuleuses et dépendant du type hexaméral.

1. *E. GUERANGERI*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Cœnenchyme vési-

culeux et granulé; calices larges de 3 mill., peu inégaux, peu sail-lants et écartés; 3 cycles incomplets; cloisons droites et inégales. — *Turonien* : Le Mans.

2. E. EXPLANATA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Oculina id.*, Miche-lin, *Icon.*, pl. 51, fig. 3. — *Cyclocænia id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Polyp. mince; polypières inclinés et réunis par des expansions très-serrées; côtes rudimentaires; calices subelliptiques, larges de 3 à 4 mill. et dis-posés selon des lignes concentriques assez régulières; 3 cycles et un com-mencement d'un 4^e; cloisons minces et inégales. — *Turonien* : Le Mans.

3. E. MICHELINI, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II. p. 280, 1856. = Calices penchés, larges de 10 mill., et comprimés; envi-ron 60 cloisons minces et alternativement inégales. — *Turonien* : Le Mans.

MM. Edwards et Haime proposent de donner (*Hist. nat. des coral.*, suite à *Buffon*, t. II. p. 285, 1856), le nom de *Psammocænia Kæklini* à un fossile qui doit aussi faire partie des Stylopho-riens. Ce polypier qui dépend du type hexaméral, a une columelle et 6 palis par calice; les polypières sont réunis par un cœnen-chyme granulé et abondant. Ce fossile est de Ligsdorf (Haut-Rhin).

XXIII^e Famille. — Diplocœniens.

Loges divisées par des traverses lamelleuses; deux murailles distinctes, l'une colonnaire et ronde, l'autre pariétale et polygo-nale; la première muraille est cachée par des rayons septo-cos-taux entiers et non dentelés; columelle forte et styloforme; mul-tiplication par bourgeonnement.

GENRE CIV. — DIPLOCCÆNIA.

Diplocænia, E. de Fromentel, *Descrip. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 38, 1857.

Polypier étalé ou en masse arrondie; plateau commun recou-vert d'une forte épithèque plissée. Chaque polypière a deux murailles, l'une saillante, colonnaire, cachée par les cloisons, mais indiquée par un bourrelet circulaire, l'autre pariétale, visible, sé-parant les côtes et soudée aux murailles voisines semblables; les cloisons sont épaisses, entières, et se continuent avec les côtes; la columelle est forte et styloforme.

1. D. MIRABILIS, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 39, pl. 5, fig. 7-8-9, 1857. = Polypier étalé et pédiculé; murailles colonnaire parfaitement ronde; murailles pariétales très-irrégulières et donnant lieu à des aires de toutes formes ayant depuis 3 jusqu'à 9 mill. de largeur; 32 rayons septo-costaux. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

2. D. CORALLINA. = Polypier en masse épaisse et subgibbeuse; ca-lices assez profonds et circulaires; muraille colonnaire peu saillante, mais cependant bien indiquée; muraille pariétale, dépassant les côtes et un peu en zig-zag par suite de l'alternance des côtes; les espaces cir-

conserits par les secondes murailles ne forment pas des figures régulières; columelle très-forte, ronde et saillante; 12 grandes cloisons subégales allant en s'amincissant jusqu'à la columelle; 12 cloisons très-petites, mais donnant lieu à des côtes aussi fortes que celles qui correspondent aux cloisons primaires, en tout 24 côtes. Diam. des murailles internes, un peu plus de 2 mill.; diam. des espaces compris entre les murailles pariétales, environ 5 mill. — *Corallien inférieur*: Charcenne, Ecuelle (Haute-Saône).

C'est probablement à ce genre qu'il faut rapporter le *Stylina Deluci*, (Edwards et Haime. *Ann.*, etc. p. 292, 1849), qui présente tous les caractères des *Diplocœnies*, et les fossiles Coralliens de Valfin, pour lesquels M. Etallon (*Etude sur le Haut-Jura*), a voulu rétablir le genre *Actinocœnia* de A. d'Orbigny, mais sans lui laisser les caractères qu'il possédait d'abord. Les *Actinocœnies* de A. d'Orbigny étaient des *Phyllocœnies* à columelle styloforme et n'ayant qu'une seule muraille, tandis que celles de M. Etallon ont toutes deux murailles et présentent les caractères de nos *Diplocœnies*. Nous donnons d'après cet auteur les caractères spécifiques qu'elles présentent :

3. D. STELLATA. — *Actinocœnia id.*, Etallon, *loc. cit.* == Polypier convexe; calices horizontaux; rayons septo-costaux, égaux et épais; columelle cylindrique, épaisse et saillante; 2 cycles et des rudiments d'un 3^e. Diam. des calices, 1 mill. : des polypières, 1 1/2. — *Corallien*: Valfin.

4. D. MINIMA. — *Actinocœnia id.*, Etallon, *loc. cit.* == Cette espèce ne diffère de la précédente que par sa forme digitée et ses calices plus petits et larges seulement de 1/2 mill. — *Corallien*: Valfin.

5. D. CLATHRATA. — *Actinocœnia id.*, Etallon, *loc. cit.* == Cette espèce assez voisine du *D. Corallina* en diffère par son polypier élevé, formé de colonies limitées; ses calices sont aussi plus petits et n'ont que 1 1/2 mill. de diam. L'espace compris entre les murailles externes est de 3 mill. seulement. — *Corallien*: Valfin.

6. D. LOBATA. — *Actinocœnia id.*, Etallon, *loc. cit.* == Cette dernière espèce diffère des précédentes en ce qu'elle dépend du type octoméral; le polypier est subdendroïde; les murailles externes peu distinctes; on compte 16 cloisons inégales; la columelle est forte et saillante; les côtes et les cloisons subégales. Diam. des calices, 1 mill.; des polypières, 2. — *Corallien*: Valfin.

XXLV^e Famille. — Styliniens.

Stylinacées, (pars) Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 217, 1856.

Polyastrées ayant les loges divisées par des traverses lamelleuses; une seule muraille; cloisons entières, ni dentées, ni lobées; multiplication par bourgeonnement.

GENRE CV. PLACOCÆNIA.

Placocœnia, d'Orbigny, *Note sur les Pol. foss.*, p. 7, 1849.

Polypier massif; calices ronds, mais plus souvent ovales, et réunis.

nus par le développement des côtes; columelle lamelleuse et bien développées; les cloisons sont entières et inégales; les jeunes polypières se développent entre les anciens; les côtes sont plus ou moins fortes, granuleuses ou cristiformes.

A. — *Type décaméral.*

1. P. MACROPHTHALMA, d'Orbigny, *Prod.*, t. II., p. 277, 1850. — *Astrea* id., Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 24, fig. 2. — Calices un peu comprimés, écartés et larges de 8 mill.; côtes bien développées, subégales et flexueuses; 3 cycles complets (40 cloisons); les cloisons sont inégales selon les ordres. — *Sénouien* : Mæstricht.

B. — *Type hexaméral.*

2. P. PERRONI. — Polypier massif et subastréiforme; calices ovaires peu profonds, assez saillants; cloisons épaisses, droites et terminées par un bord interne perpendiculaire et épais; columelle mince, mais bien développée; côtes fortes, épaisses et cristiformes; il n'y a d'abord que 6 cloisons principales dont deux sont placées dans le sens de la columelle, mais les secondaires deviennent bientôt aussi fortes que les primaires; on compte en tout 48 cloisons (4 cycles complets); le grand diam. des calices varie de 18 à 20 mill., et le petit de 12 à 15; les calices qui n'ont encore que 6 cloisons sont larges seulement de 4 à 5 mill.; les calices de 7 à 8 mill., ont déjà 3 cycles, mais les 6 cloisons primaires sont encore bien plus développées que les secondaires. — *Corallien* : Oyranches (Haute-Saône).

GENRE CVI. — STYLINA.

Stylina, Lamarck, *Hist. des an. sans. vert.*, 1816.

Astrea, Goldfuss, *Petref. Germ.*, 1826.

Gemmastrea et *Branchastrea*, Blainville, *Dict. des sc. nat.*, 1830.

Stylina, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 3^e série, t. X, p. 287, 1849.

Lobocænia, *Conocænia*, *Adelocænia*, *Tremocænia*, *Cryptocænia* (pars), *Dendrocænia*, *Adelocænia* (pars), d'Orbigny, *Note sur les Pol. foss.*, 1849.

Octocænia, *Decacænia*, *Pseudocænia*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850.

Polypier massif, convexe, gibbeux, subplane ou dendroïde; polypières réunis par des côtes qui ne sont jamais séparées par une muraille extérieure; calices libres, circulaires, généralement élevés; cloisons entières et souvent débordantes; systèmes dépendant des types hexaméral, octoméral et décaméral; columelle styliforme et saillante; gemmation intercalicinale; traverses bien développées; plateau recouvert d'une forte épithèque plissée.

Les stylines se divisent naturellement en trois sous-genres suivant les trois types qui se les partagent.

1. TYPE HEXAMÉRAL. — STYLINGE PROPRE.

A. — Quatre cycles.

1. S. GRANDIFLORA. == Polypier en masse arrondie ; calices peu saillants et subovales ; columelle forte, ronde et saillante ; cloisons non débordantes, épaisses près de la muraille et tuberculeuses près de la columelle ; la partie interne des 12 grandes cloisons imite un palis par son épaississement ; 12 grandes cloisons, 12 petites, 24 rudimentaires. Diam. des calices, 7 mill. — *Corallien inférieur* : Charcenne (Haute-Saône).

2. S. ALVEOLATA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 236, t. II. 1856, (non *Astrea id.*, Goldfuss). == Cette espèce ne diffère de la précédente que par ses côtes inégales, sa columelle comprimée et ses calices plus petits ; ils n'ont que 6 mill. — *Corallien* : Norvillards (Doubs) ; Wurtemberg ?

3. S. TUBULOSA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, p. 59, 1851, (non *Ann. des sc. nat., loc. cit.*) — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 58, fig. 15, (figure inexacte). == Côtes égales ; calices saillants et larges de 4 mill ; columelle ronde. — *Corallien* : Wurtemberg ; Haut-Rhin.

B. — Trois cycles. — b. Polypier massif.

c. Cloisons secondaires égales aux primaires.

4. S. GEMMANS. == Polypier en masse arrondie ; calices un peu comprimés et saillants ; polypierites externes ayant de la tendance à s'isoler ; épithèque bien développée et envahissant la surface calicinale ; columelle épaisse et un peu comprimée ; cloisons débordantes et minces au centre ; on en compte 24 par calice, 12 grandes et 12 petites ; côtes alternativement minces et épaisses. Diam. des calices, 6 à 7 mill. — *Corallien* : Charcenne.

5. S. SULCATA. == Polypier élevé et pédiculé ; calices superficiels ; columelle petite et saillante ; côtes inégales, les plus fortes sont saillantes, cristiformes et séparées par des sillons profonds ; 12 grandes cloisons, petites ; calices assez serrés, profonds et larges de 6 mill. — *Corallien* : Charcenne.

6. S. COTTEAUI. == Polypier gibbeux ; calices serrés, mais restant ronds ; cloisons minces et bien développées ; columelle ronde et assez grosse ; 12 grandes cloisons égales et un peu renflées près de la columelle ; 12 petites ; côtes un peu inégales. Diam. des calices, 5 mill. — *Corallien* : Chatel-Censoir.

7. S. MOREAUI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Adelocænia Moreana*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. == Polypier gibbeux ; calices saillants et larges de 2 1/2 mill. — *Corallien* : Sampigny.

8. S. COQUANDI, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Pseudocænia elegans*, d'Orbigny, *Prod.* == Calices peu saillants et larges de 1 1/2 mill. ; 12 grandes cloisons ; 12 petites. — *Corallien* : Saint-Mihiel.

B. — b. — cc. Les cloisons primaires et secondaires inégales.

9. S. CHARCENNENSIS. == Polypier en masse arrondie ; calices superficiels et très-rapprochés ; côtes fines, un peu inégales ; columelle forte et ronde ; 6 grandes cloisons épaisses et allant jusqu'à la columelle ; 6 petites et 12 rudimentaires. Diam. des calices, 6 mill. — *Corallien* : Charcenne.

10. *S. SPECIOSA*, E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. géol. de France*, 2^e série, t. XIII, p. 856, 1856. = Polypier en masse arrondie; calices très-saillants; 6 grandes cloisons, 6 petites, 12 rudimentaires; 12 côtes fortes et atteignant le sommet des calices; 12 plus petites et s'arrêtant à la moitié de la hauteur de la partie saillante des polypières. Diam. des calices, 3 à 4 mill.; hauteur, 4 à 5. — *Portlandien*: Gray-la-ville; Mantoche.

11. *S. BUCHETI*, E. de Fromentel, *loc. cit.*, 1856. = Polypier en lames assez minces; calices peu saillants et larges de 3 à 4 mill.; 6 grandes cloisons, 6 petites, 12 rudimentaires; côtes fines et subégales; columelle petite et comprimée. — *Portlandien*: Mantoche.

12. *S. KIMMERIDGIENSIS*. = Polypier en masse arrondie; calices assez saillants; régulièrement ronds et peu profonds; columelle petite; cloisons très-minces et inégales; 6 grandes, 6 moyennes; 12 petites; côtes arrondies et subégales. Diam. des calices, 4 mill. — *Kimmeridgien*: Arc, près Gray; Pontarlier?

13. *S. GIRAUDI*, Etallon, *loc. cit.* = Polypier en masse arrondie et pédiculée; calices assez élevés, larges de 4 mill.; 3 cycles de cloisons; les secondaires peu différentes des primaires; columelle forte et comprimée; 4 cycles de côtes inégales. — *Corallien*: Valfin.

14. *S. DUFRENOYI*, Edwards et Haime, *Pot. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea tubulosa*, Michelin, *Icon.*, pl. 27, fig. 2. — *Adelocænia id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Calices peu saillants, larges de 3 mill.; 3 cycles inégaux. — *Corallien*: Saint-Mihiel; Chatel-Censoir.

15. *S. ETALLONI*. = Polypier convexe; calices très-serrés, mais restant circulaires et assez profonds; columelle petite et assez comprimée; cloisons épaisses et allant s'unir à la columelle, au moyen de trabéculines horizontales; 24 cloisons dont 6 plus développées que les autres; ces 24 cloisons ne se montrent que dans les grandes calices; souvent on n'en compte que 18. Diam. des calices, 2 1/2 mill. — *Kimmeridgien*: Le Havre.

16. *S. VALFINENSIS*, Etallon, *loc. cit.* = Polyp. convexe et peu élevé; calices serrés, peu inégaux et peu profonds; 3 cycles inégaux; 4 cycles de côtes égales; columelle forte et ronde. Diam. des calices, 2 1/2 à 3 mill. — *Corallien*: Valfin.

17. *S. ECHINULATA*, Lamarck, *Hist. des an. s. vert.*, 1816. — Lamouroux, 1821. — *Sarcinula microphthalma*, Goldfuss, pl. 25, fig. 1. — *Stylina Gaulardi*, Michelin, pl. 21, fig. 5. = Polyp. élevé et convexe; calices peu saillants, larges de 2 à 2 1/2 mill.; columelle cylindrique. — *Corallien*: Dun; Gy (Haute-Saône).

18. *S. SOLIDA*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, 1851. — *Stylophora solida*, McCoy, 1848. — *Stylina Babeana*, d'Orbigny, *Prod.* = Polypier convexe; calices écartés, larges de 3 mill.; columelle grosse et comprimée. — *Bathonien*: Morey (Haute-Saône); Metz; Dundry, etc.

19. *S. ? RADICENSIS*, Edwards et Haime, *Pot. foss. des terr. Pal.*, 1851. *Cryptocænia id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Calices serrés, peu saillants et larges de 2 1/2 mill. — *Corallien*: île de Rhé.

B. — bb. *Polypier dendroïde.*

20. *S. SERTIFERA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Pocillopora id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 54, fig. 13. — *Dendrocænia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — Ra-

meaux ronds, larges de 10 à 12 mill.; calices peu élevés et larges d'un peu moins de 2 mill.; 3 cycles inégaux. — *Bajocien* : Langrune.

21. *S. LIMBATA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 8, fig. 7, et pl. 38, fig. 7. — *Cryptocænia id.*, d'Orbigny, *Prod.* == Rameaux souvent comprimés; calices élevés, écartés, inégaux; columelle cylindrique et pointue; côtes fines et inégales. Diam. des calices, 2 mill. — *Corallien* : Geingen.

22. *S. NODOSA*, Etallon, *loc. cit.* == Tige unique et noueuse; calices peu écartés, peu inégaux, larges d'un peu moins de 2 mill.; côtes fortes serrées et granulées; polypières séparés par des lignes polygonales; columelle tuberculeuse; cloisons inégales. — *Corallien* : Valfin.

23. *S. CÆSPITOSA*, Etallon, *loc. cit.* == Polypier élevé de 70 cent.; rameaux droits et serrés; calices circulaires, espacés, égaux et larges de 1 1/2 mill.; columelle styloforme; côtes inégales et granuleuses; cloisons inégales. — *Corallien* : Valfin.

24. *S. GRACILIS*, Etallon *loc. cit.* == Rameaux grêles et courts se bifurquant suivant un angle très-ouvert; calices obliques, assez élevés et larges de 1 1/2 mill., côtes bien développées et soudées entre elles suivant une ligne brisée; cloisons assez épaisses près de la muraille; celles du 3^e cycle tout à fait rudimentaires. — *Corallien* : Valfin.

C. Deux cycles: — c. Polypier massif.

25. *S. PERRONI*, E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. Géol. de France*, 2^e série, t. XIII, p. 856, 1856. == Polypier épais, étendu, mamelonné; calices ronds et rapprochés; 6 grandes cloisons soudées à une columelle saillante, 6 petites. Diam. des calices, 5 mill. — *Portlandien* : Mantoche. — (C'est par erreur que dans le Bulletin les diamètres des calices sont indiqués comme n'étant que de 2 1/2 mill.).

26. *S. FLOTTEI* (MAILLET), E. de Fromentel, *loc. cit.* == Polypier arrondi; calices peu saillants et larges de 3 mill.; 6 grandes cloisons soudées à une columelle petite, et 6 petites cloisons; 24 côtes fines et en relief. — *Portlandien* : Gray-la-ville.

27. *S. INFLATA*, E. de Fromentel, *loc. cit.*, 1856. == Polypier gibbeux et mamelonné; calices saillants, espacés et comme renflés; les jeunes occupent le fond des dépressions occasionnées par le renflement des anciens; 6 grandes cloisons, 6 petites, columelle forte et ronde. Diamètre des calices, 2 à 3 mill. — *Portlandien* : Mantoche.

28. *S. HEXAPHYLIA*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Cryptocænia id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Astrea cavernosa*, Quenstedt, *Handb. der Petref.* == 6 grandes cloisons, 6 petites. Diam. des calices, 4 mill. — *Corallien* : La Rochelle.

29. *S. CONIFERA*, Edwards et Haime, *Brit. foss. coral.*, 1851. == Polypier convexe et gibbeux; calices élevés, circulaires et larges de 2 mill.; columelle petite; 2 cycles inégaux; 3 cycles de côtes droites et inégales. — *Bathouien* : Bath.

30. *S. GEMINATA*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 23, fig. 8. — *Aplo astrea id.*, d'Orbigny, *Prod.* == Calices serrés, saillants, larges de 2 mill.; 12 cloisons peu inégales et bien développées. — *Sénouien* : Maestricht; Royan.

31. *S. MICROCOMA*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. == 6 cloisons bien développées; 2 cycles de côtes. Diam. des calices, 1 mill. — *Corallien* : Loix, île de Rhé. Tonnerre; Chatel-Censoir. — MM. Edwards et Haime

regardent comme appartenant à cette espèce, le *Pseudocœnia Bernardina*, de Landeyron et le *Stylina Rupellensis* de la Rochelle du même auteur.

32. *S. GRANULATA*. = Polypier en masse gibbeuse, formé de couches superposées; calices superficiels, larges de 1 1/2 mill.; 2 cycles inégaux; columelle un peu comprimée et profonde; cloisons fines, sub-égales et fortement granulées et dentées. — *Portlandien* : Gray-la-ville.

C. — cc. *Polypier dendroïde*.

33. *S. GRAYENSIS*, E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. Géol., loc. cit.*, 1856. = Rameaux épais et droits; calices peu saillants et assez rapprochés; cloisons débordantes et inégales; columelle petite et rudimentaire. Diam. des calices, 2 à 2 1/2 mill. — *Portlandien* : Gray-la-ville.

34. *S. INTRICATA*, E. de Fromentel, *loc. cit.*, 1856. — *S. Haimeï* *id.*, *id.* = Rameaux ronds, cylindriques, souvent anastomosés et formant des buissons épais et réticulés; calices petits et profonds, larges de 1 à 1 1/4 mill.; columelle petite et profondément située; 2 cycles inégaux; 12 côtes fortes, épaisses et égales. — *Portlandien* : Mantoche. — (Notre *S. Haimeï*, que nous avons décrit séparément n'est qu'une variété de celui-ci).

35. *S. MICROCœNIA*. = Polypier dendroïde; rameaux épais; calices superficiels et profonds; columelle bien développée et saillante; 6 grandes cloisons soudées à la columelle, et 6 petites; côtes inégales, les petites correspondent au troisième cycle, qui manque dans les calices. Le diamètre de ceux-ci est d'un peu moins d'un mill. — *Corallien* : Charente.

2. TYPE OCTOMÉRAL. — OCTOSTYLINÉ.

A. — 3 Cycles.

36. *S. INSIGNIS*. = Polypier en masse arrondie; calices peu élevés et superficiels; columelle forte, ronde, saillante et large de plus d'un mill.; cloisons assez minces, mais très-renflées près de la columelle, autour de laquelle leur bord interne forme une espèce de couronne; 8 grandes cloisons entre lesquelles on aperçoit les cloisons du 2^e et du 3^e cycles peu développées; côtes arrondies, épaisses et subégales. Diam. des calices, 4 à 5 mill. — *Corallien* : Charente.

AA. — Deux cycles; calices larges de 5 à 6 mill.

37. *S. SPLENDENS*. = Polypier en masse élevée et arrondie; calices un peu saillants et peu profonds; columelle petite et profondément située; 8 grandes cloisons un peu débordantes et assez épaisses, 8 plus petites; 32 côtes peu inégales. — *Corallien* : Charente.

AA. — Calices larges de 4 à 5 millimètres.

38. *S. COMMUNIS*. = Polypier arrondi; calices superficiels et peu profonds; columelle petite et isolée; 8 grandes cloisons minces au centre et 8 petites; côtes subégales et assez fortes. — *Corallien* : Charente.

39. *S. CASTELLUM*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea castellum*, Michelin, *Icon. Zooph.*, pl. 27, fig. 4, — *Adelocœnia id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Calices inégaux, assez saillants et serrés; les cloisons sont débordantes, alternativement inégales et plus développées.

que dans l'espèce précédente. — *Corallien* : Sompigny ; Goussaincourt ; Bay-Bel ; Tonnerre ; Champlitte.

AA. — *Calices larges de 4 millimètres.*

40. S. LABECHEI, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 242, 1856. — S. *Delabechii* id., *Brit. foss. corals.*, pl. 15, fig. 1, 1851. — *Astrea tubulosa*, Quenstedt, *Handb. der Petref.*, pl. 57, fig. 19-21, 1852 (non Goldfuss, ni Michelin). = Polypier en masse convexe et quelquefois gibbeuse ; calices peu saillants et inégalement écartés ; columelle un peu comprimée ; côtes inégales et granuleuses. — *Corallien* : Steeple-Ashton ; Belfort.

AA. — *Calices larges de 3 à 3 1/2 millimètres*

41. S. PISTILLUM. = Polypier arrondi ; calices peu saillants et peu profonds ; columelle grosse, forte et saillante ; cloisons épaisses mais amincies au centre ; on n'en voit que 8 grandes et un rudiment de 8 petites ; côtes égales ; calices larges de 3 à 3 1/2 mill. — *Corallien* : Charcenne.

42. S. EXCENTRICA. = Polypier en masse élevée et arrondie ; columelle petite, isolée et toujours placée en-dehors du centre du calice ; elle se trouve ordinairement très-rapprochée du bord interne d'une grande cloison et par suite éloignée des autres ; calices peu élevés, peu profonds et larges de 3 mill ; côtes subégales. — *Corallien* : Charcenne (Haute-Saône).

AA. — *Calices larges de 2 1/2 millimètres.*

43. S. THEVENINI, Etallon, *loc. cit.*, 1858. = Polypier en masse subplan ; calices serrés et subelliptiques ; cloisons minces et débordantes ; calices profonds de 3 mill. ; 32 côtes subégales et subconfluentes ; columelle peu développée. — *Corallien* : Pillemoine.

44. S. OCTONARIA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Pseudocænia* id., d'Orbigny, *Prod.* = Polypier élevé à surface supérieure arrondie ; cloisons débordantes et minces au centre ; côtes inégales et granuleuses ; columelle profonde et styliforme. — *Corallien* : La Rochelle ; Vauligny ; île de Ré ; Oyonnax ; Chatel-Censoir ; Valfin ? (Jura).

AA. — *Calices larges de 2 millimètres.*

45. S. RAMOSA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, 1856. — S. *ramosa et digitata* id., *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Pseudocænia* id., id., d'Orbigny, *Prod.* — *Astrea limbata*, Quenstedt, 1852, (non Goldfuss). = Polypier dendroïde ; calices inégaux et espacés. Diam. des rameaux, 3 à 4 cent. — *Corallien* : Tonnerre ; Oltingen ; Chatel-Censoir ; Champlitte.

46. S. FAUJASI, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 243, 1856. — *Astroite*, Faujas Saint-Fond, *Hist. nat. de la Mont. Saint-Pierre de Mæstricht*, pl. 36, fig. 1-2, 1799. — *Astrea geminata* (pars), Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 23, fig. d, f, (non les autres), 1826. = Cette espèce ne diffère du S. *geminata*, qu'en ce qu'elle dépend du type octoméral. — *Sénonien* : Mæstricht.

AA. — *Calices larges de 1 à 1/2 millimètres.*

47. S. BERNARDINA. — *Pseudocænia Bernardina et elegans*, d'Orbigny, *Prodrome*, t. II, p. 34, 1858. — S. Bernardana, Etallon, *loc. cit.*, 1858. == Polypier en masse polymorphe, convexe ou gibbeuse; calices peu serrés, assez saillants et peu profonds, et larges de 1 1/2 mill.; côtes subégales et granulées; columelle styloforme et libre. — *Corallien*: Landeyron; Vauligny; Valfin?

48. S. EXCELSA, Etallon, *loc. cit.* == Polypier subdendroïde, élevé et gibbeux; calices obliques, saillants et larges d'environ 1 mill. — *Corallien*: Valfin.

3. TYPE DÉCAMÉRAL. — DECASTYLINÆ.

A. — 3 Cycles cloisonnaires. — *Calices larges de 5 millimètres.*

49. S. MAGNIFICA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Decarænia id.*, d'Orbigny, *Prod* == Polypier en masse convexe; calices inégaux et peu saillants; les échantillons de la Haute-Saône renferment presque tous une quantité considérable de vers parasites qui enveloppent les calices. — *Corallien*: Chatel-Censoir; Vagnon; Gy (Hte-Saône).

A. — *Calices larges de 4 millimètres.*

* 58. S. LOBATA, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Explanaria id.*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 38, fig. 8. == Polypier convexe; calices en cônes saillants, écartés et inégaux; côtes granulées et inégales; cloisons minces; les calices sont larges de 4 mill. et quelquefois plus. — *Corallien*: Wurtemberg.

A. — *Calices larges de 3 millimètres.*

51. S. EXPLANATA. == Polypier convexe: calices à peine saillants et peu profonds; columelle peu développée et profonde; cloisons larges et peu débordantes; 40 côtes subégales et assez fortes. — *Corallien*: Charcenne (Haute-Saône).

52. S. TUBULIFERA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Brit. foss. corals.*, pl. 14, fig. 3. — *Astrea id.*, Phillips, 1829. — S. tubulosa, Michelin, *Icon.*, pl. 21, fig. 6, (non Goldfuss). — *Astrea tubulosa et Agaricia lobata*, Morris, 1843. — *Dentipora glomerata*, M'Coy, 1848. — *Astrea decemradiata*, Quenstedt, pl. 57, fig. 30, 1852. == Polypier en masse convexe et gibbeuse; calices peu serrés et assez saillants; columelle forte et comprimée; côtes égales et granulées; cloisons assez minces, mais épaissies vers les bords interne et externe. — *Corallien*: Steeple-Ashton; Malton; Saint-Mihiel; Champlitte.

AA. — 2 Cycles cloisonnaires. — *Calices larges de 3 millimètres.*

53. S. PLOTI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 23, fig. 1, 1852. — *Astroites?* Robert Plot, *Nat. Hist. of Oxford*, pl. 8, fig. 2, 1676. == Polypier convexe ou gibbeux; calices serrés, inégaux, peu saillants; columelle petite. (Ce fossile est peut-être une Stylohelie). — *Bajocien*: Comb-Down; Rumigny.

AA. — *Calices larges de 2 à 2 1/2 millimètres.*

54. S. CONSTRICTA. == Polypier convexe; calices saillants, très-rap-

prochés et très-profonds; columelle assez forte et profondément située; 10 grandes cloisons, 10 petites; 40 côtes très-granuleuses et égales; les calices sont un peu renflés à la base. Diam. des calices, 2 1/2 mill. — *Corallien* : Champlitte.

55. *S. BULLATA*. = Polypier à surface subplane; calices très-peu élevés, mais très-élargis à la base et comme gonflés; columelle peu développée et profonde; 10 grandes cloisons entre lesquelles on aperçoit 10 cloisons rudimentaires; 40 côtes fines et subégales. Diam. des calices, 2 mill. — *Corallien* : Champlitte.

56. *S. HIRTA*. = Polypier en forme de boule presque régulière; calices très-saillants et assez rapprochés, peu élargis à la base et assez profonds; 10 grandes cloisons, 10 petites et 20 rudimentaires; 40 côtes un peu inégales et granuleuses. Diam. des calices, 2 mill. — *Corallien* : Gy (Haute-Saône).

57. *S. ASPERA*, Etallon, *loc. cit.* = Polypier étalé; calices saillants, et serrés; côtes fines, droites et un peu ondulées inférieurement; columelle un peu aplatie et très-saillante. Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de notre *S. stricta*. — *Corallien* : Valfin.

Espèces douteuses.

58. *S.?* *COALESCENS*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Madrepora id.*, Goldfuss, pl. 8, fig. 6. — *Dentipora id.*, Blainville, 1830. — *Oculina id.*, Bronn, 1848. — *Corallien* : Wurtemberg; Charcenne.

59. *S. ARDUENNENSIS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Cryptocœnia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Corallien* : Neuvisi (Ardennes).

MM. Edwards et Haime rapportent encore au genre *Stylina* les espèces suivantes citées par M. d'Orbigny dans son *Prodrome* :

60. *LOBOCÆNIA CORALLINA*. — *Corallien* : Wagon.

61. *CRYPTOCÆNIA BAUGIERI*. — *Corallien* : Beauvoir (Deux-Sèvres).

62. *CRYPTOCÆNIA SUBREGULARIS*. — *Corallien* : Saulce-au-Bois : Dijon; Oyonnax; Tonnerre.

63. *ADELOCÆNIA CORALLINA*. — *Corallien* : Angoulins.

64. *ADELOCÆNIA LANCELOTI*. — *Corallien* : Wagon.

65. *TREMOCÆNIA SUBORNATA*. — *Corallien* : La Rochelle.

66. *TREMOCÆNIA PULCHELLA*. — *Corallien* : Tonnerre; Wagon.

67. *SPEUDOCÆNIA SUBOCTONIS* (*SUBOCTONARIA*). — *Corallien* : Tonnerre; Rupt.

68. *STYLINA?* *NANTUACENSIS*. — *Corallien* : Landeyron.

69. *CRYPTOCÆNIA CARANTONIANA* (*CARENTONENSIS*). — *Turonien* : île d'Aix; île Madame.

70. *CRYPTOCÆNIA FLEURIAUSA*. — *Turonien* : île d'Aix; Le Mans.

71. *CRYPTOCÆNIA RUSTICA*. — *Turonien* : Nancras.

72. *APLOSASTREA NEPTUNI*. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

73. *APLOSASTREA ELEGANS*. — *Néocomien* : Fyé; Fontenoy.

74. *OCTOCÆNIA LUGDUNENSIS*. — *Lias* : Saint-Fortunat, près de Lyon.

On doit encore placer parmi les espèces douteuses les fossiles suivants :

75. *S.?* *TCMLARIS*, Edwards et Haime, 1849. — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 27, fig. 3. = Cette espèce appartient très-probablement aux *Stylobelies*. — *Corallien* : Is-sur-Thil; Saint-Mihiel.

76. S.? SUBLEVIS, Edwards et Haime, 1851. — *Madrepora id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 25, fig. 5. — *Corallien* : Wagnon ; Sampigny ; Chatel-Censoir, etc.

77. S.? LEYMERIANA, Edwards et Haime, 1851. — *Madrepora limbata*, Leymerie, *Stat. de l'Aube*, pl. 10, fig. 14. — *Dendrocœnia Corallina*, d'Orbigny, *Prod.* — *Corallien* : Aube.

78. S.? THURMANI, Edwards et Haime, 1851. — *Astrea pentagonalis*, Michelin, pl. 24, fig. 6. — *Stylina arduennensis*, d'Orbigny, *Prod.* — *Corallien* : Dun.

79. S.? SUBLIMBATA, Edwards et Haime, 1851. — *Astrea limbata*, Michelin, pl. 24, fig. 10. — *Cryptocœnia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Corallien* : Sampigny ; Saint-Mihiel ; Wagnon, etc.

80. S.? DEPRAVATA, d'Orbigny, *Prod.* — *Astrea id.*, Michelin, pl. 24, fig. 5. — *Corallien* : Sampigny.

81. S.? CORONATA, Edwards et Haime, 1856. — *Astrea id.*, Quenstedt, pl. 57, fig. 24. — *Corallien* : Mézières.

Nous avons fait rentrer dans l'étage Corallien, la plupart des espèces citées par A. d'Orbigny comme provenant de l'Oxfordien, car de l'aveu de cette auteur lui-même, ces fossiles indiqués comme oxfordiens appartiennent réellement à l'étage Corallien.

Nous devons encore ici faire connaître 4 fossiles qui ont de très-grandes affinités avec les Stylines ; mais pour lesquels M. Etallon a formé le genre *Heliocœnia*. Ces fossiles qui ne diffèrent des Stylines qu'en ce qu'ils possèdent deux cloisons primaires plus grandes que les autres et qui vont s'unir à la columelle au moyen de trabicules, et parce que les intervalles des calices sont souvent granulés, ne nous paraissent pas devoir être séparés du genre qui nous occupe. Ce sont :

82. S.? VARIABILIS. — *Heliocœnia id.*, Etallon, *loc. cit.* = Polypier convexe ; calices serrés ; un peu elliptiques et larges de 1 1/2 mill. ; cloisons assez épaisses ; columelle saillante et un peu aplatie ; côtes représentées par des granulations fines et serrées. — *Corallien* : Valfin.

83. S.? HUMBERTI. — *Heliocœnia id.*, Etallon, *loc. cit.* = Polypier subsphérique ; calices très-serrés, petits, peu saillants, elliptiques et larges de 1 mill. ; cloisons peu débordantes. — *Corallien* : Valfin.

84. S.? DENDROIDEA. — *Heliocœnia id.*, Etallon, *loc. cit.* = Polypier dendroïde formé de 3 à 4 branches ; calices serrés, obliques, peu saillants et larges d'un mill. ; cloisons épaisses et débordantes ; columelle aplatie et saillante ; côtes assez bien indiqués. — *Corallien* : Valfin.

85. S. THIOLLIERI. — *Heliocœnia id.*, Etallon, *loc. cit.* = Polypier branchu et fasciculé, calices serrés, obliques, saillants, profonds, circulaires et larges de 1 mill. ; cloisons inégales et épaisses ; columelle tuberculeuse. — *Corallien* : Valfin.

Ces 4 dernières espèces dépendent du type décaméral, et la dernière présente assez bien les caractères du genre *Psammohelia*.

GENRE CVII. — COLUMNASTRÆA.

Columnastrea, d'Orbigny, *Note sur les Pol. foss.*, 1849. — *Columnellastrea id.*, *Prod.*, 1850.

Columnastræa, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, 1856.

Polypier astréiforme ; polypières unies par le grand développement des côtes ; calices libres et subcirculaires ; cloisons débordantes et larges ; columelle petite et styloïde, une seule couronne de palis.

A. — *Polypier subsphérique.*

1. C. STRIATA, Edwards et Haime, *Ann. des sc.*, 3^e série, t. XII, p. 184, 1850. — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 38, fig. 11. — *Astrea variolaris*, Michelin, *Icon.*, pl. 71, fig. 7. — *Astrea striata id.*, pl. 71, fig. 6. — *Phyllocænia variolaris et Columellastrea striata*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier subsphérique ; côtes simples et granuleuses ; columelle peu saillante ; 3 cycles et les rudiments d'un 4^e ; palis étroits et épais. Diam. des calices, 2 à 2 1/2 millimètres. — Turonien : Corbières ; Gosau ; Figuières ; etc.

AA. — *Polypier fortement lobé ou subrameux.*

2. C. SIMILIS, Edwards et Haime, *Ann. loc. cit.* = Polypier en lobes comprimés ; calices saillants et larges de 3 mill. ; cloisons du 3^e cycle peu développées. — Turonien : Brignoles.

3. C. PREVOSTANA, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier formé de branches comprimées ; côtes fortes, subégales et en arêtes ; cloisons serrées ; les tertiaires bien développées ; palis petits ; columelle peu développée. — Subapennin : Valle-Longa.

GENRE CVIII. — PENTACÆNIA.

Pentacænia, d'Orbigny, *Revue et Mag. de Zool.*, p. 175, 1850.

Pentacænia, E. de Fromentel, *Descript. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 51, 1856.

Polypier polymorphe, calices circulaires, libres et quelquefois subpolygonaux, mais dans quelques cas ils sont rapprochés ; cinq cloisons principales seulement ; côtes visibles, mais rendues rudimentaires par suite du rapprochement des calices ; traverses bien développées et presque horizontales.

1. P. ELEGANTULA, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 51, pl. 7, fig. 6-7, 1856. = Polypier en masse étendue et un peu mamelonnée ; calices peu élevés, entourés de 20 côtes inégales ; 3 cycles de cloisons ; celles des deux derniers cycles peu développées, un rudiment de columelle au centre des calices. — Néocomien : Gyl'Evêque ; Fontenoy.

2. P. TOMBECKI, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 51, 1856. = Polypier mamelonné ; calices rapprochés ; les 5 grandes cloisons paraissent inégales et 3 semblent plus développées, le 2^e cycle est rudimentaire. Diam. des calices, 3 mill. — Néocomien : Saint-Dizier.

Espèces douteuses.

3. P. PULCHELLA, d'Orbigny, *Prodrome*. — Néocomien : Fontenoy.

4. P. MICROTREMA, d'Orbigny, *Prod.* — Néocomien : Fontenoy.

GENRE CIX. — CONVEXASTRÆA.

Convexastræa, d'Orbigny, *Not. sur les Pol. foss.*, p. 9, 1849.

Polypier astréiforme; polypières unis par des côtes bien développées qui s'unissent directement aux cloisons et cachent le bord supérieur de la muraille; les côtes sont rarement confluentes; la columelle manque entièrement et les cloisons ne se rencontrent pas au centre, au moins dans la partie supérieure.

A. — *Polypier massif*. — *Côtes ne s'unissant jamais aux côtes des calices voisins.*

1 C. REGULARIS, d'Orbigny, *Prod.* — *Astrea id.*, Klipstein, *Beitr. zur geol. Kentn.*, pl. 20, fig. 11, 1843. = Polypier convexe; étoiles calicinales très-régulières et larges de 4 mill.; rayons inégaux et cristiformes. — *Saliférien*: Saint-Cassian.

2. C. SEXRADIATA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea id.*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 21, fig. 5. — *Stylina id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Polypier en masse arrondie et mamelonnée; calices superficiels et peu serrés; polypières paraissant courbés et divergents dans une coupe verticale; rayons septo-costaux bien développés et inégaux (12 grands et 12 petits). — *Corallien*: Geingen; Oltingen; Gy: Champlitte; Charcenne (Haute-Saône); Pillemoine (Jura).

A. — *Côtes s'unissant quelquefois aux côtes des calices voisins.*

3. C.? ORNATA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 276, 1856. — *Stylina id.*, *ibid.*, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Cryptocænia id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Étoiles calicinales, larges de 4 mill.; 12 rayons septo-costaux presque égaux, subconfluents et cristiformes. — *Corallien*: Fringeli (Jura).

AA. — *Polypier dendroïde.*

4. C. WALTONI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 23, fig. 5-6, 1851. = Polypier dendroïde et gibbeux; calices inégaux; rayons septo-costaux échinulés sur les côtes et inégaux, ils sont rarement confluent; les calices sont larges de 1 à 1 1/2 mill. — *Bajocien*: Hampton-Cliffs; Rumigny (Ardennes).

5. C. DENDROIDEA. = Polypier formé de rameaux arrondis longs et ayant environ 25 mill. de diam. Ils s'élèvent parallèlement les uns près des autres et constituent un ensemble cespiteux; la surface des rameaux est couverte de plis transversaux, irréguliers, rapprochés de 2 à 3 mill. et qui correspondent aux couches d'accroissement par superposition; les calices sont superficiels et les cloisons très-épaisses; on en compte 12 par calice, 6 grandes qui sont débordantes et assez saillantes et 6 petites; les côtes sont moins grosses que les cloisons et point confluentes. Diam. des étoiles, 1 1/2 à 2 mill. — *Corallien*: Fedry (Haute-Saône).

AAA. — *Polypier de forme indéterminée.*

6. C. PORTLANDICA, E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. Géol. de France*, 2^e série, t. XIII, p. 859, 1856. = Ce fossile, qui n'est connu que par

une empreinte, a probablement une surface subplane; les calices sont très-espacés, larges de 2 mill.; les cloisons sont inégales, 6 grandes et 6 petites; les côtes sont grosses et subconfluentes. — *Portlandien*: Mantoche (Haute-Saône).

GENRE CX. — PHYLLOCÆNIA.

Phyllocænia, Edwards et Haime, *Compt. rend. de l'Acad.*, 1848.

Actinocænia (*pars*), d'Orbigny, *Not. sur les Pol. foss.*, 1849.

Polypier massif, polypières unis par des côtes très-développées; calices à bord libre; ils sont peu saillants et souvent déformés; columelle nulle, point de palis; cloisons larges et débordantes allant jusqu'au centre où elles se rencontrent souvent: traverses abondantes et bien développées.

A. — 5 Cycles cloisonnaires.

1. P. VARIANS, E. de Fromentel, *Descript. des Pol. foss. de l'Etage Néocomien*, p. 48, pl. 6, fig. 9-10, 1857 (les calices de la figure 10 ne montrent pas autant de cloisons qu'il y en a réellement). = Polypier en lame convexe; calices très-rapprochés et de grandeur variable; cloisons fines et inégales, les 6 premières sont plus développées; 5 cycles dans les grands calices. — *Néocomien*: Saint-Dizier.

AA. — 4 Cycles complets.

2. P. PEDICULATA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1849. — *Astrea* id., Deshayes, 1831. — Michelin, pl. 70, fig. 1, 1847. — P. id. et *Actinocænia Dumasiana*, d'Orbigny, *Prod.* — P. Lilli, Reuss, 1854. = Polypier pédonculé; côtes égales descendant sur le pédoncule; calices peu saillants, larges de 6 à 7 mill. — *Thuronien*: Corbière; Gosau, etc.

3. P. DUBIA, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 50, pl. 7, fig. 3-4, 1857. = Polypier en cône renversé, surface calicinale peu convexe; cloisons minces, souvent anastomosées; plateau ondulé et strié; calices inégaux et déformés. — *Néocomien*: Gy-l'Evêque (Yonne).

4. P. NEOCOMIENSIS, d'Orbigny, *Prod.* — E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 49, pl. 7, fig. 5, 1857. = Polypier en lames subplanes; calices écartés, peu comprimés; cloisons fines et peu débordantes; 48 côtes égales et bien marquées. — *Néocomien*: Fontenoy; Gy-l'Evêque (Yonne).

5. P. ARCHIACI, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1849. = Calices écartés et assez réguliers; côtes subégales et granuleuses; cloisons inégales, minces et serrées; muraille peu marquée. — *Falmien*: Gaas.

AA. — 3 Cycles et des cloisons d'un 4°. — Calices larges de 6 à 10 millimètres.

6. P. IRRADIANS, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, 1849. — *Astrea radiata*, Michelin, *Icon.*, pl. 12, fig. 4. = Polypier convexe; polypières divergents; calices saillants et larges de 6 à 10 mill.: cloisons épaisses en dehors et inégales; côtes peu serrées. — *Parisien*: Castel-Gomberto; Chaîne d'Hala.

7. P. IRREGULARIS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1849. — *Lithodendron irregulare*, Michelin, pl. 43, fig. 14, 1844 (mauvaise figure).

== Calices entourés par un cœnenchyme couvert de côtes assez écartées, il sont subpolygonaux et assez élevés; cloisons inégales, peu débordantes et très-minces. Diam. des grands calices, 8 mill. — *Parisien* : Auvert; Valmondois; Senlis; Vernon, etc.

AA. — *Calices larges de 3 à 6 millimètres.*

8. P. COMPRESSA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Michelin, pl. 70, fig. 2. — *Actinocœnia id.*, d'Orbigny, *Prod.* == Polypier convexe; calices inégaux, saillants, irréguliers, larges de 3, 5 ou 6 mill.; les calices de 3 mill. sont nombreux; cloisons minces, serrées et inégales; côtes droites et serrées. — *Turonien* : Soulage (Corbières).

9. P. LUCASANA, Edwards et Haime, *Hist. nat., des coral.*, 1856. == Polypier convexe, ne différant du *P. irradians* que par la largeur de ses calices qui n'ont que 4 mill. de largeur. — *Parisien* : Castel-Gomberto.

10. P.? SCULPTA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1849. — *Astrea sculpta et sparsa*, Michelin, pl. 71, fig. 1 et 3. — *Cryptocœnia sparsa et Phyllocœnia sculpta*, d'Orbigny, *Prod.* == Polypier à surface convexe, calices écartés, saillants et larges de 3 millim; côtes fines, serrées, flexueuses, inégales et au nombre de 32. — *Turonien* : Martigues.

11. P. COTTEAU, E. de Fromentel, *Descript. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 49, pl. 7, fig. 1-2. — *P. Cottaldina*, d'Orbigny, *Prod.* == Polypier hémisphérique; calices ronds, égaux, peu ou point déformés; cloisons débordantes; 8 primaires allant jusqu'au centre, auxquelles viennent se souder 16 cloisons secondaires, en tout 32 cloisons; côtes bien marquées. — *Néocomien* : Gy-l'Evêque; Leugny; Fontenoy, etc.

Ces deux dernières espèces dépendent du type octoméral.

Espèces douteuses :

12. P.? VALLIS-CLAUDE, d'Orbigny, *Prod.* — *Astrea id.*, Michelin, pl. 5, fig. 7. — *Turonien* : Uchaux.

13. P.? DOUBLIERI, d'Orbigny, *Prod.* — *Astrea id.*, Michelin, pl. 71, fig. 2. — *Turonien* : Les Martigues.

14. P.? DECUSSATA, Reuss, *Denksch. der Wien. acad.*, etc, 1851, t.VII, p. 99, pl. 13, fig. 2-3. — *Turonien* : Gosau.

15. P.? REGULARIS, d'Orbigny, *Prod.* t. II, p. 206. — *Turonien* : Soulage.

16. P. CORBARICA, id., id., id.

17. P. GLOMERATA, id., id., id.

18. P.? INTERMEDIA, id. id. — *Turonien* : Uchaux; Soulage

19. P.? MARTICENSIS, id., id. — *Turonien* : Martigues.

20. P.? ICAUNENSIS, id. id. — *Néocomien* : Chenay (Yonne)

21. P.? OCEANI, id. id. — *Calcaire pisolitique* : La Falaise.

22. P.? NEPTUNI, id., id., id., id.

23. P.? RENAUXI. — *Cryptocœnia Renauxiana*, id., id. — *Turonien* : Uchaux.

GENRE CXI. — CRYPTOCCENIA.

Cryptocœnia (pars), d'Orbigny, *Cours élément. de Pal.*, t. II, p. 164, 1856.

Stylina (pars), Edwards et Haime. — *Cyathophora* (pars), id. *Ann. des sc. nat., loc. cit.* 1849.

Polypier massif et polymorphe; calices ronds, plus ou moins saillants; muraille régulièrement circulaire à bord saillant; cloisons bien développées et atteignant presque le centre du calice; côtes bien marquées et souvent confluentes; columelle nulle; point de palis; traverses bien développées et horizontales.

Ce genre ne diffère réellement du genre *Stylina* que par l'absence de la columelle.

Lorsque A. d'Orbigny créa le genre *Cryptocœnia* il y fit rentrer toutes les stylines chez lesquelles il n'apercevait pas de columelle, sans trop s'occuper si cet organe avait ou non existé, ou si son absence était le résultat d'un accident ou de la composition organique de l'animal. MM. Milne-Edwards et J. Haime, en étudiant les espèces qui composent le genre *Stylina* reconnurent que la plupart des cryptocœnies de A. d'Orbigny étaient pourvues de columelle, et jugèrent par analogie que toutes devaient en avoir. Cependant en 1851, ils rencontrèrent des Stylines sans columelle, et ne voulant pas rétablir le genre de *Cryptocœnia* qu'ils avaient détruit et ne pouvant en créer un nouveau, ils furent contraints d'associer ces nouvelles espèces au *Cyathophora Richardi* de M. Michelin, dont tout d'abord ils avaient fait une styline et de rétablir ainsi le genre *Cyathophora*.

Or le fossile décrit par M. Michelin, non seulement ne présente pas les caractères des stylines; mais il n'appartient même pas au sous-ordre des Zoanthaires Apores. En effet le *Cyathophora Richardi* possède des planchers bien développés et complets, ce qui le fait rentrer dans le sous-ordre des Zoanthaires Tabulés; de plus tandis que les cyathophores de MM. Milne-Edwards et Haime ont des cloisons bien développées et pas de planchers proprement dits, le *Cyathophora Richardi*, qui nous sert de type, a des planchers horizontaux bien développés et des cloisons rudimentaires représentées par des stries longitudinales.

Nous croyons donc qu'il faut faire rentrer le genre *Cyathophora* de M. Michelin dans le sous-ordre des Zoanthaires Tabulés en ne le composant que de polypiers ayant des planchers bien développés et des cloisons rudimentaires et nous rétablissons le genre *Cryptocœnia* de A. d'Orbigny pour les fossiles semblables qui ont des traverses lamelleuses et des cloisons bien développées.

A. Type hexaméral. — b. 3 Cycles.

1. C. CLAUDIENSIS. — *Cyathophora id.*, Etallon, *Et. pal. sur le Haut-Jura.* == Polypier en masse convexe; calices serrés et peu saillants, larges de 5 mill.; côtes inégales; cloisons assez épaisses, inégales et

bien développées; traverses lamelleuses fortes et simulant des planchers. — *Corallien* : Valfin.

2. C. *NEOCOMIENSIS*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Stylina?* *id.*, Edwards et Haime, 1851. — *Cyathophora*, E. de Fromentel, *Desc. des Pol. foss. de l'Étage Néocomien*, pl. 5, fig. 11-12, 1856. = Polypier en lame convexe; cloisons fortes et débordantes, les 2 derniers cycles peu développés. Largeur des calices, 3 mill. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

3. C. ? *ANTIQUA*, d'Orbigny, *Prod.* — *Stylina id.*, Edwards et Haime, 1851. — *Cyathophora id.*, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 42, 1856. = Polypier en lames étendues et ondulées; traverses bien développées; côtes fortes et subégales; cloisons peu larges. Diam. des calices, 2 à 2 1/2 mill. — *Néocomien* : Saint-Dizier; Fontenoy; Venoy; Cheney.

A. — b. b. *Deux Cycles.*

4. C. *PRATTI*. — *Cyathophora id.*, Edwards et Haime, *Brit. foss. coral.*, p. 108, pl. 21, fig. 3, 1851. = Polypier en masse convexe; calices assez rapprochés et larges de 5 mill.; côtes fortes et inégales; cloisons bien développées. — *Bajocien* : Comb Down; Rumigny.

5. C. *ICAUNENSIS*, d'Orbigny, *Prod.*, 1851. — *Stylina id.*, Edwards et Haime, 1851. — *Cyathophora id.*, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 41, 1856. = Polypier convexe; calices rapprochés, larges de 3 à 3 1/2 millim.; cloisons primaires bien développées, les secondaires restant petites. — *Néocomien* : Gy-l'Évêque; Cheney; Fontenoy; Lignerolles.

6. C. *LUCENSIS*. — *Cyathophora id.*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, p. 107, pl. 30, fig. 5, 1851. = Polypier convexe; calices ronds, assez rapprochés; cloisons primaires bien développées, les secondaires plus petites; côtes peu marquées. Diam. des calices, un peu moins de 3 mill. — *Bajocien* : Pound-Hill; Marquises.

AA. — *Type octoméral.* — c. 3 Cycles.

7. C. *BREVIS*. = Polypier en masse mamelonnée; calices peu élevés, circulaires et séparés par des côtes bien développées; 8 grandes cloisons, 8 petites et 16 rudimentaires. Diam. des calices, presque 2 millim. — *Corallien* : Charcenne; Champlitte; Chatel-Censoir.

AA. — c. c. 2 Cycles.

8. C. *ARCENSIS*. = Polypier en petite masse arrondie; calices ronds, peu élevés et assez creux; côtes bien développées; 16 cloisons alternativement grandes et petites, correspondant à des côtes un peu inégales. Diam. des calices, 1 mill. — *Kimméridgien* : Arc, près de Gray (Haute-Saône).

GENRE CXII. — HOLOCÆNIA.

Holocænia, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, p. 99. 1851.

Holocænia, E. de Fromentel, *Bull. de la soc. Géolog. de France*, 2^e série, t. XIII, p. 858, 1856. — *Descrip. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 52, 1856.

Polypier polymorphe; calices unis entre eux par des rayons septo-costaux à bord entier et qui cachent complètement les murailles; columelle bien développée et styliforme; calices épars, sans ordre, à la surface du polypier.

A. — *Type hexaméral*. — b. 3 Cycles et des cloisons d'un 4°.

1. H. DENDROIDEA, E. de Fromentel, *Bull. de la soc. Géolog., loc. cit.*, p. 858, 1856. = Polypier formant des rameaux serrés et larges de 20 à 25 mill.; calices rapprochés, un peu saillants, larges de 3 millim. On compte environ 27 ou 28 cloisons par calice; les côtes sont subégales et un peu flexueuses. — *Portlandien*: Beaujeu (Haute-Saône).

A. — b. b. 3 Cycles seulement.

2. H. EXPLANATA, E. de Fromentel, *loc. cit.* = Polypier en lame mince et étendue; calices peu profonds et peu saillants; columelle petite, les cloisons des deux premiers cycles égales. Diam. des calices, 3 mill. — *Portlandien*: Mantoche.

3. H. MICRANTHA, Edwards et Haime, 1851-1856. — E. de Fromentel, 1857. — *Astrea id.*, Römer, 1848. — *Synostrea id.*, d'Orbigny, 1850. — *Thamnastrea id.*, Edwards et Haime, 1850. = Polypier gibbeux; cloisons fortes, serrées, peu flexueuses, et inégales; le 3^e cycle manque dans 2 des systèmes. Diam. des calices, 1 à 1 1/2 mill. (Cette espèce appartient peut-être au type décaméral et doit être très-voisine de notre *H. Collinaria*). — *Néocomien*: Berklinger (Yonne).

4. H. ARACHNOIDES, E. de Fromentel, *loc. cit.* p. 858, 1856. = Polypier en lames minces et dirigées en tous sens; calices profonds et larges de plus de 3 mill.; columelle petite et saillante; rayons septo-costaux tous dirigés dans le même sens et subégaux; le 3^e cycle est souvent incomplet. — *Portlandien*: Mantoche.

AA. — *Type décaméral*. — c. 2 Cycles.

5. H. COLLINARIA, E. de Fromentel, *Descrip. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 54, pl. 7, fig. 9-10, 1857. — *Centrastrea collinaria*, *microphyllia* et *excavata*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Thamnastrea id.*, *id.*, *id.*, Edwards et Haime, 1851. = Polypier en frondes couvertes ou non de petits mamelons; calices petits et rapprochés; columelle forte et styloïde; 10 grandes cloisons, 10 petites; épithèque bien développée. — *Néocomien*: Gy-l'Evêque; Fontenoy; Cheney; Venoy; Leugney (Yonne).

GENRE CXIII. — DIMORPHOCÆNIA.

Dimorphocœnia, E. de Fromentel, *Descript. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 55, 1857.

Polypier étalé; murailles entièrement cachées par des rayons septo-costaux confluent et rayonnant du centre à la circonférence; columelle nulle; espace columellaire creux et allongé; calices disposés en rangées concentriques autour d'un calice central plus développé que les autres.

1. D. CRASSISEPTA, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 55, pl. 8, fig. 1. — *Dimorphastrea id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1851. = Polypier étalé en lame assez mince; calices superficiels à fossette profonde et oblongue; cloisons épaisses, s'amincissant au centre et se terminant par un bord perpendiculaire; traverses peu développées. On compte de 12 à 32 cloisons par calice; les rangées sont distantes d'environ 15 à 25 mill. — *Néocomien*: Gy-l'Evêque; Fontenoy; Cheney; Venoy.

2. D.? CORALLINA, Etallon, *Etudes Pal. sur le Haut-Jura.* == Polypier en cône renversé; surface calicinale subplane; cloisons très-épaisses, on en compte 16 dans le calice central et 4 seulement dans les autres. Diam. du calice central 8 mill.; des petits environ 5; épithèque bien développée. — *Corallien* : Valfin.

Ce dernier fossile ne présente pas des rayons septo-costaux bien confluents et le nombre de ses cloisons primaires pourrait bien le faire rentrer dans le sous-ordre des ZOANTHAIRÉS RUGUEUX.

GENRE CXIV. — PLEUROSTYLINA.

Pleurostylina, E. de Fromentel, *Bull. de la soc. Géol. de France*, loc. cit., p. 854, 1856 (sans description).

Polypier en masse convexe ou en lames étendues; calices circulaires, devenant quelquefois subpolygonaux par suite du resserrement des individus; polypiérites réunis entre eux par l'épithèque qui couvre les murailles, ou par les murailles elles-mêmes; cloisons entières, peu développées, à l'exception d'une grande cloison, plus forte que les autres, qui s'avance jusqu'au centre du calice et s'y renfle considérablement de manière à simuler une columelle; plateau commun nu et costulé ou ne présentant qu'une épithèque peu développée.

1. P. CORALLINA. == Polypier massif et mamelonné; polypiérites soudés par l'épithèque qui recouvre la muraille, et laissant entre ces dernières un sillon bien prononcé; calices subcirculaires; 6 grandes cloisons entières et assez épaisses; l'une d'elles allant en se renflant jusqu'au centre où elle tient lieu de columelle; les cloisons voisines de la cloison columellaire s'infléchissent un peu vers celle-ci. Diam. des calices, 5 mill. — *Corallien* : Ecuelle (Haute-Saône).

2. P. FRONDESCENS. == Polypier en lame étendue et assez mince; plateau nu et couvert de grosses côtes cristiformes; calices subpolygonaux placés assez régulièrement en quinconce, inclinés, et présentant les caractères de l'espèce précédente. Diam. des calices, 4 mill. Les calices semblent ici être soudés directement par les murailles bien développées. — *Corallien* : Chatel-Censoir (Yonne).

GENRE CXV. — APOCÆNIA.

Apocœnia, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 281, 1856.

Polypier astréiforme; polypiérites soudés par les murailles qui sont prismatiques; calices polygonaux; cloisons bien développées et entières; point de palis; point de columelle; loges interseptales très-superficielles.

A. YEROFEYEWI, Edwards et Haime, loc. cit., pl. D, 3, fig. 1, 1856. == Polypier mince et convexe; sept systèmes inégaux; calices larges de 7 à 9 mill.; murailles en zig-zag. — *Parisien* : Chambre d'Amour, près Biaritz.

GENRE CXVI. — STEPHANOCÆNIA.

Stephanocænia, Edwards et Haime, *Compt. rend. de l'acad.*, 1848.
Goniarcæa, d'Orbigny, *Prod.*, 1850.

Polypier astréiforme ; polypiérites unis par les murailles qui sont épaisses et compactes ; calices polygonaux à bords simples ; columelle styliforme faiblement saillante, mais bien développée ; un ou plusieurs cycles de palis, suivant le développement des cloisons. Ce genre renferme des espèces appartenant aux types hexaméral et octoméral.

A. — *Type hexaméral.* — a. 3 Cycles.

1. S. FORMOSISSIMA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851.
 — *Astrea id.*, Sowerby, 1832. — *Porites aculeata*, Michelotti, pl. 6, fig. 1.
 — *Astrea reticulata*, Michelin, pl. 5, fig. 1. — *Stephanocænia formosa*, Edwards et Haime, 1849. == Polypier convexe ou gibbeux ; columelle grosse et comprimée ; murailles simples ; 3 cycles complets. Diam. des calices, 3 mill. — *Turonien* : Gosau ; Uchaux ; Corbières.

2. S. TROCHIFORMIS, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 267, 1856. — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 27, fig. 6. == Polypier convexe et pédonculé ; le 3^e cycle peu développé. Diam. des calices, 1 1/2 mill. — *Corallien* : Saint-Mihiel ; Ecuelle (Haute-Saône), etc.

A. — aa. 2 Cycles.

3. S. HAIMEI, d'Archiac, *Mém. de la soc. Géol.*, 2^e série. t. III, pl. 8, fig. 8, 1850. == Polypier court, encroutant ; calices peu profonds ; columelle grosse et peu saillante ; une couronne de palis. Diam. des calices, 2 mill. — *Parisien* : Biaritz.

B. — *Type octoméral.*

4. S. DEPORTESANA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 267, 1856. — *Astrea Deportesiana*, Michelin, *Icon.*, pl. 50, fig. 11, 1845. == Polypier convexe ; calices subcirculaires à bords distincts ; columelle petite ; 2 cycles inégaux. Diam. des calices, 2 mill. ; palis cylindriques. — *Cenomanien* : Le Mans.

5. S. FORMOSA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 38, fig. 9. == Polypier convexe, calices polygonaux, séparés par de faibles sillons ; columelle petite ; 2 cycles inégaux ; 6 palis arrondis. Diam. des calices, 2 mill. — *Turonien* : Gosau.

6. S.? ELEGANS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.* 1849. — *Porites elegans*, Leymerie, *Mém. de la soc. Géol.*, 1836. — *Alveopora elegans*, Michelin, *Icon.*, pl. 63, fig. 6. == Columelle grosse et saillante ; calices polygonaux, larges de 4 mill. ; 2 cycles ; palis indistincts. — *Parisien* : Couiza ; Coustouge ; Fabresan.

Espèces douteuses.

7. S. BERNARDINA, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Bajocien* : Nantua ; Langres ; Morey (Haute-Saône).

8. S.? ALPINA, d'Orbigny, *Prod.*, — *Parisien* : Tandon (Hautes-Alpes).

9. S.? INTERMEDIA, *id.*, *id.* — Corallien : La Rochelle.
10. S.? CONIACENSIS, *id.*, *id.* — Turonien : Cognac.
11. S.? GRANDIPORA, *id.*, *id.* — Turonien : île d'Aix.
12. S.? CARANTONENSIS, *id.*, *id.* — Turonien : île d'Aix.
13. S.? LITTORALIS, *id.*, *id.* — Turonien : île d'Aix.
14. S.? FLEURIAUSA, *id.*, *id.* — Turonien : île d'Aix.
15. S.? EXCAVATA, *id.*, *id.* — Turonien : Uchaux.
16. S.? IRREGULARIS, *id.*, *id.* — Turonien : Soulage.
17. S.? FLORIDA, *id.*, *id.* — Corallien : Wagnon.
18. S.? SINEMURIENSIS, *id.*, *id.* — Sinemurien : Arcenay (Côte-d'Or).

Nous avons eu à étudier trois fossiles de l'étage Néocomien inférieur que A. d'Orbigny a déterminés et qu'il a placés dans le genre *Stephanocænia* : nous y avons en vain cherché des palis ; ces trois fossiles sont des Astrocœnies bien caractérisées.

M. Etallon a créé pour une espèce fossile du Corallien du Haut-Jura le genre *Allocænia* qui ne se distinguerait des Stephanocœnies, que par la présence d'une seule couronne de palis. Mais comme ces dernières, alors qu'elles n'ont que deux cycles ne possèdent qu'une seule couronne de palis et qu'il serait par conséquent impossible de distinguer les espèces qui appartiendraient à l'un ou l'autre genre, nous pensons qu'on ne peut sur ce seul caractère établir un genre nouveau et nous faisons rentrer dans les Stephanocœnies le fossile de M. Etallon.

19. S. FURCATA. — *Allocænia id.*, Etallon, *loc. cit.* = Polypier digitiforme ou très-mamelonné ; calices serrés et polygonaux ; columelle forte et saillante ; palis épais ; 3 cycles complets (type hexaméral). Diam. des calices, 1 mill. — Corallien : Valfin.

Cette espèce n'est peut-être qu'une variété du *S. trochiformis*.

GENRE CXVII. — STYLOCÆNIA.

Stylocænia, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, *loc. cit.*, p. 469, 1848.

Astrea (pars), Lamarck, 1816.

Stylophora (pars), Schweigger, 1819.

Cellastrea (pars), Blainville, 1830.

Aplosastrea (pars), d'Orbigny, 1849.

Polypier constitué par une lame assez épaisse et généralement repliée sur elle-même ; plateau commun recouvert d'une épithèque plissée ; polypières unies par les murailles qui sont polygonales et qui portent aux angles des calices de petites colonnes saillantes et cannelées ; columelle forte et styloforme ; cloisons minces et nombreuses ; traverses simples et peu écartées.

Ce genre renferme des espèces qui appartiennent aux types pentaméral et octoméral.

A. — *Type pentaméral.* — a. 3 Cycles.

1. S. LAPEYROUSEANA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 295, 1849. — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 70, fig. 5. == Polypier en cône saillant, supporté par un pédoncule; bords des calices minces; colonnes épaisses; cloisons peu serrées, inégales et minces. Diam. des calices, 4 mill. — *Turonien*: Bains de Rennes.

2. S. VICARYI, Edwards et Haime, *Mém. de la sc. Géol.*, 1852. == Polypier hémisphérique; colonnes murales peu développées; columelle forte et cylindrique; cloisons inégales. Diagonale des calices, 1 1/2 mill. — *Parisien*: La Palarea; Sinde.

A. — aa. 2 Cycles.

3. S. MONTICULARIA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Brit. foss. coral.*, pl. 5, fig. 2. — *Stylophora id.*, Schweigger, 1819. — *Astrea hystrix*, De France, 1826, *id.* — Michelin, *Icon.*, pl. 45 fig. 1. == Polypier subcylindrique ou gibbeux; colonnes fortes et très-cannelées; columelle un peu comprimée. Diagonale des calices, 1 1/2 mill. — *Parisien*: Paris; Bracklesham-Bay.

4. S. TAURINENSIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 13, fig. 3. == Polypier gibbeux; colonnes rares et petites; bords calicinaux, minces et crénelés; columelle un peu comprimée. Diagonale des calices, 2 mill. — *Falunien*: Rivalba.

B. — *Type octoméral.*

5. S. EMARCIATA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Brit. foss. corals.*, pl. 5, fig. 1. — *Astrea id.*, Lamarck, 1816. — Lamouroux, 1824. — De France, 1826. — *Astrea stylophora*, Goldfuss, pl. 24, fig. 4. — *Astrea emarciata* Michelin, pl. 44, fig. 6. — *A. cylindrica id.*, pl. 44, fig. 4. — *A. decorata id.*, pl. 44, fig. 8. — *Aplosastra stylophora*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. == Polypier subgibbeux ou rameux, formé d'une lame repliée sur elle-même; calices sur toute la surface du polypier; cavité interne tapissée par une forte épithèque; colonnes bien développées et cannelées; cloisons minces, formant deux cycles. Diagonale des calices, 2 1/2 mill. — *Parisien*: Paris; La Palarea; Bracklesham-Bay; Sinde.

Le TRIPHYLLOCÆNIA EXCAVATA, de A. d'Orbigny, paraît devoir appartenir à l'espèce précédente.

6. S. LOBATO-ROTUNDATA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat. loc. cit.* — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 13, fig. 2. — Polypier formé de lobes dressés et gibbeux; colonnes petites et rares; bords calinaux, minces et crénelés; columelle petite; 2 cycles inégaux. Diagonale des calices, 2 mill. — *Falunien*: Rivalba; Vérone; Dego.

XXV^e Famille. — *Astréens.*

ASTREACÉES (*pars*), Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, p. 454, 1856.

Polyastrées ayant les cloisons dentées et se multipliant toujours par gemmation latérale ou submarginale, mais jamais par bourgeonnement basilaire ou par fissiparité; chambres viscérales divisées par des traverses lamellaires.

GENRE CXVIII. — PLESIASTRÆA.

Plesiastrea, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, *loc. cit.*, p. 494, 1848.

Astrea (pars), Lamarck, 1816. — *Orbicella (pars)*, Dana, 1846.

Polypier en masse convexe et arrondie ; plateau nu et costulé ; calices libres par leur bord, peu profonds et circulaires ; côtes bien développées ; cloisons débordantes, larges et finement denticulées ; palis bien développés devant tous les cycles qui précèdent le dernier.

P. DESMOULINSI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, p. 100, 1851. = Polypier subplane ; calices peu saillants, larges de 3 à 4 mill. ; côtes peu saillantes et finement granulées ; 3 cycles de cloisons peu dentées et très-granulées ; columelle papilleuse. — *Falunien* : Saucats.

GENRE CXIX. — SOLENASTRÆA.

Solenastrea, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, *loc. cit.*, p. 494, 1848.

Astrea (pars), Michelin, *Icon.*, 1847.

Polypier en masse convexe ; polypiérites longs et unis par l'exothèque qui est bien développée ; côtes petites et ne se soudant pas aux côtes correspondantes ; calices libres et circulaires ; columelle spongieuse et peu développée ; cloisons minces, larges et bien dentées ; traverses abondantes.

A. — *Trois cycles complets.*

1. S. GIBBOSA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.*, 1850. = Polypier à surface gibbeuse ; calices peu saillants, peu profonds et larges de 2 mill. ; traverses exothécales distantes de $\frac{1}{3}$ mill. — Cette espèce habite la mer Rouge et est fossile des dépôts récents de l'Egypte.

2. S. VERHELSTI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, p. 101, 1851. = Polypier subplane, très-fragile ; calices rapprochés à murailles minces ; cloisons inégales et granulées ; traverses exothécales distantes de $\frac{2}{3}$ mill. Diam. des calices, 2 mill. — *Parisien* : Fort Saint-Pierre, à Gand.

3. S. TURONENSIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 75, fig. 1-2. = Cette espèce diffère des précédentes par une columelle beaucoup plus développée et des traverses exothécales distantes de plus d'un mill. — *Falunien* : Turin, Touraine.

B. — *Plus de trois cycles.*

4. S. TENCILLAMELLOSA, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier convexe ; calices circulaires peu élevés et larges de 3 à 4 mill. ; 3 cycles et des cloisons d'un 4^e ; traverses exothécales distantes d'un mill. et demi. — Fossile de.....?

GENRE — CXX. HELIASTRÆA.

Heliastrea, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, p. 456, 1856.

Favia (pars), Oken, 1815. — *Astrea* (pars), Lamarck, 1816. — Edwards et Haime, 1848. — *Tubastrée* (pars), Blainville, 1830. — *Explanaria*, Ehrenberg, 1834. — *Orbicella* (pars), Dana, 1846.

Polypier en masse convexe ou subplane; épithèque bien développée; gemmation intercalicalinale; calices ronds, circulaires, assez élevés, à fossette peu profonde; columelle spongieuse, généralement bien développée; côtes fortes, unissant les polypières et composées de lames fenestrées; cloisons débordantes, larges et bien denticulées, surtout près de la columelle, où les dents simulent des palis; traverses abondantes.

A. — Plus de 4 cycles cloisonnaires.

1. H. BEAUDOUINI, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 469, 1856. — *Astrea id.*, J. Haime, *Bull. de la Soc. Géol.*, 2^e série, t. VII, p. 679, 1850. = Polypier subconvexe; calices peu serrés et peu saillants, larges de 8 à 10 mill.; columelle forte; cloisons et côtes inégales, ou en compte 60 par calice. — Parisien : La Palarea.

2. H. RIEMSDYCKI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea arachnoides*, Goldfuss, pl. 23, fig. 9. — *Phyllocenia id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Calices égaux, écartés, larges de 3 à 4 mill.; columelle forte; côtes fines, égales, au nombre de 60 à 70. — Sémonien : Maestricht.

3. H. BARANDEI, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 478, 1856. — *Astrea macrocona*, Reuss, pl. 24, fig. 2, 1846. — *Phyllocenia id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Calices assez écartés, larges de 10 à 15 mill.; columelle peu développée; environ 50 cloisons fortes et peu inégales. — Sémonien : Kutschlin, près Bilin.

B. — 4 Cycles seulement.

4. H. CRIBRARIA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 461, 1856. *Astrea varians et cribraria*, Michelin, *Icon.*, pl. 5, fig. 8 et 4. — *A. perforata id.*, pl. 72, fig. 5. — *A. grandis id.*, pl. 6, fig. 3. = Polypier subconvexe; calices écartés, subcirculaires, larges de 8 à 10 mill.; cloisons inégales, minces et serrées; côtes subégales et subflexueuses; columelle peu développée. — Turonien : Uchaux; Corbières, etc.

5. H. COROLLARIS, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 459. — *Astrea id.*, Reuss, pl. 9, fig. 7-8, 1854. = Polypier subsphérique; côtes égales et fortes; calices écartés, saillants et larges de 5 à 6 mill.; cloisons minces et inégales. — Turonien : Gosau.

C. — Plus de 3 cycles.

c. — Le diamètre des calices étant au moins d'un centimètre.

6. H. GUETTARDI, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Defrance, 1826. — Michelin, *Icon.*, pl. 12, fig. 3. = Polypier subconvexe; côtes

inégaux et fortes; calices larges d'un mill. et séparés par des sillons polygonaux; les 3 premiers cycles égaux, les cloisons du 4^e courbées vers les tertiaires; columelle bien développée et papilleuse. — *Falunien*: Turin; Bordeaux; Dego, etc.

7. H. ROCHETTEI. — *H. Rochetteana*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea Rochettina*, Michelin, pl. 12, fig. 2. == Calices assez serrés larges de 15 à 20 mill.; cloisons serrées, minces en dedans, épaisses en dehors; columelle bien développée; côtes serrées et peu inégales. — *Falunien*: Bordeaux; Turin.

8. H. FRANCONA, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 463. == Calices larges de 10 mill., peu élevés et écartés; 40 cloisons fortes et bien dentelées, — *Sénonien*: Maestricht.

C. — cc. *Le diamètre des calices étant d'environ 8 millimètres.*

9. H. LIFOLENSIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea lifoliana*, Michelin, pl. 24, fig. 1. — *Parastrea id.*, d'Orbigny, *Prod.* == Côtes subégales; calices peu écartés et larges de 8 à 9 mill.; cloisons inégales. — *Corallien*: Lifol.

C. — ccc. *Le diamètre des calices étant de 6 à 7 millimètres.*

10. H. LEVICOSTATA. == Polypier en masse convexe; calices peu profonds, circulaires et assez éloignés; côtes égales arrondies, lisses, confluentes et séparées par des sillons étroits et profonds; 30 cloisons alternativement grandes et petites; columelle assez développée et spongieuse; les calices sont peu élevés et séparés par des dépressions qui affectent une forme polygonale. Diam. des calices, 6 à 7 millim. — *Corallien*: Charcenne (Haute-Saône).

11. H. DEFRANCEI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 465. — *Sarcinula acropora et plana*, Michelotti, 1838. — *Astrea argus*, Michelin, pl. 12, fig. 6. — *Id.*, *Acropora*, d'Orbigny, *Prod.*, 1852. == Polypier subplane; calices inégalement rapprochés, et assez souvent déformés; côtes serrées et inégales; environ 30 cloisons minces, inégales et trouées. Diam. des calices, 6 mill. — *Falunien*: Turin; Dego, etc.

12. H. VESICULOSA, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 466. — *Astrea id.* — *Ibid.*, *Ann. des sc. nat.*, p. 407, 1850. == Cette espèce diffère du *H. Defrancei* par des murailles indistinctes et par son endothèque vésiculeux. Peut-être n'est-elle qu'une variété de la précédente. — *Falunien*: Dax.

C. — cccc. *Calices larges de 3 à 6 millimètres.*

13. H. SIMONYI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 467. — *Astrea id.*, Reuss, 1854. == Polypier convexe; côtes inégales et serrées; calices peu saillants, serrés, quelquefois déformés et larges de 4 à 7 mill; 36 à 48 cloisons inégales, minces et droites; les 6 primaires sont un peu plus développées que les autres. — *Turonien*: Gosau.

14. H. NEOCOMIENSIS, E. de Fromentel, *Descr. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 56, pl. 8, fig. 2, 1857. == Polypier en masse arrondie; columelle peu développée, mais distincte; 32 cloisons alternativement inégales; calices peu serrés et larges de 3 à 7 mill. — *Néocomien*: Gyl'Evêque.

15. H. CORALLINA. == Polypier convexe; côtes égales, arrondies et

lisses ; calices peu saillants, assez serrés et larges de 5 mill. : de 24 à 26 cloisons, inégales et bien développées. — *Corallien* : Charcenne.

16. H. ? *VESPARIA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Michelin, pl. 5, fig. 5. — *Prionastrea id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier convexe ; côtes serrées, subflexueuses et subégales ; calices serrés et peu saillants ; le 4^e cycle manque dans la moitié de chaque système. Diam. des calices, 3 à 4 mill. — *Turonien* : Uchaux.

C. ccccc. Calices larges de 2 à 3 millimètres.

17. H. *ELLISI*. — *H. Ellisana*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea Ellisiana*, DeFrance, 1826. — *Sarcinula astroites*, Golfuss, pl. 24, fig. 12. — *S. auleticon id.*, pl. 25, fig. 2. — *Astrea astroites et thyrsoformis*, Michelin, pl. 12, fig. 2 et pl. 12, fig. 6. = Polypier subplane ou lobé ; calices circulaires, larges de 2 1/2 à 3 mill. ; environ 30 cloisons inégales. — *Falunien* : Dax ; Turin ; île de Crète ; Moravie ; Linnich, près Iulich.

18. H. *EDWARDSI*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Ulastrea id.*, Reuss, 1854. = Polyp. convexe ; côtes petites et égales ; calices inégaux, serrés, peu saillants ; columelle bien développée ; cloisons minces et inégales. — *Turonien* : Gosau.

19. H. *PLANA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Michelin, pl. 12, fig. 7. = Cette espèce paraît différer du H. *Ellisi* par des cloisons plus minces ; 3 cycles et des cloisons d'un 4^e dans 2 des systèmes (30 cloisons). — *Falunien* : Turin.

20. H. *LEPIDA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Reuss, 1854, p. 467. = Polypier convexe ; côtes inégales, flexueuses, séparées par de larges sillons ; calices peu saillants et écartés ; de 36 à 40 cloisons larges, minces et peu inégales. — *Turonien* : Gosau.

D. — Trois cycles complets. — d. Calices larges de 4 à 6 mill.

21. H. ? *TERMINARIA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Michelin, pl. 5, fig. 2. = Polypier convexe ; calices écartés et larges de 4 à 5 mill., de 24 à 30 côtes subégales et peu saillantes. — *Turonien* : Uchaux.

22. H. *PUTEALIS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Michelin, pl. 5, fig. 3. — *Astrea favosa*, pl. 6, fig. 6. = Polypier subconvexe ; columelle petite ; calices peu serrés et larges de 4 mill. — *Turonien* : Uchaux ; Martigues.

23. H. *SULCATI-LAMELLOSA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea sulcata-lamellosa et Renauxii*, Michelin, *Icon.*, pl. 5, fig. 6 et pl. 5, fig. 9. = Polypier convexe ; côtes bien développées ; columelle petite ; 3 cycles complets. Largeur des calices, 6 mill. — *Turonien* : Uchaux.

D. — dd. Calices larges de 2 à 3 millimètres.

23. H. *REUSSI*. — *H. Reussana*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Explanaria astroites*, Reuss, 1848. = Polypier gibbeux ; calices rapprochés, larges de 2 1/2 à 3 mill. ; columelle rudimentaire. — *Falunien* : Budersdorf ; Grinzing et Gainfahren ; Moravie.

24. H. *RAULINI*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier subplane ; calices très-écartés et larges de moins de 2 mill. ; columelle bien développée ; cloisons minces et inégales. — *Falunien* : Leognan.

Les *Explanaria crassa et tenera* de Reuss ne paraissent être que des variétés de cette espèce.

25. H. PREVOSTI. — *H. Prevostana*, Edwards et Haime, *loc. cit.* == Cette espèce diffère de *H. Raulini* par des calices plus rapprochés, des côtes moins développées et des calices un peu plus larges; les cloisons sont aussi plus serrées et larges. — *Falunien*: Malte.

26. H. ROTULA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 24, fig. 1. == Polypier subplane; calices larges de 2 mill. et égaux; columelle forte; cloisons minces et inégales; côtes subégales et granuleuses. — *Sénunien*: Maestricht.

27. H. DELCROSANA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id. et quincuncialis*, Michelin, *Icon.*, pl. 6, fig. 2 et 7. == Polypier subconvexe; calices peu serrés et larges de 3 mill.; columelle bien développée; cloisons inégales et serrées. — *Turonien*: Sommelongue.

28. H. EXSCULPTA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Reuss, 1854. == Polypier gibbeux ou rameux; calices saillants et larges de 2 à 3 mill.; côtes granuleuses, flexueuses et inégales: 24 cloisons inégales; columelle petite et papilleuse. — *Turonien*: Gosau; Saint-Wolfgang.

29. H. SALISBURGENSIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astræa coronata*, Reuss, 1854. == Polypier convexe et gibbeux; côtes inégales et flexueuses; calices écartés, peu saillants, larges de 2 mill.; columelle petite; 12 côtes et 24 cloisons inégales. — *Turonien*: Gosau.

Espèces douteuses.

30. H.? STYLINOIDES, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea stricta*, Michelin, pl. 6, fig. 5. — *Turonien*: Montdragon.

31. H.? BARANDEI, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea macrocona*, Reuss, 1846. — *Turonien*: Kutschlin, près Bilin.

32. H.? ROYANENSIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, d'Orbigny. — *Turonien*: Royan.

33. H.? PEREZIANA. — *Stylina id.*, Michelin, pl. 62, fig. 2. — *Parisien*: Nice.

MM. Edwards et Haime rapportent encore au genre *Heliastrea* les fossiles suivants cités par M. d'Orbigny:

Astrea Hebertana, *microphyllia*, *Calipso*. — Danien; La Falaise; et l'*Astrea corsica* de l'étage *Falunien* de l'île de Corse du même auteur.

GENRE CXXI. — BRACHYPHYLLIA.

Brachyphyllia, Reuss, *Denksch. der Wien. Akad. der Wiss.*, t. VII. p. 103, 1854.

Polypier massif; polypierites unis par un grand développement des côtes; calices saillants; cloisons nombreuses et régulièrement dentées; columelle spongieuse et bien développée; épithèque nulle; gemmation périphérique.

Ce genre très-voisin du précédent ne s'en distingue que par son aspect général et son mode de bourgeonnement. Ces deux caractères suffisent-ils pour former un genre distinct?

1. B. DEPRESSA, Reuss, *loc. cit.* == Polypier peu élevé et fixé par une large base; calices serrés, inégaux et larges de 30 mill.; côtes égales et crénelées; columelle large, 5 cycles complets. — *Turonien*: Gosau.

2. B. DORMITZERI, Reuss, *loc. cit.* == Polypier court et à base large; calices larges de 4 mill.; côtes subégales; 4 cycles de cloisons minces et inégales. — *Turonien*: Gosau.

3. B. GLOMERATA, Reuss, *loc. cit.* = Polypier convexe, calices peu saillants, très-écartés et larges de 10 mill.; 5 cycles de cloisons inégales; côtes nombreuses. — Turonien : Gosau.

4. B.? GRANULOSA, Reuss, *loc. cit.* — *Lobophyllia id.*, Michelin, pl. 11, fig. 1. = Calices circulaires, inégaux, peu saillants et larges de 30 mill.; columelle peu développée et papilleuse; côtes inégales et crénelées; 5 cycles de cloisons peu inégales et peu minces. — Falunien : Turin.

GENRE CXXII. — CONFUSASTRÆA.

Confustrea, d'Orbigny, *Note sur les Pol. foss.*, p. 10, 1849.

Confusastræa, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 481, t. II, 1856.

Adelastræa, Reuss, *loc. cit.*, p. 115, 1854.

Polypier en masse convexe ou subplane; polypiérites unis par des côtes confluentes; cloisons larges et bien développées; columelle nulle; calices bien distincts et un peu saillants; murailles cachées par les rayons septo-costaux, mais fortement indiquées par des bourrelets circulaires, entre lesquels se trouvent des dépressions qui indiquent la séparation des polypiérites.

A. — Rayons septo-costaux minces.

1. C. BURGUNDIÆ, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Defrance, 1830. — Michelin, *Icon.*, pl. 24, fig. 4. — *Complexastrea id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier élevé et convexe; polypiérites larges de 20 mill., 4 cycles de cloisons minces et serrées. — Corallien : Tonnerre; Dijon; Nuits; Champlitte; Saint-Mihiel; Lifol; Haut-Rhin.

2. C. INÆQUALIS, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier massif; calices larges de 12 mill., à fossette calicinale bien marquée; cloisons nombreuses et serrées. — Corallien : Chatel-Censoir.

D. — Rayons septo-costaux assez épais.

3. C. RUSTICA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.* 1851. — *Id. subburgundiæ*, d'Orbigny, 1850. — *Astrea rustica*, Defrance, 1826. = Polypier subplane; calices peu profonds, rapprochés et larges de 30 mill.; 4 cycles de cloisons larges, serrées et épaisses en dehors. — Corallien : Balmfleue; Aube.

4. C. COTTEAUI. — *C. Cottaldina*, d'Orbigny, 1850. — *C. Cottellana*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. = Polyp. subplane; calices serrés, larges de 20 mill.; 4 cycles, les 3 premières cloisons épaisses et droites. — Bathonien : Chatel-Censoir.

Le *C. cupulina* de A. d'Orbigny ne paraît pas différer de cette espèce.

5. C. CORALLINA. = Polypier en masse légèrement convexe; calices serrés, quelquefois comprimés, peu élevés et séparés par des dépressions polygonales; côtes inégales et subconfluentes; 36 à 38 cloisons épaisses près de la muraille, minces au centre, où elles sont soudées entre elles, et alternativement grandes et petites. Diam. des calices, 10 à 12 mill.; traverses nombreuses bien développées et espacées d'un mill. — Corallien : Charcenne.

6. C. LEPTOPHYLLIA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 484,

t. II, 1856. — *Adelastrea* id., Reuss, 1854. == Polypier convexe; calices inégaux et saillants; de 50 à 60 cloisons minces et inégales; côtes subflexueuses. Diam. des calices, 8 à 10 mill. — Turonien : Gosau.

7. C. THEVENINI, Etallon, *Etud. pal. sur le Haut-Jura*. == Polypier hémisphérique et gibbeux; calices profonds, irréguliers et larges de 15 à 18 mill.; côtes subégales; 36 à 48 cloisons assez épaisses et serrées. — Corallien : Valfin.

Cette dernière espèce doit différer très-peu, excepté par la forme, de notre *C. Corallina*.

GENRE CXXIII. — THAMNASTRÆA.

Thamnasteria, Lesauvage, *Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris*, t. I, p. 243, 1823.

Agaricia et *Astrea* (pars), Goldfuss, 1826.

Thamnastrea, Lesauvage, *Ann. des sc. nat.*, 1832.

Thamnastrea et *Synastrea*, Edwards et Haime, 1848.

Dactilocœnia, *Centrastrea*, *Polyphyllastrea* (pars), d'Orbigny, 1849.

Polypier polymorphe, plane, convexe ou dendroïde; polypières unis par les côtes ou par des murailles, qui sont entièrement cachées par des rayons septo-costaux tout à fait confluent; les murailles ne sont point indiquées par des bourrelets circulaires comme dans le genre précédent et il n'existe par de dépression entre les calices; les cloisons sont très-granulées et régulièrement dentées; les traverses sont rudimentaires ou représentées par les granulations des cloisons qui forment de fausses synaptiques; les calices sont épars sans ordre à la surface des polypiers et sont sensiblement égaux; la columelle est styloforme ou papilleuse ou bien elle manque complètement; le plateau inférieur est assez souvent recouvert d'une épithèque membraniforme.

Le genre *Thamnastræa* ainsi caractérisé renferme des espèces qui, bien qu'ayant une grande analogie, doivent cependant être divisées en trois sous-genres, suivant qu'elles présentent une columelle styloforme, papilleuse ou qu'elles n'en possèdent pas. Cet organe, qui, en effet, imprime à chaque être une modification de structure différente, a été toujours considéré comme un caractère important et générique, et nous ne voyons pas pourquoi ici on réunirait des êtres différents par leur organisation, quand ailleurs la présence, la nature, ou l'absence de la columelle a suffi pour fonder des genres distincts.

Nous diviserons donc le genre *Thamnastræa* en 3 sous-genres :
1° les Thamnastrées sans columelle, *Thamnastræa propriæ*;
2° les Thamnastrées ayant une columelle massive styloforme ou non, *Centrastræa* vel *Thamnastræa styliferæ*; 3° les Thamnas-

trées ayant une columelle papilleuse, *Synastræa*, vel *Thamnastæa papillata*.

1^{er} SOUS-GENRE. — THAMNASTRÆA.

A. — Plus de 4 cycles de cloisons.

1. T. CHAMPLITTENSIS. = Polypier en masse élevée et convexe; plateau très-finement radié; calices assez profonds, irréguliers, ressemblant à des dépressions qui seraient faites avec l'extrémité d'une plume d'oie non taillée sur une surface plane; 66 à 72 cloisons très-minces et très-serrées, formées d'une série de grains soudés entre eux et ayant quelque analogie avec les cloisons des *Microsolena*; on compte 9 cloisons dans une longueur de 2 mill., les calices ont de 3 à 5 mill. de diam.; le polypier s'accroît par superposition de couches minces, nombreuses et qui paraissent ne pas toujours être très-adhérentes entre-elles. — *Corallien*: Champlitte; Gy (Haute-Saône).

2. T. CHARCENNENSIS. = Polypier convexe, peu épais; plateau finement et régulièrement strié; calices assez profonds, larges de 10 à 12 mill.; cloisons minces, serrées et finement dentées. On en compte environ 56 par calice; espace columellaire creux et cylindrique. — *Corallien*: Charcenne.

3. T. GRANDIFLORA, E. de Fromentel, *Descr. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 60, pl. 9, fig. 1, 1857. = Polypier peu épais; 48 à 56 cloisons minces, écartées et finement dentées; calices superficiels et larges de 15 à 20 mill. — *Néocomien*: Saint-Dizier.

4. T. PROCERA, Reuss, *Denks. der Wien. akad. des Wiss.*, t. VII, p. 120, pl. 5, fig. 1-2, 1854. = Polypier subconvexe; calices inégaux, larges de 7 à 8 mill.; 50 à 60 cloisons minces, serrées, à peu près droites. M. Reuss dans le texte ne mentionne que 24 ou 30 cloisons. mais la fig. 2 en montre 58 à 60. — *Turonien*: Gosau; Saint-Wolfgang.

5. T. FUNGIFORMIS, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 30, fig. 4, 1851. = Polypier fungiforme, pédonculé, et terminé par une surface convexe; 50 cloisons alternativement inégales. Diam. des polypières, 6 à 7 mill. — *Bajocien*: Charlecomb; Marquises; La Miotte.

AA. — Quatre cycles complets.

6. T. GENIVALLENSIS, Edwards et Haime, *Hist. nat. des corall.*, p. 576. = Polypier peu épais et gibbeux; calices assez saillants et larges de 2 1/2 à 3 mill.; cloisons fortes et inégales et très-peu confluentes. — *Bajocien*: Genivaux; Saint-Quentin.

AAA. — Plus de 3 cycles. — a. Environ 40 cloisons.

7. T. FIRMASI. — T. Firmasana, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea Firmasiana*, Michelin, *Icon.*, pl. 68, fig. 4, 1847. = Polypier fungiforme; calices inégaux, larges de 15 à 20 mill.; environ 40 cloisons subégales et serrées. — *Turonien*: Soulage.

8. T. GEOMETRICA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea id.*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 22, fig. 11. — *Synastrea id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier convexe; calices assez creux et larges de 15 mill.; de 36 à 40 cloisons fortes et peu inégales. — *Sénonien*: Maestricht.

9. *T. AMBIGUA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Meandrina id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 51, fig. 1. — *Prionastrea id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Polyp. élevé et entouré d'une épithèque complète; calices oblongs et larges de 5 à 15 mill.; 40 cloisons peu flexueuses et anastomosées. — *Turonien* : Le Mans.

10. *T. COMPOSITA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Cyathophyllum compositum*, Sowerby, 1832. — *Thamnastrea composita* et *Dimorphastrea fungiformis*, Reuss, *loc. cit.*, 1832. = Polypier subconvexe; calices inégaux, larges de 10 à 15 mill.; environ 40 cloisons égales, épaisses, et serrées — *Turonien* : Gosau; Le Bausset.

11. *T. GENEVENSIS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, DeFrance, 1826. — *Astrea cristata*, Goldfuss, pl. 22, fig. 8. — Milne-Edwards, 1856. Michelin, pl. 24, fig. 7, 1843. — Geinitz, 1846. — *Synastrea cristata*, d'Orbigny, 1850. = Polypier circulaire et convexe; 40 cloisons alternativement inégales en épaisseur, très-serrées, et géniculées en dehors; murailles rudimentaires; calices larges de 10 mill. — *Corallien* : Gein-gen; Mont-Salève, etc.

12. *T. ROTATA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 12, fig. 10. — Bronn, 1848. — *Synastrea id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypier discoïde peu élevé et fixé par le milieu; calices larges de 12 à 15 mill.; 40 cloisons dans les grands calices. — *Corallien* : Randen; Malton.

13. *T. ACUTIDENS*, Reuss, *loc. cit.* pl., 21, fig. 7, 1854. = Polypier convexe; calices assez profonds et larges de 8 à 12 mill.; columelle rudimentaire et constituée par les dents internes des cloisons; environ 40 cloisons droites, serrées et peu inégales. — *Turonien* : Gosau; Wolfgang, etc.

AAA. — aa. 36 Cloisons par calice.

14. *T. BOLETIFORMIS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Agaricia id.*, Goldfuss, pl. 12, fig. 12. — *Astrea agaricites*, Römer, 1836. — *Agaricia agaricites*, d'Orbigny, 1850. = Polypier convexe, formé de couches superposées; calices larges de 12 à 15 mill.; 36 cloisons peu inégales et peu flexueuses. — *Corallien* : Kussbach; Selongey.

15. *T. DIMORPHASTREA*. = Polypier en lame mince et étendue; surface supérieure, souvent ridée par des crêtes qui indiquent des moments d'arrêt dans la croissance périphérique; calices superficiels, à fossette calicinale bien marquée, placés souvent en rangées et larges de 10 à 12 mill.; 36 cloisons minces, serrées, finement dentées et toutes dirigées dans le même sens; le plateau inférieur est couvert de côtes fines et non fasciculées. On en compte 4 dans la longueur d'un mill. — *Corallien inférieur* : Champlitte.

AAA. — aaa. De 26 à 30 cloisons par calice.

16. *T. PLANA*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, p. 111, 1851. — *Polyphyllastraea id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypier subplane; calices larges d'un cent.; environ 30 cloisons inégales et tout à fait confluentes. — *Corallien* : Poizat, près de Nantua.

17. *T. SCITA*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 23, fig. 4, 1851. = Polypier subplane, formé de couches superposées; calices petits peu profonds et larges de 2 mill.; 26 à 30 cloisons serrées, flexueuses, géniculées et alternativement inégales. — *Bajocien* : Hampton-Cliffs.

18. T. ? TEISSIERI. — *T. Tessierana*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea Tessieriana*, Michelin, *Icon.*, pl. 71, fig. 4. = Polypier mince, à surface plane ; calices superficiels, larges de 3 mill. ; 26 à 30 cloisons peu inégales et peu flexueuses. — *Turonien* : Les Martigues.

19. T. EXIGUA, Reuss, *loc. cit.*, pl. 18, fig. 5-6. = Polypier convexe ; calices superficiels et larges de 3 à 4 mill. ; 26 à 28 cloisons peu inégales et très-flexueuses (le texte indique par erreur 54 cloisons). — *Turonien* : Gosau.

20. T. DISCOIDES, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea Lamourouxii* (*pars*), Michelin, *Icon.*, p. 225, 1845. = Polypier subdiscoïde ; fossettes calicinales peu profondes ; calices larges de 7 à 8 mill. ; environ 30 cloisons inégales, minces, peu serrées et flexueuses. — *Bajocien* : Croizille.

21. M. CADOMENSIS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1850. — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 54, fig. 14. — *Synastrea id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypier dendroïde, à branches de 8 millim. de diam. ; calices larges de 2 à 3 mill. ; ordinairement 28 cloisons serrées, minces et subflexueuses. — *Bajocien* : Lagrune.

AAAA. — 3 Cycles seulement. — a. Polypier dendroïde.

22. T. DENDROIDEA, Blainville, *Dict.*, 1830. — *Thamnastrea Lamourouxii*, Lesauvage, 1823. — *Astrea dendroidea*, Lamouroux, 1821-1823. — Defrance, 1826. — *T. Lamourouxii* (*pars*), Michelin, pl. 25, fig. 3, 1843. — *T. dendroidea* et *Dactylastrea subramosa*, d'Orbigny, 1850. — *Thamnastrea gigantea*, Edwards, 1836. — *T. dendroidea* et *affinis*, Edwards et Haime, 1850. = Polypier dendroïde, formé de tiges rondes, serrées et subrameuses ; calices superficiels, larges de 2 à 3 mill. ; cloisons serrées et inégales ; celles du dernier cycle sont quelquefois incomplètes. — *Coralhen* : Caen ; Saint-Mihiel ; Verdun ; Trouville ; Ecuelle (Haute-Saône).

AAAA. — aa. Polypier plane ou convexe.

23. T. DESORI, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 558. — *Astrea Lamourouxii*, Michelin (*pars*) *Icon.*, pl. 54, fig. 9. = Polypier turbiné, à surface convexe ; calices larges de 6 à 7 mill. ; ordinairement 3 cycles et quelquefois des cloisons d'un 4^e. — *Bajocien* : Caen.

24. T. LAMELLISTRIATA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 4, fig. 8, 1841. = Polypier peu élevé et entouré d'une épithèque ; 24 cloisons serrées, peu épaisses et inégales ; calices larges de 6 à 8 mill. — *Turonien* : Uchaux.

25. T. CRENULATA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Synastrea crenulata*, *Babeana* et *Agaricia elegantula*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier en lames minces ; calices larges de 4 à 5 millim. et souvent disposées en lignes concentriques ; columelle creuse ; 24 cloisons droites, et un peu dirigées dans le même sens. — *Bajocien* : Saint-Quentin ; Metz ; Fromentau ; Pouillenay.

26. T. METTENSIS, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 38, fig. 3, 1851. = Polypier peu épais et arrondi ; calices larges de 4 à 5 millim. ; 24 cloisons dans les grands calices, elles sont inégales et droites. Cette espèce est très-voisine de la précédente. — *Bajocien* : Saint-Quentin ; Metz ; Cheltenham.

27. T. REQUIENI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. —

Astrea id., Michelin, *Icon.*, pl. 71, fig. 8, 1847. = Polypier subplane ; calices larges de 2 à 3 millim. ; 23 cloisons minces, inégales et peu flexueuses. — *Turonien* : Corbières.

28. *T. INSIGNIS*. = Polypier en lames assez minces et étendues ; surface subplane ; calices superficiels, ronds et renfermant 24 cloisons droites, mais séparées des calices voisins par des rayons septo-costaux, confluent et très-tortueux ; columelle nulle. Diam. des calices, 2 mill. ; largeur des espaces costaux, 1/2 mill. — *Corallien inférieur* : Champlitte.

29. *T. FASCICULATA*. = Polypier en lames minces et frondescentes ; plateau recouvert par des côtes divergentes réunies en faisceaux et entre lesquelles on voit des traverses espacées d'un demi mill. ; surface supérieure subplane ; calices superficiels, à fossette bien marquée ; 24 cloisons droites, assez minces, géniculées et très-espacées. Diam. des calices, 6 mill. — *Corallien inférieur* : Champlitte.

30. *T. PERRONI*, E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. géol. de France*, 2^e série, t. XIII, p. 863, 1856. = Polypier en masse arrondie et mamelonnée ; accroissement par superposition de couches indiquées par des bandes radiées verticalement et larges de 8 à 12 mill, polyphérites larges de 6 millim. ; 24 cloisons fortes, épaisses, serrées et très-crenelées ; les jeunes calices en offrent quelquefois 16. — *Portlandien* : Mantoche ; Es-sertenne.

AAAAA. — Moins de 3 cycles.

31. *T. MOREAUI*. — *T. Moreauana*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, p. 578, 1856. — *T. Morellana*, id., id., *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Synastrea Moreana*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Pavonia tuberosa*, Michelin, *Icon.*, pl. 22, fig. 5. = Polypier hémisphérique, calices larges de 5 à 6 millim. ; de 16 à 18 cloisons subégales et serrées. — *Corallien* : Verdun.

32. *T. HEMISPHERICA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Pavonia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 22, fig. 4. — *Synastrea id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypier convexe et subgibbeux ; calices superficiels et larges de 2 millim. ; 12 à 14 cloisons minces, subégales et un peu flexueuses. — *Corallien* : Meuse ; Pointe-du-Ché, près la Rochelle.

33. *T. ARANEOLA*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 24, fig. 8. — *Centrastrea id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier convexe ; calices larges de 3 millim. ; 12 à 14 cloisons peu inégales et assez flexueuses. — *Corallien* : Saint-Mihiel.

34. *T. LOBATA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Agaricia id.*, Goldfuss, pl. 12, fig. 11. — *Prionastrea id.*, d'Orbigny, 1850. = Polyp. formé par une lame mince et recourbée en dedans ; calices subégaux, larges de 3 mill., 12 à 14 cloisons inégales et droites. — *Corallien* : Wurtemberg.

2^e SOUS-GENRE. — CENTRASTRÆA.

B. — Plus de 3 cycles. — b. De 30 à 38 cloisons.

1. *C. GOLDFUSSI*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Thamnastrea id.*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea Goldfussi*, Klipstein, 1845. = Polypier convexe, columelle bien développée ; calices larges de 10 mill. ; 32 cloisons fortes et inégales, un peu arquées en dehors. — *Saliférien* : Saint-Cassian.

2. *C. CISTELLA*, d'Orbigny, 1850. — *C. Michelinia id.* — *Thamnastrea*

id., Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea cistella*, DeFrance, 1828. — *Astrea lagunum, agaricites, micraxonæ*, Michelin, pl. 4, fig. 9, 10, 11 (la columelle est seulement indiquée dans cette dernière figure), pl. 50, fig. 10. = Polypier court, recouvert inférieurement par une épithèque; columelle bien développée et styliforme; 38 cloisons minces et serrées; largeur des calices de 7 à 10 mill. — *Turonien*: Uchaux; Le Mans, etc.

B. — bb. De 24 à 28 cloisons.

3. C. DUMOSA. — *Thamnastræa id.*, E. de Fromentel, *Bull. de la soc. Géol.*, 2^e série, t. XIII, p. 863, 1856. = Polypier dendroïde et touffu; rameaux larges de 10 à 15 mill.; calices peu profonds et larges de 4 à 5 mill. (C'est par erreur que dans l'ouvrage précité on a indiqué 6 à 7 mill. de diam. pour les calices). Environ 28 cloisons, droites, peu serrées et très-confluentes; une columelle petite mais bien marquée. — *Portlandien*: Mantoche; Gray-la-ville.

4. C. LAMELLOSA. — *Thamnastræa id.*, E. de Fromentel, *Descr. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 61, 1857. = Polypier en lames minces et superposées; calices larges de 3 à 4 mill.; columelle petite et isolée; 18 à 28 cloisons minces, lobées et souvent anastomosées. — *Néocomien*: Gy-l'Évêque.

5. C. PUNCTATA. — *Thamnastræa id.*, E. de Fromentel, *Pol. foss. de l'étage Néocomien*, pl. 10, fig. 1-2, 1857. = Polypier convexe; columelle très-développée; cloisons larges, divisées en 6 faisceaux de 3, entre lesquels se montrent une ou deux cloisons rudimentaires. Diam. des calices, 2 mill. — *Néocomien*: Gy-l'Évêque; Saint-Dizier.

BB. — 3 Cycles seulement. — a. Calices larges de 5 à 6 mill.

6. C. CONICA. — *Astrea conica*, DeFrance, 1826. — *Thamnastræa id.*, Edwards et Haime, 1850-51. — *Astrea coniformis*, Michelin, *Icon.*, pl. 26, fig. 1, 1844. = Polypier fixé sur un gros pédoncule; surface conique, couverte de calices larges de 5 à 6 mill.; cloisons inégales, minces et assez serrées. Haut. du polypier, 50 mill. — *Turonien*: Saint-Paul; Trois-Châteaux (Vaucluse).

7. C. BAYARDI. — Polypier mince, circulaire, à muraille horizontale, couverte d'une forte épithèque et fixée par un pédicule court et étroit; calices peu profonds, disposés autour d'un parent central qui n'est guère plus grand que les autres; cloisons fortement dentées, très-fortement granulées latéralement et se dirigeant du centre à la circonférence du polypier. On compte généralement 24 cloisons par calice et quelquefois moins; la columelle est petite et tuberculeuse; les calices ont 5 mill. de diam. — *Callovien*: Mont Bayard (Saint-Claude). Cette espèce est très-probablement une Dimorphastrée. (Communiqué par M. Etallon).

BB. — aa. Calices larges de 2 à 3 millimètres.

8. C. ARBORESCENS. — *Thamnastræa id.*, Etallon, *loc. cit.* = Polypier dendroïde, à rameaux serrés, tortueux et larges de 2 à 3 centim.; calices superficiels, peu réguliers, larges de 3 mill.; cloisons subégales, épaisses et droites; le 3^e cycle est quelquefois incomplet. — *Corallien*: Valfin.

9. C. MOREANA. — *C. Moreana*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Agaricia lobata*, Michelin, *Icon.*, pl. 27, fig. 5. — *Thamnastræa Lorryana*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. = Polypier peu épais et sub-

plane ou subgibbeux; cloisons peu dentées, peu épaisses, très-serrées et flexueuses; columelle tuberculeuse; 3 cycles ordinairement complets; calices larges de 2 à 3 mill. — *Corallien*: Saint-Mihiel; Verdun, etc.

10. C. GRACILIS, d'Orbigny, *Prod.*, t. I, p. 387, 1850. — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 38, fig. 13. — *Thamnastræa*? *id.*, Edwards et Haime, 1851, 1856. = Polypier subplane; columelle styliforme de 20 à 24 cloisons alternativement inégales, assez épaisses et droites; calices assez profonds et larges de 2 à 3 mill. — *Corallien*: Wurtemberg.

BB. — aaa. *Calices larges de 1 1/2 à 2 millimètres.*

11. C. M'COYI. — *Thamnastræa*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 29, fig. 2. = Polypier convexe; calices larges de 2 mill. à peine; columelle bien développée; 20 à 24 cloisons alternativement inégales, subflexueuses et épaisses. — *Bajocien*: Combe-Down.

12. C. WALTONI. — *Thamnastræa id.*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 25, fig. 4. = Polypier subdendroïde; 20 à 24 cloisons peu inégales et fortement géniculées en dehors, minces en dedans; columelle tuberculeuse; calices serrés, peu inégaux, larges de 1 1/2 mill. — *Bathonien*: Bath.

BBB. — *De 16 à 20 cloisons par calice.*

13. C. INDEX. — *Thamnastræa digitata*, E. de Fromentel, *Pol. foss. de l'étage Néocomien*, pl. 9, fig. 8-9 (non *T. digitata*, Michelin). = Polypier dendroïde, à tiges un peu aplaties; calices ronds, superficiels et larges de 1 1/2 mill.; columelle ronde et isolée; 10 grandes cloisons et 10 petites. — *Néocomien*: Saint-Dizier.

14. C. HAIMEI. = Polypier en lame mince; calices irréguliers; cloisons sensiblement dirigées dans le même sens et alternativement grosses et petites; les calices sont larges de 1 1/2 à 2 millim., profond de 1/2 mill.; et séparés par un intervalle de 2 à 3 mill. On compte 20 cloisons par calice, 6 grandes semblent seules arriver jusqu'au centre; columelle tuberculeuse assez bien développée. — *Corallien*: Champlitte.

Cette espèce montre d'une manière à peu près évidente, ce que déjà depuis longtemps nous avons remarqué, c'est que la plupart des *Thamnastræes* ont des synapticules et non des traverses proprement dites et qu'elles devraient faire partie de la famille des *Cyathoseriniens*.

15. C. COMMUNIS. = Polypier en petite masse arrondie; calices serrés, superficiels, mais bien distincts; cloisons larges, subégales, séparées par des sillons étroits et profonds qui laissent voir des traverses en forme de synapticules; la columelle est tuberculeuse et aplatie. On compte de 18 à 20 cloisons par calice, ceux-ci sont larges de 3 à 4 mill. — *Corallien*: Charcenne; Champlitte; Ecuelle (Haute-Saône); Chatel-Censoir (Yonne); Selongey (Côte-d'Or).

16. C. CONCINNA. — *Thamnastræa id.*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 17, fig. 3. — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 22, fig. 1^a, 1826. — Hall, 1830. — *Astrea varians*, Römer, 1836. — M'Coy, 1848. — *Tremocænica varians* et *Stephanocænica concinna*, d'Orbigny, *Prod.* — *Astrea gracilis*, Quenstedt, 1852. = Polyp. en masse subplane, ou arrondie ou subgibbeuse; cloisons subflexueuses; inégales en épaisseur et en largeur alternativement. On en compte de 16 à 20 par calice, ceux-ci sont larges de 2 mill. — *Corallien*: Malton; Upware; Steeple-Ashton; Natheim; Stenay; Haut-Rhin; Champlitte; Gy; Charcenne (Haute-Saône), etc.

17. C. PORTLANDICA. — *Thamnastrea* id., E. de Fromentel, *Bull. de la soc. Géol. de France*, 2^e série, t. XIII, p. 862, 1856. = Polypier formé de lames assez minces, superposées et constituant des masses hautes quelquefois d'un mètre sur autant d'épaisseur; la surface est le plus souvent mamelonnée et quelquefois subplane; les cloisons sont assez épaisses, rarement flexueuses, également et fortement dentées, et sub-égales en épaisseur, on en compte de 16 à 20; dont 3 plus développées que les autres; la columelle est petite, tuberculeuse, peu saillante et enfoncée; les calices larges de 2 mill., sont souvent entourés d'un bourrelet circulaire. — *Portlandien*: Mantoche; Chargey; Gray-la-Ville (Haute-Saône).

18. C. MAMMOSA. — *Thamnastrea* id., Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 23, fig. 3, 1851. = Polypier élevé et mamelonné; calices larges de 1 à 1 1/2 mill.; columelle petite et tuberculeuse, de 16 à 18 cloisons peu inégales, droites ou courbées en dehors. — *Bajocien*: Sapperton.

19. Nous connaissons une espèce du *Corallien* de Selongey (Côte-d'Or), qui a beaucoup d'analogie avec l'espèce précédente, elle en a la forme extérieure et n'en diffère réellement que par une columelle plus forte et des cloisons toujours droites, nous lui avons donné le nom de C. GIBBOSA.

20. C. HAUERI — *Dimorphastræa* id., Reuss, *loc. cit.*, pl. 19, fig. 11, 1854. — *Thamnastræa* id., Edwards et Haime, 1856. = Polypier circulaire, peu élevé; calices sensiblement disposés en cercles; columelle tuberculeuse, bien développée, cloisons épaisses, écartées, droites et géniculées en dehors, on en compte de 16 à 18; calices larges de 6 à 7 mill. — *Turonien*: Gosau; Piesting.

BBBB. — De 12 à 16 cloisons.

21. C. FRONDESCENS. — *Thamnastræa* id., E. de Fromentel, *Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 61, pl. 9, fig. 3-4, 1857. — *Synastrea* id., d'Orbigny, *Prod.* = Polypier en grandes frondes; calices ronds et légèrement élevés; columelle petite et tuberculeuse; cloisons flexueuses et fortement dentées; on en compte 14 ou 16 et rarement 18. — *Néocomien*: Gy-l'Evêque (Yonne).

22. C. MINIMA. — *Thamnastrea* id., Etallon, *loc. cit.* = Polypier en lames subgibbeuses et parasites sur d'autres polypiers; calices réguliers et larges de 1 mill.; columelle styliforme, peu développée, 14 à 16 cloisons épaisses, serrées, crénelées, géniculées et irrégulièrement confluentes; épithèque très-développée. — *Corallien*: Valfin (Jura).

23. C. ERMANI. — *Thamnastræa* id., Edwards et Haime, *Hist. nat. des corall.*, p. 581, 1856. — *Stylina striata*, Erman, 1854 (non Michelin). = Polypier en cône renversé, plateau commun, strié régulièrement, surface calicinale concave; calices larges d'un mill.; 12 cloisons alternativement inégales et confluentes de deux en deux. — *Turonien*: Santander, Espagne.

3^e SOUS-GENRE. — SYNASTRÆA.

C. — Environ 50 cloisons par calice.

1. S. MAGNIFICA. = Polypier en masse épaisse et convexe; calices bien délimités et assez profonds; cloisons serrées, assez minces et finement dentées; columelle papilleuse, large et bien développée; 52 cloi-

sons droites, inégales et quelquefois anastomosées. Diam. des calices, 12 à 15 mill., profondeur, 4 à 5. — *Corallien* : Charcenne.

2. *S. MULTIRADIATA*. — *Thamnastræa* id., Reuss, *loc. cit.*, pl. 7, fig. 1, 1854. = Polypier à surface subplane; calices larges de 20 à 30 mill., ils sont inégalement espacés et profonds, on compte de 50 à 60 rayons septo-costaux minces, crénelés et peu inégaux. — *Turonien* : Gosau.

3. *S. CORBARICA*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Thamnastrea* id., Edwards et Haime, 1851. — *Astrea media*, Michelin, pl. 70, fig. 4, 1847 (non Soerby). = Polypier subturbiné et à surface plane; calices assez profonds et larges de 12 à 15 millim.; 48 cloisons minces et serrées; columelle assez bien développée. — *Turonien* : Soulage; Bains de Rennes.

cc. De 30 à 38 cloisons par calice.

4. *S. CONFERTA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1850. — *Thamnastrea* id., *ibid.*. *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. = Polypier pédonculé, à surface supérieure convexe; plateau couvert d'une épithèque plissée; 2 ou 3 tubercules columellaires; 30 ou 38 cloisons minces, serrées, flexueuses et alternativement inégales. Diam. des calices, 5 millim. — *Turonien* : Montignies-sur-Roc (Belgique).

ccc. 36 Cloisons par calice.

5. *S. ARACHNOIDES*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1850. — *Madrepora* id., Parkinson, 1808. — *Astrea* id. et *Explanaria flexuosa*, Fleming, *an. Brit.*, 1828. — *Astrea microconos*, Goldfuss, 21, fig. 6, 1826. — *Astrea arachnoïdes* et *Explanaria flexuosa*, Woodward, 1830. — *Siderastrea agariciformis*, M'Coy, 1848. — *Centrastrea microconos*, d'Orbigny, *Prod.* — *Thamnastrea arachnoïdes* et *microconos*, Edwards et Haime, 1851. — *Astrea microconos* et *Agaricia foliacea*, Quenstedt, 1852. = Polypier à surface plane ou convexe, submassif ou lamellaire; plateau nu et finement strié, calices peu serrés, inégaux, larges de 6 à 7 mill.; 36 cloisons serrées, assez minces et peu inégales; la columelle est papilleuse et bien développée. — *Corallien* : Malton; Upware; Steeple-Ashton; Champlitte; Trouville, etc.

6. *S. FLEXUOSA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1850. — D'Orbigny, *Prodrome*, 1850. — *Thamnastrea* id., Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea* id., Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 22, fig. 10, 1846. = Polyp. subplane; calices écartés inégalement; columelle bien développée; 36 cloisons subégales, flexueuses et géniculées en dehors. Diam. des calices, 6 à 8 mill. — *Sénouien* : Maëstricht.

7. *S. DUBIA*. = Polypier en masse subplane; calices creux et déformés; cloisons formées par une série de granulations soudées ensemble, mais rappelant la structure des *Microsolena*, on en compte environ 36 par calice; elles sont très-serrées et très-granulées latéralement; traverses indistinctes. Diam. des calices, 6 à 7 millim. — *Corallien* : Champlitte.

cccc. Plus de 3 cycles et moins de 36 cloisons.

8. *S. DUMONTI*. — *Thamnastrea* id., Chapuis et Dewalque, *Mém. cour. par l'acad. de Belg.*, pl. 38, fig. 11, 1854. = Polypier à surface subplane; calices inégaux, profonds, larges de 2 à 3 mill. et disposés sans ordre; columelle bien marquée; de 28 à 34 cloisons inégales et peu épaisses. — *Bajocien* : Longwy.

9. *S. STRICTA*. — *Thamnastrea id.*, E. de Fromentel, *Desc. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 63, 1857. = Polypier en forme de beignet ; calices serrés et subpolygonaux ; columelle papilleuse, 28 à 32 cloisons fines et anastomosées. — Néocomien : Gy-l'Évêque.

10. *S. ASTRÆOIDES*. — *Latomæandra id.*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 21, fig. 7-8. — *Thamnastrea id.*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des corall.*, 1856. = Polypier convexe ; calices inégaux, larges de 8 à 12 millim. et assez profonds. 28 à 30 cloisons serrées, peu courbées et peu inégales. — Turonien : Gosau ; Wolfgang ; Weisenbach (Alpes orientales).

11. *C. DIGITATA*. — *Astrea digitata*, DeFrance, 1826. — *Thamnastrea id.*, Le Sauvage, 1832. — *Dactylæcænia id.*, d'Orbigny, 1850. — *Stephanocænia id.*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1851. — *Thamnastrea id.*, Michelin, pl. 54, fig. 13, 1845. = Polypier dendroïde ; calices bien marqués, larges de 1 1/2 à 2 mill. ; columelle bien développée ; 3 cycles et quelques cloisons d'un 4^e. (L'échantillon figuré par M. Michelin est usé et laisse voir les murailles). — Bajocien : Caen.

12. *S. ARDUENNENSIS*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Thamnastrea id.*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. = Polypier convexe ; calices superficiels, larges de 9 millim. ; de 28 à 30 cloisons subégales, serrées, minces et dirigées dans le même sens. — Corallien : Neuvizi.

13. *S. TEXTILIS*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1850. — *Thamnastrea id.*, *ibid.*, 1851. — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 23, fig. 3, 1826. = Polypier circulaire et subplane ; 26 ou 28 cloisons subégales et flexueuses en dehors ; polypières larges de 4 mill. ; columelle bien développée. — Sénonien : Maëstricht.

14. *S. MEDIA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1850. — *Thamnastrea id.*, *ibid.*, 1851. — *Thamnastrea exaltata*, *agaricites*, et *media*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 19, fig. 5-6. fig. 1-2 et fig. 3-4. — *Astrea media*, Sowerby, 1832. = Polypier polymorphe. souvent lobé ; calices distincts et larges de 6 à 10 mill. ; de 26 à 30 cloisons serrées, flexueuses, minces et anastomosées ; columelle papilleuse, petite. — Turonien : Gosau ; Piesting, etc.

15. *S. CONSTRICTA*. — *Thamnastrea id.*, Etallon, *loc. cit.* = Polypier gibbeux et lobé ; calices superficiels et larges de 2 1/2 mill. ; environ 30 cloisons peu inégales et géniculées en dehors ; columelle spongieuse, bien développée. — Corallien : Valfin.

16. *S. STELLATA*. = Polypier en masse plane ; calices assez réguliers, subpolygonaux et larges de 4 à 6 millim. ; cloisons épaisses en dehors, minces en dedans et subégales, on en compte de 24 à 28 par calice ; columelle représentée par 2, 3 ou 4 tubercules. — Bathonien : Environs de Champlitte.

17. *S. CONTORTA*. = Polypier en rameau long, cylindrique, et contourné ; calices superficiels et larges de 1 1/2 à 2 mill. ; les centres sont à une distance de 2 à 3 mill. les uns des autres ; environ 28 cloisons assez épaisses et flexueuses ; 2 ou 3 tubercules columellaires. Diam. des rameaux, 5 à 7 mill. — Corallien : Champlitte (Haute-Saône).

ccccc. Trois cycles cloisonnaires seulement.

18. *S. LENNISI*. — *Id. (pars)*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1850. — *Thamnastrea id.*, *ibid.*, 1851, 1856. — *Astrea Lennisii*, Rømer, 1840. = Polypier en forme de beignet ; calices bien marqués et larges de 6 à 8 mill. ? cloisons subégales et fortement géniculées ; 2 ou 3 tubercules columellaires. — Néocomien : Berklinger ; Yonne.

19. *S. DECIPIENS*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1850. — *Astrea agaricites* et *decipiens*, Michelin, *Icon.*, pl. 50, fig. 12 et 13. — *Centrastraea renomana*, d'Orbigny, *Prod* — *Thamnastraea confusa*, Reuss, 1854. = Polypier pédonculé; columelle papilleuse; 3 cycles, le troisième n'étant pas toujours complet; cloisons serrées, crénelées, flexueuses et peu inégales; calices superficiels, larges de 5 à 6 mill. — *Turonien*: Le Mans; île Madame; Gosau.

20. *S. TENUISSIMA*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1850. — *Thamnastraea id.*, *ibid.*, 1851, 1856. = Polypier arrondi et convexe; calices superficiels, larges de 2 mill.; 3 ou 4 tubercules columellaires; 3 cycles et rarement des cloisons rudimentaires d'un 4^e; elles sont minces, flexueuses et anastomosées. — *Turonien*: Montignies-sur-Roc (Belgique).

21. *S. LANGRUNENSIS*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Thamnastraea id.*, Edwards et Haime, 1851, 1856. = Polypier convexe; calices à fossette bien marquée et larges de 2 mill.; 24 cloisons serrées, flexueuses et irrégulières. — *Bathonien*: Luc; Langrune.

22. *S. LYELLI*. — *Thamnastrea id.* Edwards et Haime, 1851, 1856. — *Siderastrea Lamourouxi*, M'Coy, 1848. = Polypier lobé ou arborescent; 2 ou 3 papilles columellaires; calices superficiels, disposés en rangées et larges de 3 mill.; ordinairement 24 cloisons serrées, minces, bien denticulées et subflexueuses; quelquefois on compte moins de cloisons; les dents internes simulent des lobes paliformes. — *Bojocien*: Stonesfield; Minchinhampton.

23. *S. VELAMENTOSA*. d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 23, fig. 4, 1826. — *Thamnastraea id.*, Edwards et Haime, 1851, 1856. = Polypier subplane; calices espacés, larges de 1 1/2 mill.; cloisons larges au nombre de 20 ou 30; columelle spongieuse bien développée. *Sénonien*: Maëstricht.

24. *S. PEDICULATA*. — *Thamnastraea id.*, E. de Fromentel, *Desc. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 61, pl. 9, fig. 6-7. 1857. = Polypier pédiculé et élevé; columelle papilleuse; 24 cloisons larges et fortement dentées; traverses bien développées. — *Néocomien*: Saint-Dizier.

25. *S. MÆANDRA*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Thamnastraea id.*, E. de Fromentel, *loc. cit.*, pl. 10, fig. 5. = Polypier en forme de toupie: calices réguliers, larges de 5 à 6 mill.; 18 à 24 cloisons droites et inégales. — *Néocomien*: Gy-l'Evêque.

26. *S. AGARICITES*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1850. — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 22, fig. 9, 1826. — Milme-Edwards, 1830. — *Astrea composita*, Michelin, pl. 70, fig. 6. — *Dimorphastraea glomcrata*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 19, fig. 12. — *Thamnastraea agaricites*, Edwards et Haime, 1851, 1856. = Polypier convexe; columelle bien développée; calices larges de 8 à 10 mill.; 24 cloisons inégales et subflexueuses. — *Turonien*: Gosau; Nussbach; Figuières.

27. *S. BOURI*. — *Thamnastrea id.*, E. de Fromentel, *Bull. de la soc. Géol. de France*, 2^e série, t. XIII, p. 862, 1856. = Polypier arrondi; calices assez réguliers, profonds et larges de 3 mill.; columelle bien développée; 18 à 24 cloisons droites, peu serrées et inégales. — *Portlandien*: Essertenne; Mantoche (Haute-Saône).

cccccc. *Moins de 3 cycles.*

28. *S. BELGICA*. — *Thamnastrea Lennisi* (pars) et *belgica*, Edwards et Haime, 1850, 1851. = Cette espèce ne diffère du *S. Lennisi* que par des

cloisons plus grosses et en nombre moins grand ; on en compte 12 à 16 par calice. — *Turonien* : Montignies-sur-Roc.

29. *S. NEPTUNI*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Thamnastrea id.*, Edwards et Haime, 1851, 1856. — Polypier convexe ; calices superficiels et larges de 2 mill. ; 16 cloisons minces, subégales et toutes dirigées dans le même sens. — *Bathonien* : Luc.

ccccccc. *Deux cycles seulement.*

30. *S. RAMOSA*, d'Orbigny, *Prod.* — *Agaricia id.*, Munster, 1841. — *Thamnastrea id.*, Edwards et Haime, 1851, 1856. — Polypier rameux ; calices superficiels et larges de 1 mill. environ ; cloisons flexueuses. — *Saliférien* : Saint-Cassian.

Espèces douteuses appartenant aux 3 sous-genres.

1. *SYNASTREA* ? *SIMONELLANA*, d'Orbigny, *Prod.* — *Bajocien* : Langres.
2. *S.?* *JURENSIS*, *id.*, *id.* — *Bajocien* : Salins (Jura).
3. *S.?* *PULCHELLA*, *id.*, *id.* — *Corallien* : Pointe-du-Ché.
4. *S.?* *PINNATA*, *id.*, *id.* — *Turonien* : île Madame.
5. *S.?* *MAGNA*, *id.*, *id.* — *Turonien* : Le Mans.
6. *S.?* *SUBEXCAVATA*, *id.*, *id.* — *Turonien* : Uchaux.
7. *S.?* *ATAXENSIS*, *id.*, *id.* — *Turonien* : Soulage.
8. *S.?* *TOMBECKIANA*, *id.*, *id.* — *Néocomien* : Saint-Dizier.
9. *S.?* *UNDULATA*, *id.*, *id.* — *Néocomien* : Fontenoy.
10. *S.?* *NEOCOMIENSIS*, *id.*, *id.* — *Néocomien* : Fontenoy ; Chenay ; Lignerolles.
11. *S.?* *ICAUNENSIS*, *id.*, *id.* — *Néocomien* : Fontenoy.
12. *S.?* *BELLULA*, *id.*, *id.* — *Néocomien* : Fontenoy.
13. *S.?* *LUCENSIS*, *id.*, *id.* — *Bathonien* : Luc.
14. *S.?* *COMPLANATA*, *id.*, *id.* — *Corallien* : Saint-Mihiel.
15. *S.?* *EXCAVATA*, *id.*, *id.* — *Corallien* : Estré.
16. *S.?* *CONFUSA*, *id.*, *id.* — *Corallien* : Poisat.
17. *S.?* *OCEANI*, *id.*, *id.* — *Corallien* : Oyonnax ; Poisat ; Saulce-aux-Bois.
18. *CENTRASTREA* ? *RADIATA*, *id.*, *id.* — *Turonien* : Soulage.
19. *C.?* *IRREGULARIS*, *id.*, *id.* — *Turonien* : Uchaux.
20. *C.?* *MICROPHYLLIA*, *id.*, *id.* — *Néocomien* : Venay ; Saint-Dizier.

On doit encore regarder comme appartenant au genre *Thamnastrea* les fossiles suivants cités par M. d'Orbigny dans son *Prodrome* :

21. *POLYPHYLLASTREA TOUCASANA*. — *Turonien* : Figuières ; le Bausset.
22. *CRYPTOCÆNIA DECUPLA*. — *Corallien* : île de Ré.
23. *MICROSOLENA IRREGULARIS*. — *Corallien* : Oyonnax.

C'est près du genre précédent que nous devons placer un genre nouveau que nous avons créé pour deux fossiles qui nous ont été récemment communiqués par M. Martin, de Dijon.

GENRE STYLASTRÆA.

Polypier de forme arrondie ; calices saillants , circulaires et unis par le grand développement des côtes ; les murailles ne sont pas cachées par des rayons septo-costaux confluent ; les cloisons sont fortement et régulièrement dentées ; la columelle est ronde, styloforme et bien développée ; les côtes sont larges et vont rencontrer les côtes des polypierites voisins sans être réellement confluentes ; gemmation intercaliculaire.

Ce genre correspond exactement aux Styloines et n'en diffère que par ses cloisons dentées.

1. S. MARTINI. = Polypier en masse arrondie ; polypierites ronds , libres et peu saillants ; cloisons épaisses , serrées et régulièrement dentées ; on en compte de 24 à 28 dans les grands calices ; elles sont inégales, selon les ordres et les plus petites s'unissent quelquefois à celles d'un ordre plus élevé ; les côtes sont peu développées par suite du resserrement des calices ; la columelle est forte et styloforme, mais peu saillante au fond des calices ; ceux-ci ont 3 millim. de diam. La gemmiparité se fait dans l'intervalle des calices. — *Sinemurien* : Vic-de-Chassenay.

2. S. SINEMURIENSIS. = Cette espèce se distingue de la précédente par des cloisons plus serrées et sans intervalles entre elles ; par une columelle relativement plus forte et par ses calices plus petits ; on ne compte que 24 cloisons dans les grands calices, qui n'ont guère que 2 millim. ; les polypierites sont encore ici plus serrées et les calices moins réguliers que dans l'espèce précédente. — *Sinemurien* : Vic-de-Chassenay.

GENRE CXXIV. — DIMORPHASTRÆA.

Dimorphastrea et *Morphastrea*, d'Orbigny, 1850.

Astrea (*pars*), Goldfuss, 1826.

Agaricia (*pars*), Michelin, 1845.

Dimorphastræa, Edwards et Haime, 1850 et 1856.

Dimorphastræa, E. de Fromentel, *Pol. foss. de l'étage Néocom.*, 1857.

Polypier arrondi , à plateau nu ; calices semblables à ceux des *Thamnastrées*, mais rangés circulairement autour d'un calice central plus développé que les autres ; columelle rudimentaire ou nulle.

A. — *Espèces dont le calice central est connu.*

a. *Plus de quatre cycles dans le calice central.*

1. D. CUPULIFORMIS. = Polypier en forme de coupe assez profonde ; calice central occupant le fond de la coupe et large de 16 à 17 millim. ; on y compte 92 cloisons, dont 16 arrivent seules au centre , elles sont subégales en épaisseur et flexueuses ; les autres calices n'ont que 5 mill. de diam. et sont distants entre eux de 5 à 6 mill. ; ils ne sont pas placés en cercles bien réguliers autour du parent central et ne renferment que 18 à 20 cloisons subégales et toutes dirigées du centre du polypier à sa circonférence ; la columelle est subpapilleuse. — *Corallien* : Se-longey.

2. D. EXCELSA, E. de Fromentel, *Descript. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 66, 1857. = Polypier pédonculé en forme de champignon; calice central large de 20 mill.; on y compte 80 cloisons subégales; les autres calices sont assez écartés, larges de 6 à 8 mill. et renferment 24 cloisons presque égales; columelle papilleuse. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

3. D. GRANDIFLORA, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — E. de Fromentel, *loc. cit.*, 1857. = Polypier en forme de beignet; calice central atteignant jusqu'à 28 mill. de diam.; on y compte 78 cloisons; six d'entre elles vont jusqu'au centre et restent libres, mais les autres sont inégales et anastomosées; les autres calices sont larges de 6 à 7 mill.; on y compte de 12 à 18 cloisons. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

4. D. DUBIA. = Polyp. mince, discoïde et circulaire; calices tout à fait superficiels et assez rapprochés; le calice central possède 60 cloisons très-fines, très-serrées et un peu flexueuses; les autres calices renferment 40 à 42 cloisons; les rayons septo-costaux sont flexueux et dirigés du centre du polypier vers sa circonférence; columelle nulle. Diam. du calice central 10 mill., des autres calices 5 à 6 mill.; on compte 6 rayons septo-costaux dans une longueur de 2 mill. — *Corallien* : Natheim.

A. — aa. *Plus de 3 cycles dans le calice central.*

5. D. EXPLANATA, E. de Fromentel, *Pol. foss. de l'étage Néocomien*, pl. 10, fig. 6-7, 1857. = Polypier pédiculé; calice central superficiel, large de 12 à 13 mill. et renfermant environ 42 cloisons; les autres calices n'en renferment que 20 à 26 et sont larges de 7 à 8 mill. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

6. D. BELLULA, d'Orbigny, *Prod.* — E. de Fromentel, *loc. cit.*, pl. 10, fig. 8-9-10, 1857. = Polypier en forme de beignet; calice central large de 10 mill. et renfermant 32 cloisons libres et subégales; les autres calices sont rapprochés, larges de 4 mill. et ne possèdent que 18 ou 20 cloisons. — *Néocomien* : Gy-l'Évêque; Leugny; Saint-Dizier.

A. — aaa. *Trois cycles seulement.*

7. D. EXCAVATA, d'Orbigny, *Prod.* — E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 67, 1857. = Polypier en cornet très-évasé; calice central situé à la partie médiane et profonde et large de 6 à 7 mill.; les autres calices n'ont que 3 à 5 mill. de diam., on compte en moyenne 24 cloisons par calice. — *Néocomien* : Gy-l'Évêque; Saint-Dizier.

B. — *Espèces dont le calice central est inconnu.*

8. D. CORALLINA. = Polypier en lame étendue et assez mince; calices placés selon des lignes concentriques régulières et rapprochées dans le sens de ces lignes; ils sont peu profonds et présentent à leur centre une columelle papilleuse, on compte de 24 à 36 cloisons par calice; elles sont subégales et fortement dentées près de la columelle; les rayons septo-costaux sont égaux et tous dirigés dans le même sens. Diam. des calices, 5 mill.; distance des calices dans le sens des rangées 2 à 3 mill.; distances des rangées, 6 à 9. — *Corallien* : Champlitte.

9. D. STRICTA. = Polypier en lame assez épaisse; calices très-rapprochés et placés en séries très-serrées; les séries ne sont pas aussi régulières que dans l'espèce précédente et les calices sont plus profonds;

la columelle est rudimentaire; on compte environ 36 cloisons par calice; les rayons septo-costaux sont dirigés dans un même sens. Diam. des calices, 4 à 5 mill.; distance des calices et des séries, 2 à 3 mill. — *Corallien* : Champlitte; Gy (Haute-Saône).

10. *D. SULCOSA*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 17, fig. 2. = Polypier subconvexe; calices inégaux, à fossette large et profonde; rayons septo-costaux serrés et perpendiculaires à la direction des séries; les calices sont larges de 6 à 7 mill.; on y compte 32 à 36 cloisons (la figure n'en montre que 24). — *Turonien* : Gosau.

11. *D. LUDOVICANA*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Agaricia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 51, fig. 2, 1845. — *Morphastrea id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier pédonculé; calices espacés, larges de 3 à 4 mill., et renfermant 12 à 18 cloisons (la figure de M. Michelin ne montre pas de calice central et MM. Edwards et Haime en parlent sans le décrire). — *Turonien* : Le Mans.

Espèces douteuses.

12. *D. ALTERNATA*, d'Orbigny, *Prod.* — *Néocomien* : Chenay; Leugny.

13. *D. ESCHAROIDES*, Edwards et Haime, 1851. — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 23, fig. 2, 1826. = Cette espèce, bien qu'ayant l'aspect des *Dimorphastrées*, ne possède pas de parent central plus développé que les autres calices et pourrait bien n'être qu'une *Thamnastrée*. — *Sénonien* : Maëstricht.

GENRE CXXV. — PRIONASTRÆA.

Prionastræa, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Hist. nat. des coral.*, 1856.

Astrea (pars), Lamarck, 1816. — Ehrenberg, 1834.

Fissiparella, Dana, 1846.

Polypier de forme convexe ou gibbeuse; plateau commun recouvert d'une épithèque complète; polypiérites soudés par les murailles près du bord supérieur seulement, mais libres inférieurement; columelle spongieuse; calices polygonaux; cloisons minces et bien dentelées, surtout près de la columelle; endothèque bien développée.

1. *P. ARANEA*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea id.*, DeFrance, 1826. — *Favastrea id.*, Blainville, 1830. — *Astrea deformis*, Michelotti, 1836. = Calices polygonaux et larges de 15 mill.; columelle bien développée; murailles compactes; 38 cloisons très-minces et subégales. — *Falunien* : Bordeaux; Turin.

2. *P. IRREGULARIS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1851. — *Astrea id.*, DeFrance, 1826. — *Cellastrea id.*, Blainville, 1830. — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 12, fig. 9, 1842. = Polypier subplane; calices inégaux et larges d'environ 10 mill.; columelle rudimentaire; 4 cycles de cloisons inégales et très-minces, murailles simples et minces. — *Falunien* : Dax; Turin.

3. *P. ? DIVERSIFORMIS*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1850. — *Hist. nat. des coral.*, 1856. — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 12, fig. 5, 1842. = 3 cycles et des cloisons d'un 4^e; columelle pariétale formée par des trabicules provenant des cloisons, qui sont perforées à leur

bord interne ; calices serrés , déformés et larges de 20 à 30 millim. — *Falunien* : Bordeaux ; Turin.

GENRE CXXVI. — ISASTRÆA.

Isastræa, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851.

Astrea (pars) et *Agaricia* (pars), Goldfuss, *Petref. Germ.* 1826.

Prionastrea, *Meandrophyllia*, *Dendrastrea*, d'Orbigny, *Note sur les Pol. foss.*, 1849.

Polypier en masse convexe , gibbeuse , subplane ou dendroïde ; calices polygonaux ; polypiérites unis entièrement et dans toute leur hauteur par les murailles qui sont polygonaux ; columelle rudimentaire ou nulle ; cloisons granulées latéralement et régulièrement dentées ; gemmation submarginale ; plateau commun recouvert d'une épithèque pelliculaire qui cache des côtes disposées en faisceaux radiés.

A. — 5 Cycles de cloisons.

1. I. HAIDINGERI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, p. 533, 1856. — *Latomæandra angulosa*, Reuss, *Denk. der Wien. Akad.*, pl. 11, fig. 5, 1854. = Polypier subplane ; calices longs, inégaux, ayant de 1 à 2 1/2 centim. de diam. ; cloisons minces, serrées, droites et subégales. — *Turonien* : Piesting (Alpes orientales).

B. — Plus de 4 cycles de cloisons.

b. Environ 72 cloisons par calice.

2. I. TENUISTRIATA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 30, fig. 1, 1851. — *Astrea id.*, McCoy, 1848. = Polypier subplane ; calices peu profonds, presque égaux et larges de 15 mill. ; cloisons minces serrées, courbées et inégales de 4 en 4. — *Bajocien* : Cheltenham ; Dundry ; Metz.

B. — bb. De 50 à 60 cloisons par calice.

3. I. LAMELLOSISSIMA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 6, fig. 6, 1841. = Polypier convexe ; 60 cloisons larges , minces , serrées et peu inégales ; calices allongés et larges de 15 mill. — *Turonien* : Uchaux.

4. I. KÆCHLINI, Edwards et Haime, *Hist. nat. des corals.*, 1856. = Polyp. gibbeux ; calices irréguliers, inégaux, oblongs et larges de 5 à 10 mill. ; murailles minces et peu saillantes ; 50 à 60 cloisons minces, serrées, inégales et un peu courbées. — *Corallien* : Entre Rædersdorf et Oltingen (Haut-Rhin).

5. I. MORCHELLA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Latomæandra id.*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 21, fig. 9-10, 1854. = Polypier convexe ; calices larges de 6 à 10 millim. ; 50 à 60 cloisons serrées, peu courbées et peu inégales. — *Turonien* : Gosau.

7. I. PROFUNDA, Reuss, *loc. cit.*, pl. 9, fig. 5-6, 1854. = Polypier convexe ; calices inégaux, allongés et larges de 3 à 5 mill. ; environ 60 cloisons minces et très-inégales. — *Turonien* : Gosau.

7. I. SERIALIS, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 24, fig. 2, 1851. = Polypier plane ou convexe; calices larges de 7 à 8 mill. assez profonds et allongés; 50 cloisons minces, inégales et courbées; il paraît exister un nombre égal de cloisons tout à fait rudimentaires. — Bathonien : Comb-Down, près Bath.

8. I. GREENOUGH, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 17, fig. 2. = Polypier subplane; calices assez réguliers, larges de 15 mill.; 50 à 60 cloisons minces, régulièrement dentées et peu serrées; traverses abondantes. — Corallien : Botley-Hill; Belfort (Haut-Rhin); Champlitte (Haute-Saône).

C. — 4 Cycles seulement.

9. I. BERNARDI. — I. *Bernardana*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — I. *magna* *ibid.*, *id.* — *Prionastrea Bernardina* et *magna*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier subplane; calices inégaux, peu profonds et larges de 10 à 15 mill.; columelle creuse; de 34 à 48 cloisons larges, bien développées, un peu courbées, régulièrement dentées et non confluentes. — Bajocien : Metz; Montmédy; Marquises; Belfort; Salins; Nantua; Langres; Morey; Vaucourt, etc.

10. I. REUSSI. — I. *Reussana*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des corals.*, 1856. — *Ulophyllia crispa*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 11, fig. 6, 1854. = Polypier subconvexe; calices larges de 7 à 12 mill., inégaux et déformés; 48 cloisons minces, peu serrées et peu inégales. — Turonien : Gosau.

11. I. MUNSTERI. — I. et *Prionastrea Munsterana*, Edwards et Haime, 1850 et 1851. = Polypier convexe; calices larges de 5 à 8 millim., oblongs et peu profonds; 48 cloisons larges, serrées et assez minces. — Corallien : département de l'Orne.

12. I. ? POLYGONALIS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea* *id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 3, fig. 1, 1840. — *Prionastrea* *id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Calices larges de 6 à 7 mill.; polypier du reste peu connu et très-douteux. — Conchylien : fossile de.....?

13. I. ? LONSDALEI, Edwards et Haime, *Hist. nat. des corals.*, 1856. — *Id.*, *id.*, *Brit. foss. corals.*, 1851. = Calices larges de 6 à 7 millim.; 48 cloisons minces, droites et subégales. Ces caractères ont été posés sur un échantillon très-altéré. — Bajocien : Lansdown, près Bath.

14. I. HERNESI, Edwards et Haime, *Hist. nat. des corals.*, 1856. — *Prionastrea* *id.*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 13, fig. 7-8, 1854. = Polypier convexe; calices larges de 8 mill. et inégaux; columelle assez développée; 48 cloisons minces, inégales et un peu courbées. — Turonien : Gosau.

15. I. LATISTELLATA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des corals.*, 1856. — *Parastræa grandiflora*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 16, fig. 10, 1854 (non *Prionastrea grandiflora*, d'Orbigny). = Polypier subconvexe; calices larges de 30 mill., inégaux et superficiels; 48 cloisons minces, inégales et régulièrement dentées. — Turonien : Gosau.

16. I. CRASSA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Agaricia* *id.*, Goldfuss, pl. 12, fig. 13. — *Confusastrea* *id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypier en lame assez épaisse; calices larges de 12 à 18 mill. et inégaux; 48 cloisons peu inégales. — Corallien : Randen.

17. I. GOLDFUSSANA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Prionastrea* *id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Astrea helianthoides* (*pars*), Goldfuss, pl. 22, fig. 46 (non les autres). = Polypier subplane; calices inégaux, larges de 15 mill.; de 40 à 50 cloisons minces et peu inégales. — Corallien : Wurttemberg.

18. I. PERFORATA. — Polypier massif, à surface plane ; calices irréguliers, larges d'environ 10 mill. et assez creux ; 48 cloisons ; celles des 2 ou 3 premiers cycles très-développées et allant jusqu'au centre, les autres plus petites et quelquefois courbées ; columelle nulle et remplacée par une ouverture ronde et profonde ; les cloisons sont peu serrées et finement dentées — *Corallien* : Wagnon (Ardennes).

D. — Plus de 3 cycles cloisonnaires.

d. De 40 à 44 cloisons.

19. I.? ANGULOSA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des corals.*, 1856. — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 23, fig. 7. — *Stephanocantia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — Calices inégaux, larges de 6 ou 7 mill. ; 40 cloisons inégales de 4 en 4 ; columelle visible. — *Sénonien* : Maëstricht.

Cette espèce pourrait bien être une *Prionastrea* et non une *Stephanocænie*, comme le pensait d'Orbigny, car il n'existe pas de palis.

20. I. EXPLANATA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Brit. foss. corals.*, pl. 17, fig. 1, 1851. — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 38, fig. 14. — *Siderastrea id.*, Blainville, 1830. — *Prionastrea id.*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1849. — Polypier plane et subconvexe ; calices inégaux et larges d'environ 10 mill. ; 28 à 44 cloisons bien dentelées, inégales et cannelées latéralement. — *Corallien* : Heidenheim ; Stenay ; Lifol ; Steeple-Asthor ; Malton ; Champlitte (Haute-Saône), etc.

21. I.? HENOCQUEI, Edwards et Haime, *Hist. nat. des corals.*, 1856. — *Thamnastrea id.*, *ibid.*, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — Polypier convexe ; calices larges de 3 à 4 mill. ; murailles simples ; 44 cloisons alternativement inégales. — *Lias* : Hettange.

22. I. CONYBEAREI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 22, fig. 4, 1851. — Polypier subplane ; calices larges de 15 à 20 mill. ; 40 cloisons inégales et droites (type décaméral ?). — *Bajocien* : Comb-Down, près Bath.

23. I. GOURDANI, E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. géol. de France*, 2^e série, t. XIII, p. 861, 1856. — Polypier en masse étendue et subgibbeuse ; calices peu irréguliers et larges de 3 à 4 mill. ; cloisons assez épaisses, bien dentelées et assez écartées, on en compte 18 à 20 grandes, séparées par autant de petites ; l'épithèque qui couvre le plateau cache des côtes fines et forme des plis rayonnants et épineux. — *Portlandien* : Mantoche ; Gray-la-Ville (Haute-Saône).

24. I. JURENSIS, Etallon, *Etud. Pal.*, 1858. — Polypier massif et convexe ; calices larges de 3 1/2 mill., peu profonds et peu irréguliers ; 40 à 45 cloisons minces, droites, serrées. — *Corallien* : Valfin.

15. I. PARVA, Etallon, *loc. cit.* — Polypier arrondi et irrégulier ; calices larges de 2 à 2 1/2 millim. et assez profonds ; 40 cloisons minces, inégales et anastomosées. — *Corallien* : Valfin.

26. I. ETURBENSIS, E. de Fromentel, *Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 57, pl. 7, fig. 11, 1857. — Polypier en lame mince ; calices irréguliers et profonds ; 42 cloisons minces et finement dentées ; épithèque cachant des côtes fines et radiées. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

D. — dd. De 28 à 38 cloisons.

27. I. NEOCOMIENSIS, E. de Fromentel, *Desc. des Pol. foss. de l'étage Néocom.*, p. 57, pl. 8, 1857. — Polyp. étalé ; calices assez réguliers et superfi-

ciels : 36 cloisons bien développées et inégales ; les primaires se rencontrent au centre et y forment une fausse columelle. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

28. I. ORBIGNYI, Chapuis et Dewalque, *Mém. cour. par l'acad. de Belg.*, pl. 38, fig. 7, 1854. == Polypier convexe ; calices inégaux, larges de 4 à 8 mill. et assez profonds ; murailles minces et tranchantes ; de 20 à 38 cloisons droites, minces et inégales. — *Lias* : Jamoigne.

29. I. MONETA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Prionastrea id.*, d'Orbigny, *Prod.* == Polypier circulaire, fixé sur une coquille et légèrement convexe ; calices assez réguliers et larges de 6 à 8 mill. ; environ 36 cloisons fortes et débordantes. — *Bathonien* : Marquises ; Rumigny (Ardennes).

30. I. EXPLANULATA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 24, fig. 3, 1851. — *Astrea id.*, M'Coy, 1848. == Polypier subplane ; calices peu profonds et larges de 5 millim. ; murailles peu développées ; environ 36 cloisons minces, serrées, très-inégales et régulièrement dentées. — *Bajocien* : Comb-Down, près Bath ; Dundry.

31. I. ? ORNATA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Prionastrea id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. == Environ 36 cloisons épaisses, surtout en dehors ; les primaires et les secondaires subégales, les autres minces et plus étroites. — *Bajocien* : Langres ; Morey.

32. I. CONDEANA, Chapuis et Dewalque, *loc. cit.*, pl. 38, fig. 8, 1854. == Polypier convexe ; calices inégaux et larges de 6 à 8 mill. ; environ 30 cloisons grandes et petites, droites et un peu débordantes. — *Lias inférieur* : Arlon ; Hettange.

33. I. ? MOSENSIS, Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1851. — *Confusastrea id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Agariria rotata*, Michelin, *Icon.*, pl. 22, fig. 6 (non Goldfuss). == Polypier subplane et mince ; calices assez réguliers, peu profonds et larges de 9 à 10 mill. ; environ 30 cloisons minces, peu inégales et un peu flexueuses ; les 6 primaires ont leurs faces latérales plissées. — *Corallien* : Eix (Meuse) ; Lifol (Vosges).

34. I. DICTYOPHORA, Reuss, *Denk. der Wien. Akad.*, 1854. == Polypier subconvexe ; calices serrés, irréguliers et larges de 4 à 5 millim. ; murailles minces et crénelées ; de 24 à 36 cloisons minces, inégales, dentées et plus développées de 4 en 4. — *Turonien* : Gosau.

35. I. OBLONGA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.* — *Brit. foss. corals.*, pl. 12, fig. 1, 1851. — *Lithostrotion oblongum*, Fleming, 1831. — Morris, 1843. — *Astrea tisburyensis*, Fitton, 1843. == Polypier en masse élevée ; polypières assez régulièrement polygonaux et larges de 5 à 6 millim. ; cloisons droites ou courbées ; souvent les plus jeunes se courbent vers les plus anciennes et s'y unissent, on en compte de 28 à 30 par calice. — *Portlandien* : Tisbury (Wiltshire) ; Mantoche ; Gray-la-Ville (Haute-Saône).

36. I. LIMITATA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 23, fig. 2 et pl. 24, fig. 4-5, 1851. — *I. limitata, alimena et Luciensis, id., ibid.* — *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea limitata*, Lamouroux, in Michelin, *Icon.*, pl. 54, fig. 10, 1846. — M'Coy, 1848. == Polypier subgibbeux ou convexe ; calices inégaux et larges de 3 à 5 mill. ; murailles très-minces ; de 20 à 38 cloisons serrées, minces et légèrement courbées. — *Bathonien* : Luc ; Ranville ; Langrune ; Bath ; Marquises ; Rumigny ; Harancourt, près Sedan ; Champlitte (Haute-Saône).

37. I. HELIANTHOIDES, Edwards et Haime, *Hist. nat. des corals.*, p. 339, 1836. — *Astrea id. et oculata*, Goldfuss, pl. 22, fig. 4^a et 2. — *Fu-*

vastrea id., Blainville, 1830. — *Astrea* id., Rømer, 1835. — Milne-Edwards, 1836. — Bronn, 1835-37. — Michelin, *Icon.*, pl. 21, fig. 3, 1843. — Quenstedt, 1853. — *Prionastrea Rathieri* et *Centrastrea oculata*, d'Orbigny, 1850. = Polypier à surface plane ou convexe; calices assez réguliers peu profonds, creux au centre et larges de 8 à 9 mill.; 28 cloisons inégales, minces, un peu flexueuses et régulièrement dentées. — *Corallien* : Giengen; Natheim; Lindenberg; Stenay; Lifol; Tournus; Dun; Ecommoy; Tonnerre; Nantua; Rødersdorf; Champlitte.

E. — Trois cycles cloisonnaires seulement.

30. I. FOLIACEA, E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. géol. de France*, 2^e série, t. XIII, p. 861. = Polypier en masse foliacée, présentant des expansions peu épaisses et souvent couvertes de calices sur l'une et l'autre face; ceux-ci sont assez réguliers et larges de 5 à 6 mill.; de 18 à 24 cloisons épaisses en dehors, minces en dedans, serrées et régulièrement dentées. — *Portlandien* : Mantoche; Maison-Rouge (Haute-Saône).

39. I.? VENUSTA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea* id., Munster, *Beit. zur Petref.*, pl. 2, fig. 17, 1841. = Polypier petit et comprimé; 24 cloisons subégales. — *Saïférien* : Saint-Cassian.

40. I. DISSIMILIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *I. Langrunensis*, *ibid.* *Astrea dissimilis*, Michelin, *Icon.*, pl. 54, fig. 12, 1845. — *Dendrastrea dissimilis* et *Langrunensis*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier lobé et subdendroïde; calices assez réguliers et larges de 3 à 4 mill.; de 20 à 24 cloisons minces et inégales. — *Bathonien* : Luc; Langrune.

41. I. RICHARDSONI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, pl. 20, fig. 1, 1851. = Polypier plane ou gibbeux; 24 cloisons minces, inégales et un peu courbées; 6 primaires plus développées que les autres. — *Bajocien* : Dundry.

42. I. GUETTARDI. — *J. Guettardiana*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Prionastrea Guettardiana*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Astrea formosissima*, Michelin, *Icon.*, pl. 6, fig. 24 (non Sowerby). = Polypier convexe ou gibbeux; calices peu profonds et larges de 3 à 4 mill.; cloisons minces et peu inégales; 3 cycles, le dernier presque toujours incomplet. — *Turonien* : Uchaux.

43. I. PORTLANDICA. — *Stylocœnia* id., E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. géol.*, *loc. cit.* = Polypier à surface subplane ou gibbeuse; calices petits, assez réguliers et larges de 2 à 3 mill.; 12 grandes cloisons et 12 petites; elles sont minces, très-inégales et assez écartées; les premiers échantillons que nous avons étudiés étaient altérés et la décomposition du calcaire avait engendré aux angles de certains calices de petites colonnes qui nous firent prendre ce fossile pour une Stylocœnie; depuis de nouveaux matériaux bien conservés nous ont fait voir que ce caractère n'existe réellement pas et que ce fossile est une Isastrée bien caractérisée. — *Portlandien* : Noiron (Haute-Saône).

Espèces douteuses.

44. I. TENERA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II. 1856. — *Astrea* id., Sowerby, 1853. — *Turonien* : Gosau.

45. I. MICHELINI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Montastrea* id., Blainville, 1830. — Fossile de....?

MM. Edwards et Haime rapportent encore (*Pol. foss. des terr. Pal.*) au

genre *Isastræa* les fossiles suivants, cités par A. d'Orbigny, dans son *Prodrome*, mais sans descriptions suffisantes.

46. *PRIONASTREA BLANDINA*. — *Corallien* : Poizat; Oyonnax; Saint-Mihiel, etc.

47. *PRIONASTREA CABANETIANA*. — *Corallien* : Oyonnax; Angoulême.

48. *PRIONASTREA GRANDIFLORA*. — *Turonien* : Soulage.

49. *PRIONASTREA INFUNDIBULUM*. — *Néocomien* : Chenay.

50. *PRIONASTREA LIGERIENSIS*. — *Sénonien* : Saint-Christophe (Indre-et-Loire).

51. *PRIONASTREA TOMBEKIANA*. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

51. *PRIONASTREA GRACILIS*. — *Néocomien* : Fontenoy.

52. *PRIONASTREA ICAUNENSIS*. — *Néocomien* : Chenay.

53. *PRIONASTREA MUTABILIS*. — *Néocomien* : Chenay.

59. *PRIONASTREA SUPRACRETACEA*. — *Sénonien* : Falaise.

60. *CONFUSASTREA EXCAVATA*. — *Corallien* : Wagnon.

61. *PRIONASTREA GRANDIS*. — *Corallien* : La Rochelle; île de Ré, etc.

62. *PRIONASTREA STRIATA*. — *Corallien* : Ecommoy (Sarthe).

63. *PRIONASTREA ANGUSTATA*. — *Corallien* : Saulce-aux-Bois; Tonnerre.

64. *PRIONASTREA CORALLINA*. — *Corallien* : Saulce-aux-Bois; Nantua.

65. *PRIONASTREA DUBIA*. — *Corallien* : Wagnon.

M. Reuss a encore figuré (*Zwei Polyp. aus den Hallstätter Schichten*. — *Dencks. d. k. akad. d. Wiss.*, etc., 1855) un fossile qui présente des calices polygonaux, larges de 12 à 15 mill.; on compte environ de 24 à 42 cloisons, suivant l'étendue des calices; elles sont irrégulières, inégales et souvent anastomosées au centre deux à deux ou trois à trois; 6 ou 10 seules vont au centre. Cette espèce qui provient du Muschelkalk de Hallstatt a reçu le nom d'*ISASTREA SALINARIA*. — Ce fossile a quelque analogie avec celui qui sert de type au genre *Amphiastrea*.

Nous devons encore mentionner ici deux espèces nouvelles qui viennent de nous être communiquées par M. Martin de Dijon.

I. *BURGUNDIÆ*. — Polypier en cylindre élevé et terminé par une surface convexe, calices peu irréguliers, larges de 2 1/2 à 3 mill. et séparés par des murailles minces; cloisons bien développées et assez épaisses; on en compte 8 grandes, 8 petites et quelques autres rudimentaires. — *Corallien* : Selongey.

I. *MARTINI*. — Polypier gibbeux; calices irréguliers, assez profonds et larges de 3 à 4 mill.; cloisons assez épaisses, dentées régulièrement, serrées et inégales; on en compte 24 par calice; les murailles sont minces et peu indiquées. — *Corallien* : Selongey.

GENRE CXXVII. — AMPHIASTRÆA.

Amphiastrea, Etallon, *Etud. Pal. sur le Haut-Jura*, 1858.

Polypier massif et élevé, composé de polypierites prismatiques et soudés par l'épithèque; murailles couvertes de grosses côtes qui ne s'unissent que rarement avec celles des polypierites voisins;

l'épithèque adhère très-peu aux côtes, ce qui permet de détacher assez facilement les polypières ; les calices sont polygonaux et ordinairement quadrangulaires ; les cloisons sont minces, écartées et inégales ; 5 d'entre elles placées d'un même côté sont plus développées que les autres et dépassent le centre du calice ; les traverses sont rares, épaisses et courbées ; la gemmation se fait sur le bord du calice.

A. BASALTIFORMIS, Etallon, *loc. cit.*, 1858. == Polypier massif, à surface subplane ; calices polygonaux à fossette excentrique ; cloisons minces au nombre de 30, une plus forte franchit les 2/3 de l'espace calicinal ; gemmation intracalicinale. Diam. des calices, 7 mill. — *Coralien* : Valfin.

GENRE CXXVIII. — ASTROCÆNIA.

Astrocænia, Edwards et Haime, *Compt. rend. de l'Acad. des sc.*, 1848.

Astrea (pars), Goldfuss, *Petref. Germ.*, 1826.

Goniastrea, *Enallocænia*, *Actinastrea*, d'Orbigny, *Not. sur les Pol. foss.*, 1849.

Polypier massif, composé d'individus soudés directement par les murailles qui sont prismatiques ; calices polygonaux ; columelle styliforme, plus ou moins saillante ; cloisons assez épaisses, peu nombreuses et dentelées, surtout près de la columelle ; point de palis.

Jusqu'à ces derniers temps les Astrocenies ont passé pour n'avoir pas les cloisons dentées, mais en 1854, M. Reuss a figuré des espèces avec des cloisons garnies de dents et nous avons nous-même constaté ce caractère sur les Astrocenies de l'étage Néocomien et les avons ainsi figurées dans la description que nous en avons donnée en 1857.

Les Astrocenies appartiennent aux trois types décaméral, octoméral et hexaméral.

A. — Type décaméral.

1. A. DECAPHYLLIA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.* — Reuss, *Denks. der Wiener Akad.*, pl. 8, fig. 4-6, 1854. — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 72, fig. 1, 1847. — *Astrea reticulata (pars)*, Goldfuss, pl. 38, fig. 1^a et d. == Polypier branchu ; calices larges de 3 mill. ; 10 grandes cloisons et 10 petites. — *Turonien* : Corbières ; Gosau.

2. A. NUMISMA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1849. — *Astrea id.*, Defrance, 1826. — Milne-Edwards, 1856. — Michelin, pl. 62, fig. 1, 1846. — *Goniastrea id.*, d'Orbigny, 1849-1850. == Polypier discoïde, à plateau couvert d'une forte épithèque ; calices, très-régulièrement polygonaux et larges de 1 1/2 millim. ; 10 grandes cloisons et 10 petites. — *Bajocien* : Gap ; Nice.

3. A. COMPRESSA, E. de Fromentel, *Desc. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 45, pl. 6, fig. 7-8. == Polypier pédiculé : épithèque forte

et plissée; 20 cloisons inégales, épaisses et dentées; murailles minces et présentant au sommet la figure d'un zig-zag par suite de l'alternation des grandes cloisons. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

4. A. REGULARIS, E. de Fromentel, *loc. cit.*, pl. 6, fig. 3-4, 1857. = Polypier en lames peu épaisses et étendues; calices réguliers, peu profonds et larges de 1 1/2 à 2 mill.; 20 cloisons inégales. — *Néocomien* : Saint-Dizier; Gy-l'Evêque.

5. A. MINIMA, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 47, 1857. = Polypier en lames gibbeuses; columelle forte et soudée aux cloisons; 10 grandes cloisons, 10 petites. Diam. des calices, 1 à 1 1/2 millim. — *Néocomien* : Gy-l'Evêque; Saint-Dizier.

B. — *Type octoméral*. — b. *Polypier massif*.

6. A. KONINCKI, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1849. — *Astrea formosa*, Michelin, *Icon.*, pl. 71, fig. 5 (non Goldfuss). — *Astrocaenia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Astrocaenia magnifica*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 8, fig. 1-3, 1854. = Polypier convexe ou gibbeux; calices assez profonds, à bords simples et en arêtes et larges de 2 ou 3 mill.; 8 grandes cloisons et 8 petites. — *Turonien* : Corbières; Gosau.

7. A. ORBIGNYI. — *A. Orbignyana*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1849. — *Astrea formosissima*, Michelin, *Icon.*, pl. 72, fig. 5, 1847. — *Astrocaenia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — Polypier convexe, en forme de couches superposées; calices peu profonds et larges de 2 mill.; 16 cloisons larges, serrées, peu inégales. — *Turonien* : Gosau.

8. A. ORNATA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1849. — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 13, fig. 4, 1842. = Polypier gibbeux; calices peu profonds et larges de 2 à 2 1/2 millim.; 16 cloisons inégales; columelle forte; murailles épaisses et granulées. — *Falunien* : Turin.

9. A. TRIANGULARIS, E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. géol. de France*, 2^e série, t. XIII, p. 859, 1856. = Polypier subplane; calices le plus souvent triangulaires, assez profonds et larges de 3 mill.; ordinairement 40 cloisons très-inégales et alternativement grandes et petites; columelle profonde, assez saillante et bien développée. — *Portlandien* : Mantoche.

10. A. EXCAVATA, E. de Fromentel, *Descript. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 46, 1857. = Polypier en lames minces, à plateau couvert d'une forte épithèque; calices réguliers et profonds; 32 cloisons épaisses et alternativement grandes et petites; columelle forte et styloforme. — *Néocomien* : Saint-Dizier.

B. — bb. *Polypier arborescent*.

11. A. RETICULATA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1849. — Reuss, *loc. cit.*, pl. 14, fig. 13, 1854. — *Astrea id.*, (pars), Goldfuss, *Petref.*, pl. 38, fig. 10^{b-c} (non les autres). — *Astrea octolamellosa*, Michelin, *Icon.*, pl. 72, fig. 2, 1847. = Polypier branchu; calices subcirculaires, larges de 2 mill.; 16 cloisons inégales et épaisses. — *Turonien* : Corbières; Gosau.

12. A. RAMOSA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — Reuss, *loc. cit.*, pl. 8, fig. 10 et pl. 14, fig. 14. — *Astrea id.*, Michelin, pl. 72, fig. 4. — Sowerby, 1832. = Polypier branchu; calices larges de 1 1/2 millim.; 16 cloisons épaisses et très-inégales; rameaux assez grêles. — *Turonien* : Corbières; Gosau; Le Bausset; Figuières.

13. *A. TUBERCOLATA*, Reuss, *loc. cit.*, pl. 8, fig. 11-12, 1854. = Cette espèce diffère des précédentes par ses calices encore plus petits, ses murailles plus minces et ses cloisons moins épaisses. — *Turonien* : Gosau.

C. — Type hexaméral.

14. *A. CAILLAUDI*, Edwards et Haime, in d'Archiac, 1850. — *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Astrea id.*, Michelin, pl. 63, fig. 5, 1846. — *Porites elegans*, Leymerie, 1846. = Polypier convexe; calices peu inégaux, peu profonds et larges de 3 millim.; 18 cloisons un peu inégales, assez épaisses, serrées et subconfluentes (2 cycles $1\frac{1}{2}$). — *Parisien* : La Palare; Corbières.

15. *A. MAGNIFICA*, E. de Fromentel, *Desc. des Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 45, pl. 6, fig. 1-2, 1857 (non Reuss, 1854). = Polypier à surface convexe; plateau garni d'une forte épithèque, calices réguliers et assez profonds; columelle petite et styliforme; 36 cloisons dentées et inégales (3 cycles et la moitié du 4^e). — *Néocomien* : Gy-l'Evêque; Saint-Dizier.

16. *A. SUBORNATA*, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 46, pl. 6, fig. 5-6, 1857. — *Stephanocænia id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier convexe, subhémisphérique; calices réguliers et peu profonds; cloisons fortes et dentées, surtout près de la columelle; 24 cloisons inégales selon les ordres. — *Néocomien* : Gy-l'Evêque; Leugny.

17. *A. COTTEAUI*, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 46, 1857. — *Stephanocænia cottaldina*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier en masse élevée et arrondie; calices réguliers; columelle forte et styliforme; cloisons minces mais renflées au centre; 3 cycles et le commencement d'un 4^e (6 grandes cloisons, 6 + 2 moyennes, 12 + 2 petites). — *Néocomien* : Gy-l'Evêque; Leugny (Yonne).

18. *A. PULCHELLA*, Edwards et Haime, *Brit. foss. coral.*, pl. 5, fig. 3, 1850. = Polypier massif; polypières polygonaux ou subcirculaires, suivant qu'il sont plus ou moins rapprochés et larges de 2 millim.; 3 cycles; cloisons inégales, droites, peu saillantes et un peu épaisses en dehors. — *Parisien* : Bracklesham-Bay.

Espèces douteuses.

19. *A. TUBEROSA*, Edwards et Haime, 1856. — *Stephanocænia id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier gibbeux; calices inégaux, larges de 2 mill.; columelle forte; 3 cycles et des cloisons d'un 4^e. — *Bathonien* : Luc.

20. *A. MICROCOMA*, Edwards et Haime, 1856. — *Isastrea id.*, *id.*, *ibid.*, 1851. — *Prionastrea id.*, d'Orbigny, 1850. — *Corallien* : Neuvizi.

21. *A. SANCTI-MIHIELI*, d'Orbigny, 1850. — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 25, fig. 1, 1846. — *Corallien* : Saint-Mihiel; Meerin; Sampigny.

22. *A. CRASSO-RAMOSA*, Edwards et Haime, 1851. — *Astrea id.*, Michelin, pl. 25, fig. 2. — *Enalloccænia id.*, d'Orbigny, 1850. — *Corallien* : Saint-Mihiel; Maxey.

23. *A. GOLDFUSSI*, Edwards et Haime, 1851. — *Astrea geminata*, Goldfuss, pl. 13, fig. 8 c-c, 1826. — *Actinastrea Goldfussi*, d'Orbigny, 1850. — *Sénonien* : Maëstricht.

24. *A. PENTAGONALIS*, d'Orbigny, 1850. — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 38, fig. 12, 1829. — *Corallien* : Wurtemberg.

25. A. CORNUELI. — *A. Cornueliana*, d'Orbigny, 1850. — *Néocomien* : Saint-Dizier ; Venay ; Chenay ; Fontenoy ; Saint-Sauveur (Yonne).

26. A. CARANTONENSIS, d'Orbigny, 1850. — *Turonien* : Saint-Trojan.

27. A. PUNCTATA, Edwards et Haime, 1856. — *Isastrea id.*, *ibid.*, 1851. — *Prionastrea id.*, d'Orbigny, 1850. — *Corallien* : Wagnon ; Chatel-Censoir.

Nous avons réuni dans ce même genre des espèces ayant des cloisons dentées et d'autres qui semblent avoir ces organes entiers, parce que nous pensons que probablement toutes les espèces que nous venons d'indiquer ont des cloisons dentées, et que la mauvaise conservation des fossiles fait croire à des cloisons entières. Si cependant cette différence dans l'appareil cloisonnaire était un jour mise hors de doute, on devrait conserver le nom générique d'ASTROCÆNIA pour toutes les espèces à cloisons inermes, et nous proposons alors, pour les espèces à cloisons dentées, le nom de genre ENALLASTREA.

GENRE CXXIX. — ASTREA.

Astrea (pars), Lamarck, 1801. — Oken, 1815. — Edwards et Haime, 1856.

Siderastrea (pars), Blainville, 1830. — Edwards et Haime, 1848.

Siderina, Dana, 1846.

Polypier massif et convexe ; gemmation submarginale ; polypières soudés directement par les murailles ; calices polygonaux et assez profonds ; columelle papilleuse assez développée ; cloisons non confluentes, minces et dentées, surtout vers le centre ; traverses rares, peu développées et remplacées par de fortes granulations qui couvrent les faces latérales des cloisons et y simulent des syntactiques ; endothèque rare.

A. — Quatre cycles cloisonnaires.

1. A. CRENULATA, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 24, fig. 6. — Milne-Edwards, 1836. — Reuss, 1848. — *Siderastrea id.*, Blainville, 1830. — Edwards et Haime, 1850. = Polypier peu élevé, convexe ou subgibbeux ; calices larges de 5 à 6 mill. ; columelle bien développée ; cloisons peu inégales, crénelées, très-serrées et assez minces. — *Falunien* : Saucats ; Plaisance ; Bohème ; Hongrie.

L'A. FRÆHLICHIANA de M. Reuss, 1848, ne paraît pas différer sensiblement de l'espèce précédente. C'est un fossile de la basse Autriche.

2. A. FUNESTA, Brongniart, *sur les terr. du Vicentin*, pl. 5, fig. 16, 1823. — Michelin, *Icon.*, pl. 13, fig. 1, 1842. — *A. intercepta*, Michelotti, 1838. — *Siderastrea funesta*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1850. = Polypier convexe ; calices polygonaux, larges de 5 mill. ; cloisons serrées et peu inégales ; columelle rudimentaire. — *Parisien* : Val-de-Rouca ; Sinde.

B. — Trois cycles et des cloisons d'un quatrième.

3. A. ITALICA, DeFrance, *Dict.*, 1826. — *A. Bertrandiana*, Michelin, *Icon.*, pl. 74, fig. 5, 1847. — *Siderastrea italica*, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1850. = Polypier convexe ; calices assez réguliers et larges de 4 à 5 mill. ; environ 40 cloisons minces , serrées , inégales et anastomosées ; murailles très-minces. — *Falunien* : Manthelan.

4. A. PARISIENSIS, Edwards et Haime, *Hist. nat. des corall.*, 1856. — *Siderastrea id.*, *id.*, *ibid.*, *Ann. des sc. nat.*, 1840. — *A. crenulata*, Michelin, *Icon.*, pl. 44, fig. 1, 1844 (non Goldfuss). = Polypier arrondi ; calices assez réguliers et larges de 4 à 5 millim. ; 3 cycles et des cloisons d'un 4^e dans un ou deux systèmes. (La fig. 1^b pl. 44 de l'*Icon.* de M. Michelin, montre des calices qui renferment, par erreur, jusqu'à 50 cloisons.). — *Parisien* : Paris.

5. A. SAVIGNYI. — *A. Sarignyana*, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, 1856. — *Astrea galaxea*, Audoin, in Savigny, *Desc. de l'Egypte. Pol.*, pl. 5, fig. 1, 1824. = Polypier convexe ; calices larges de 3 à 5 mill. ; murailles minces et en arêtes vives ; 28 à 40 cloisons minces et fortement crénelées ; columelle peu développée. — *Fossile des dépôts récents de l'Egypte et habite encore la mer Rouge.*

GENRE CXXX. — PLERASTREA.

Plerastrea, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terres Pal.*. — *Hist. nat. des Coral.*, 1856.

Clausastrea id., *id.*, *Ann. des sc. nat.*, 1850 (non d'Orbigny).

Polypier massif ; genimation submarginale ; calices superficiels ; cloisons confluentes ; murailles polygonales ; traverses abondantes et bien développées ; columelle papilleuse.

Ce genre diffère du précédent par ses cloisons horizontales, ses calices superficiels et ses murailles moins développées.

1. P. SAVIGNYI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Clausastrea id.*, *id.*, *ibid.*, *Ann. des sc. nat.*, 1850. = Polypier turbiné et entouré d'une forte épithèque ; calices à peine concaves et larges d'environ 15 millim. ; columelle formée par les pointes redressées du bord interne des cloisons ; 24 cloisons minces , peu serrées et subconfluentes formant de petites saillies au-dessus des murailles qui sont peu visibles. — *Fossile des dépôts récents de la mer Rouge.*

2. P. PRATTI, Edwards et Haime, *Brit. foss. coral.*, pl. 22, fig. 5. 1851. = Polypier subconvexe ; calices inégaux et larges de 12 millim. ; environ 30 cloisons minces , serrées et anastomosées ; épithèque nulle. — *Bathonien* : Comb-Down, près Bath.

3. P. TESSELLATA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Clausastrea id.*, *id.*, *ibid.*, *Ann. des sc. nat.*, 1850 (non d'Orbigny). — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 45, fig. 2. = Polypier mince et subplane ; calices larges de 4 à 5 mill. ; 24 cloisons minces , inégales et géniculées en dehors. — *Parisien* : Aumont (Oise).

P. ROSACEA. — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 22, fig. 6, 1826. — Echantillon usé et spécifiquement indéterminable.

C'est à côté de ce genre qu'il faut placer le genre ASTREOMORPHA,

que M. Reuss a créé pour des fossiles de l'étage Turonien de Gosau. Voici les caractères qu'il assigne à ce genre nouveau :

Calices superficiels et irréguliers; cloisons irrégulières, inégales, peu nombreuses, grosses et peu dentées; columelle compacte et styliforme, quelquefois rudimentaire; les cloisons sont unies à la columelle au moyen de trabicules espacées régulièrement, et entre lesquelles se trouvent des traverses bien développées et disposées à la même hauteur dans toutes les chambres.

1. A. CRASSISEPTA, Reuss, *Beitr. zur charakt. des Kreides.*, etc., p. 127, pl. 16, fig. 5-7. = Polypier globuleux, irrégulier; 6 à 9 cloisons grosses, inégales et irrégulières; columelle styliforme bien développée; calices peu profonds et larges de 7 à 9 mill. — Turonien : Gosau.

2. A. GOLDFUSSI, Reuss, *loc. cit.*, pl. 8-9, 1854. = Polypier globuleux; calices irréguliers, larges de 2 à 3 mil.; de 10 à 16 cloisons grosses, inégales, souvent courbées et anastomosées; columelle petite et rudimentaire. — Turonien : Gosau.

XXVI^e Famille. — Astrangiens.

ASTRANGIACÉES (*pars*), Edwards et Haime, *Hist. nat. des Coral.*, 1856.

Polyastrées se multipliant par bourgeonnement basilaire; les polypières s'unissent entre eux à mesure qu'ils s'élèvent ou restent disposés à la surface d'une production basilaire commune, qui constitue des lames, à la surface desquelles se montrent les calices droits ou inclinés.

GENRE CXXXI. — ASTRANGIA.

Astrangia, Edwards et Haime, *Comptes-rendus de l'Acad. des sc.*, 1848.

Polypier submassif; polypières courts et unis par des expansions basilaires minces et granulées; murailles nues et costulées au pourtour des calices; columelle papilleuse; cloisons minces, débordantes, et subégales; elles sont bien dentées et souvent courbées; calices subcirculaires assez profonds; traverses bien développées.

Les Astrangies appartiennent à l'époque actuelle; c'est avec doute qu'on a rapporté à ce genre les fossiles suivants :

1. A.? MARYLANDICA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, 1856. — *Astrea id.*, Conrad, *Journal of the nat sc.*, etc., 1842. = Polypier encroûtant; polypières prismatiques, soudés par les murailles et larges de 5 mill.; 12 cloisons inégales. — Falunien : James-River; Virginia, etc.

2. A.? BELLA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Conrad, *loc. cit.* — *Columnastrea sexradiata*, Lonsdale, 1845. = Polypier convexe; calices prismatiques larges de 5 millim.; 24 cloisons inégales; minces et anastomosées. — Falunien : James-River; Newbern; Petersburg.

A.? AMERICANA, d'Orbigny, *Prod.*, 1852. — Falunien : île de Wight.

GENRE CXXXII. — PHYLLANGIA.

Phyllangia, Edwards et Haime, *Compt. rend. de l'acad. des sc.*, 1848.

Polypier submassif; polypiérites courts et souvent unis par les côtes qui sont assez développées; calices circulaires et assez profonds; columelle rudimentaire ou nulle; cloisons débordantes, granulées et peu denticulées; les primaires ont généralement le bord supérieur inerme.

P. CONFERTA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1850. = Polypier subastréiforme; calices serrés, mais à peine déformés, ne se soudant que rarement par leur muraille et larges de 3 mill.; 24 cloisons minces en dedans; les primaires à bord entier, les tertiaires courbées vers les secondaires. — *Falunien*: Touraine.

Ce genre et le précédent offrent des polypiérites libres à la surface d'une expansion basilaire et se rapprochent ainsi des Rizangiens parmi les Disastrées Apores; mais la brièveté des polypiérites et leur union très-fréquente, nous on engagé à les placer parmi les Polyastrées.

GENRE CXXXIII. — CLADANGIA.

Cladangia, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851.

Polypier de nature feuilletée; polypiérites unis par des expansions murales qui s'étendent sans interruption à diverse hauteur entre les individus; côtes peu développées; columelle papilleuse; cloisons larges, granulées et à bord supérieur lobé.

1. C. CRASSI-RAMOSA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, 1856. — *Oculina id.*, Michelin, pl. 74, fig. 8, 1847. — *Astrelia id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Polypier presque rameux à cœnenchyme serré; calices inégaux, larges de 5 millim. et peu élevés; 36 cloisons minces, dentées surtout au centre où les dents simulent une columelle, côtes peu prononcées et larges. — *Falunien*: Manthelan; Sainte-Maure.

2. C. SEMISPHERICA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, DeFrance, 1826. — Michelin, *Icon.*, pl. 74, fig. 6. — *Astrelia id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Polypier convexe; calices inégaux, assez saillants et serrés, mais restant circulaires; les grands calices ont de 7 à 8 mill. de diam.; columelle déprimée, papilleuse et bien développée; 24 cloisons minces, subégales, finement dentées et alternant avec un nombre égal de cloisons rudimentaires; intervalles calicinaux presque lisses. — *Falunien*: Manthelan.

3. C. PERFORATA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 74, fig. 3, 1847. = Polypier convexe; calices inégaux, saillants, serrés et larges de 6 à 7 mill.; côtes fines; 48 cloisons minces et inégales. — *Falunien*: Manthelan; Sainte-Maure.

4. C. TURONENSIS. — *Astrelia id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1852. = Cette espèce paraît différer du *C. crassi-ramosa* par des calices plus petits. — *Falunien*: Manthelan.

GENRE CXXXIV. — PLEUROCÆNIA.

Pleurocænia, d'Orbigny, *Note sur les Pol. foss.*, 1849.

Latusastrea, *id.*, *ibid.*

Polypier mince, étalé; calices disposés sur une expansion basilaire commune et tous inclinés d'un même côté et dans une direction opposée au point de départ de l'accroissement; les calices sont semi-circulaires et présentent un bord en forme de lèvre saillante.

1. *P. ALVEOLARIS*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, 1851. — *Explanaria id.*, Goldfuss, pl. 38, fig. 6. — Quenstedt, pl. 38, fig. 13, 1852. — *Latusastrea id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Lamé assez mince; calices inégaux, larges de 3 à 4 mill.; on compte sur le bord libre, qui représente la moitié du calice, 12 côtes fines et subégales. — *Corallien* : Natheim.

2. *P. PROVINCIALIS*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850 = Cette espèce a été établie sur un échantillon très-altéré qui possède des calices larges de 2 millimètres. — *Turonien* : Uchaux (Vaucluse).

XXVII^e Famille. — Genabaciens.

FUNGINÆ (pars), Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, 1851.

Loges interseptales divisées par des synapticules; cloisons bien développées; muraille ou plateau basilaire perforé ou rudimentaire.

GENRE CXXXV. — GENABACIA.

Genabacia, Edwards et Haime, *Comptes-rendus de l'Acad. des sc.*, 1849.

Polypier lenticulaire, formé d'un parent central entouré d'une ou de plusieurs séries de calices; cloisons bien développées et confluentes; muraille nulle; plateau rudimentaire.

Les espèces de ce genre ont quelque ressemblance de forme avec les Dimorphocénies et les Dimorphastrées.

1. *G. STELLIFERA*, Edwards et Haime, *Brit. foss. coral.*, 1850. — D'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Fungia id.*, d'Archiac, 1843. — *Cyclolites stelliferus*, Bronn, 1848. = Polypier lenticulaire et libre, à surface inférieure concave au centre, et à surface supérieure fortement convexe; calice central ayant 40 cloisons fines, égales, serrées, confluentes et régulièrement dentées; 20 cloisons seulement dans les calices en séries. — *Bajocien* : Marquise; Quincy; Sponville, etc.

2. *G. SANCTI-MIHIELI*, Edwards et Haime, *Rech. sur les Polypiers.* = Polypier petit, circulaire; calice central possédant 40 cloisons alternativement inégales; 14 ou 16 cloisons seulement dans les autres calices; le polypier est large de 15 mill. et haut de 10. — *Corallien* : St-Mihiel.

XXVIII^e Famille. — Cyathoseriniens.

LOPHOSERINÆ (pars) Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 125, 1851.

Chambres divisées par des synapticules; plateau commun; ni échinulé, ni perforé.

GENRE CXXXVI. — POLYPHYLLOSERIS.

Polyphylloseris, E. de Fromentel, *Pol. foss. de l'étage Néocomien*, p. 67, 1857.

Polypier massif de forme convexe; polypiérites unis par le développement des côtes; calices circulaires élevés en dômes à la surface du polypier, et présentant à leur centre une fossette ronde et bien marquée; cloisons nombreuses, dentelées, anastomosées et réunies par des synaptiques bien développées; plateau commun couvert d'une forte épithèque plissée, et qui cache des côtes fines et nombreuses.

1. P. CONVEXA, E. de Fromentel, *Desc. des Pol. de l'étage Néocomien*, p. 61, pl. 11-12-13, 1857. — *Polyphyllastrea* id., d'Orbigny, *Prod.* = Polypier en masse arrondie; calices peu saillants et assez larges; fossette calicinale bien marquée; 76 cloisons fines, alternativement grandes et petites et régulièrement dentées; épithèque épaisse et plissée. — *Néocomien*: Gy-l'Evêque; Chenay; Fontenoy (Yonne).

2. P. ICAUNENSIS, E. de Fromentel, *loc. cit.* — *Polyphyllastrea*, id., d'Orbigny, *Prod.* = Polypier en grandes frondes; calices assez élevés; environ 60 cloisons fines, confluentes, anastomosées et fortement dentées; plateau recouvert par une épithèque pelliculaire qui recouvre des côtes très-fines. — *Néocomien*: Gy-l'Evêque; Fontenoy (Yonne).

C'est probablement à ce genre qu'il faudra rapporter les deux fossiles que nous avons déjà signalés sous les noms de *Thamnastræa Toucasana* et *provincialis*, et qui sont des *Polyphyllastrées* pour A. d'Orbigny.

GENRE CXXXVII. — CYATHOSERIS.

Cyathoseris, Edwards et Haime, *Comptes-rendus de l'Acad. des sc.*, 1849.

Polypier trochoïde, adhérent; calices superficiels mais bien distincts; cloisons longues, épaisses et très granulées; plateau nu, strié et formant quelquefois des plis qui se traduisent à la surface calicinale par des bourrelets.

1. C. INFUNDIBULIFORMIS, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, 1850. — *Pavonia*, id., Blainville, 1830. — *Agaricia*, id., Michelin, *Icon.*, pl. 43, fig. 12. = Polypier en forme de coupe évasée, à bords lobés et repliés en dedans; calice central plus grand que les autres et présentant une columelle papilleuse; environ 20 cloisons par calice. Polypier haut de 3 à 4 centim. — *Parisien*: Auvert; Valmondois.

2. C. VALMONDOISIACA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Meandrina*, id., Michelin, *Icon.*, pl. 43, fig. 13. — *Oudophyllia*, id., d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier trochoïde, à bord replié en dedans et formant des collines que séparent des séries de calices. — *Parisien*: Valmondois; Assy; Bouconwillers.

3. C.? HAIDINGERI, Reuss, *Mém. de l'Acad. de Vienne*, pl. 20, fig. 7-8. = Polypier en coupe; calices égaux, irréguliers, larges de 7 à 8 mill.; cloisons épaisses et bien dentées. — *Turonien*: Gosau.

4. C. ? RARISTELLATA, Reuss, *loc. cit.*, pl. 20, fig. 9, 1854. = Polypier subplane; calices écartés et unis par des côtes bien développées et flexueuses; 24 rayons septo-costaux épais, serrés et dentés. — *Turonien* : Gosau.

GENRE CXXXVIII. — PROTOSERIS.

Protoseris, Edwards et Haime, *Brit. foss. Coral.*, 1851.

Polypier fixé, constitué par des lames assez minces, lobées et pliées en cornet; le plateau est couvert de stries costales très fines; les calices sont superficiels et ont des cloisons confluentes; columelle papilleuse.

P. WALTONI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 103, pl. 20, fig. 1, 1851. = Polypier en lames peu épaisses, pliées en cornet et partant d'un point central et adhérent; les calices sont petits, espacés, peu profonds et placés sur une surface unie; ils renferment 30 à 40 rayons septo-costaux dont la moitié seulement arrive au centre du calice. — *Corallien* : Osmington (Angleterre); Champlitte (Haute-Saône).

M. Etallon nous a communiqué le fossile suivant, qu'il a déterminé, et qui, s'il ne rentre pas dans le genre précédent, devra probablement faire partie de certaines *Thamnastrées* qui, comme nous l'avons dit, ont beaucoup d'analogie avec les polypiers qui composent la famille des *Cyathoseriniens* ou des *Poritiniens*.

THAMNOSERIS INCRUSTANS. = Polypier en lames peu épaisses, adhérentes, mais sans pédoncule; surface supérieure légèrement convexe; calices profonds, réguliers; cloisons épaisses, confluentes, peu inégales, droites et se partageant en 5 ou 6 faisceaux, les tertiaires et les secondaires se soudent à celles d'un ordre supérieur; 3 cycles et le commencement d'un 4^e; columelle papilleuse, étroite; épithèque mince; diamètre du polypier, 5 centim.; hauteur, 7 à 8 mill.; diamètre des calices, 2 mill. — *Callorien* : Chaumont (Saint-Claude).

SOUS-ORDRE III. — ZOANTHAIRES PERFORÉS.

Polypier composé essentiellement de cœnenchyme poreux; les cloisons sont quelquefois bien développées, mais peuvent aussi n'être représentées que par des trabicules ou des tigelles épineuses; la loge et les chambres sont généralement ouvertes dans toute la hauteur du polypier; les murailles sont bien développées, mais toujours elles sont perforées.

Monastrées perforées.

XXIX^e Famille — Eupsammiens.

Eupsamidae (pars), Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 3^e série, t. X, p. 65, 1848.

Polypiers simples; cloisons bien développées et inégales; les primaires égales entre elles, celles du dernier cycle courbées vers celles du cycle précédent; point de cœnenchyme.

GENRE CXXXIX. — STEPHANOPHYLLIA.

Stephanophyllia, Michelin, *Dict. des sc. nat.*, supplém., t. I, p. 484, 1841.

Polypier libre et discoïde; muraille horizontale dépourvue d'épithèque; calices circulaires; cloisons larges, élevées, très granuleuses et se soudant par leur bord interne, à l'exception des six primaires; côtes fines, droites, rayonnantes et correspondant aux intervalles des cloisons.

A. — Fosse calicinale bien marquée.

1. S. ELEGANS, Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 2, 1841. — *Fungia*, id., Bronn, 1837. = Polypier discoïde; muraille bien perforée; côtes fines et granuleuses; columelle papilleuse; 7 ordres de cloisons, disposées en 6 faisceaux par suite des soudures des cloisons qui sont séparées par les 6 cloisons primaires; diamètre du polypier, 12 millim. — *Falunien*: Tortone.

2. S. DISCOIDES, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 93, 1849. — *Id.*, *ibid.*, *Brit. foss. corals.*, pl. 6, fig. 3, 1851. = Cette espèce diffère de la précédente par sa forme plus petite et plus aplatie; elle a 5 mill. de diamètre et 1 de hauteur. — *Parisien*: Haverstock-Hill.

3. S. AGARICOIDES, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Fungia*, id., Risso, *Hist. nat. de Europ. mer.*, pl. 9, fig. 52, 53, 1826. — *S. Imperialis*, Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 1. = Polypier circulaire, large de 3 millim., à fosse centrale bien marquée; environ 40 cloisons élevées, inégales, dentées et anastomosées; plateau couvert d'une centaine de stries granuleuses et souvent perforées. — *Parisien*: Astesan.

4. S. NYSTI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, 1851, p. 35 (voyez la note). = Côtes fines et granuleuses, alternativement grandes et petites et correspondant à 6 cycles; diamètre du polypier, un pouce; hauteur, 5 lignes 1/2 (d'après Edwards et Haime). — *Falunien*: Anvers.

B. — Fosse calicinale rudimentaire ou nulle.

5. S. SUECICA, Michelin in Edwards et Haime, 1849. — *Discosporammia*, id., d'Orbigny, *Prod.* = Polypier lenticulaire; muraille finement tronée; 3 cycles de cloisons inégales et anastomosées; hauteur, 3 millim.; diamètre, 6. — *Sénonien*: Ignaberga (Suède).

6. S. BOWERBAUKI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 9, fig. 4, 1851. — *Discosporammia*, id., d'Orbigny, *Prod.* = Polypier petit, discoïde et large de 9 millim.; 96 cloisons régulièrement inégales et anastomosées; plateau fortement perforé suivant des lignes rayonnantes. — *Cénomani*: Douvres; Orcher.

GENRE CXL. — ENDOPACHYS.

Endopachys (pars) Lonsdale, 1845. — Edwards et Haime, *Ann.* 1848.

Polypier droit, comprimé à la base, où il présente une carène qui fait suite à des appendices aliformes développés sur les côtes latérales; calice ovale; columelle spongieuse; cloisons nombreuses

et granulées; celles du dernier cycle plus développées que celles du pénultième; murailles nues; côtes droites, granuleuses et très développées sur les parties latérales.

E. MACLURII, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 1848. pl. 1, fig. 1^a. — *Turbinolia*, id., Lea, 1853. = Polypier haut de 25 millim., large de 25 sur 14; côtes fortes et couvertes de gros grains oblongs; cloisons larges, serrées, minces et épaisses près de la columelle. — *Parisien* : Alabama.

GENRE CXLI. — EUPSAMMIA.

Eupsammia, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 3^e série, t. X, p. 77, 1848,

Polypier turbiné, libre et sans appendices costaux; columelle inégalement développée; cloisons nombreuses, larges, serrées et peu débordantes; celles du dernier cycle plus développées que celles de l'antépénultième; muraille nue; côtes distinctes depuis la base et subégales; cinq cycles de cloisons.

1. E. TROCHIFORMIS, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 1, fig. 8. — *Madrepore*, id., Pallas, 1769. — *Turbinolia elliptica*, Brogniart, 1808. — De-france, 1828. — Michelin, pl. 43, fig. 6, 1844, etc. = Polypier en cône allongé; calice elliptique large de 20 millim. sur 16; les cloisons primaires et secondaires subégales, les autres plus petites et droites. — *Parisien* : Paris; Louvain.

2. E. BAYLIANA, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Cette espèce diffère de la précédente par ses cloisons plus minces et plus anastomosées; sa hauteur est de 25 millim. et sa largeur est de 19 sur 16. — *Parisien* : Grignon.

Cette espèce n'est probablement qu'une variété de la précédente.

3. E. SISMONDII. — *E. Sismondiana*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1848. — *Turbinolia*, id., Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 13, 1841. = Polypier peu élevé, convexe en dessous, haut de 25 millim., large de 20 sur 18; cloisons très-serrées et peu minces. — *Fatunien* : Turin.

4. E. BROGNIARTI. — *E. Brogniartiana*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 1, fig. 7. = Polypier en cône atténué et comprimé inférieurement; cloisons minces et serrées; côtes serrées et légèrement vermicellées; hauteur, 25 millim.; largeur du calice, 20 sur 14. — *Parisien* : Grignon.

MM. Edwards et Haime rapportent encore à ce genre les deux fossiles suivants :

5. E. HALEANA, d'Orbigny, in Edwards et Haime, 1848. = Cette espèce paraît peu différer des *E. trochiformis* et *E. bayliana*. — *Parisien* : Grignon.

6. E. BURTINI. — *E. Burtinana*, Edwards et Haime. *Pol. foss. des terr. pal.* — *Madrepore fungite simple*, Burtin, *Oryct. de Bruxelles*, pl. 5, fig. D. — *Turbinolia elliptica*, Nyst, *Coq. et pol. foss. de Belg.* — *Parisien* : Bruxelles.

GENRE CXLII. — BALANOPHYLLIA.

Balanophyllia, Searles Wood, *Ann. and Mag. of hist. nat.*, 1844.

Polypier largement fixé ou simplement pédicellé; columelle spongieuse et bien développée; cloisons minces, serrées; celles du der-

nier cycle sont plus développées que celles de l'antépénultième; côtes serrées, subégales; épithèque peu développée.

A. — *Polypier largement fixé.* — B. — *Epithèque forte.*

a. — *Cinq cycles de cloisons.*

1. B. CALICULUS, S. Wood, *loc. cit.* — Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 1, fig. 3. = Polypier court, subcylindrique; épithèque bien développée; calice ovalaire; columelle peu développée; diamètre du calice et hauteur du polypier, 25 millim.; les cloisons sont minces, larges et anastomosées. — *Falunien* : Sutton.

A. — B. aa. — *Quatre cycles de cloisons.*

2. B. CYLINDRICA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, 1849. — *Turbinolia*, *id.*, Michelotti, 1838 et 1847. — Michelin, *Icon.*, pl. 8, fig. 15, 1841. = Polypier en cône allongé et légèrement courbé; épithèque assez élevée; côtes granuleuses; calice circulaire, large de 10 millim.; hauteur du Polypier, 30 millim. — *Falunien* : Turin.

A. — BB. — *Epithèque rudimentaire.*

b. — *Cinq cycles de cloisons.*

3. B. ITALICA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Caryophyllia*, *id.*, Michelin, pl. 9, fig. 15. = Polypier turbiné, droit et comprimé près du calice qui a 14 millim. sur 10 de largeur; côtes serrées et inégales en épaisseur; columelle peu développée; cloisons, minces, crénelées et perforées; hauteur du polypier, 15 millim. — Fossile dans le terrain subapennin d'Asti, et vit encore dans les mers actuelles.

4. B. DESMOPHYLLUM, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Brit. foss. corals*, pl. 6, fig. 1, 1851. = Polypier droit, subturbiné et un peu comprimé à la base; calice ovalaire, large de 8 millim. sur 5; côtes granuleuses; columelle spongieuse peu développée; cloisons minces, arquées et très-granuleuses, hauteur du polypier, 15 millim. — *Parisien* : Blacklesham-Bay.

5. B. TENCISTRIATA, Edwards et Haime, *Ann.*, 3^e série. — *Brit. foss. corals*, p. 36, 1851. = Cette espèce diffère de la précédente par des côtes moins épaisses et par sa forme plus arrondie. — *Parisien* : Paris.

A. — BB. — bb. — *Quatre cycles de cloisons.*

6. B. GENICULATA, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat., loc. cit.*, p. 87. — *Caryophyllia*, *id.*, d'Archiac, *Mém. de la Soc. géol.*, 2^e série, t. XI, pl. 7, fig. 7^a, 1846. = Polypier subcylindrique, allongé et légèrement courbé dans son milieu; calice large de 9 millim.; côtes serrées et granuleuses; épithèque rudimentaire; cloisons peu épaisses et s'anastomosant vite. — *Parisien* : Port-des-Basques.

AA. — *Polypier pédicellé et pouvant devenir libre par les progrès de l'âge.*

7. B. PRELONGA, Edwards et Haime, *Ann., loc. cit.* — *Turbinolia*, *id.*, Michelotti, 1838 et 1847. — Michelin, *Icon.*, pl. 9, fig. 1. = Polypier en cône allongé et courbé à la base; épithèque nulle; calice subovalaire,

large de 25 millim.; côtes serrées, égales et à peu près droites; cloisons assez épaisses et très-larges; hauteur du polypier, 59 millim. — *Falunien*: Turin; Anvers.

8. B. GRAVESI, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Turbinolia*, *id.*, Graves, 1847. — Michelin, *Icon.*, pl. 13, fig. 7, 1844. = Cette espèce diffère de la précédente par des côtes plus développées et saillantes; son calice est large de 13 millim. sur 10, et sa hauteur est de 35 millim. — *Parisien*: Verneuill-les-Aulnay; Hennonville (Oise).

Disastrées perforés.

XXX^e Famille. — Disaréens.

Polypier constitué par un sclérenchyme réticulé et trabiculaire; les cloisons sont bien développées, mais composées seulement de trabicules ou de tigelles placées en séries très rapprochées et soudées ensemble; la muraille est tout-à-fait rudimentaire; il paraît qu'il existe une épithèque très-mince qui couvre des côtes fines et serrées.

GENRE CXLIII. — DISARÉA.

Polypier branchu, formé de polypières qui prennent naissance assez bas sur la tige première, et s'élèvent ensuite en s'écartant très peu; cloisons très nombreuses et très fines; la partie calicinale des polypières est convexe, arrondie, et présente une fossette ronde au centre; la muraille est rudimentaire ou nulle, et les côtes paraissent quelquefois recouvertes d'une épithèque mince; les nodules qui composent les tigelles des cloisons se soudent entre eux de distance en distance, et envoient à droite et à gauche des poutrelles qui se soudent aux nodules des cloisons voisines; les deux espèces qui composent ce genre offrent à peu près la composition organique des *Microsolena*.

1. D. COTTEAU. = Polypier formant des touffes peu élevées et épaisses. Le bourgeonnement a lieu au bord du calice ou sur le calice lui-même; les polypières restent libres dans une grande étendue et présentent des étranglements surtout vers la partie supérieure; calice rond ou légèrement ovale, superficiel, convexe avec une dépression arrondie au centre; 96 cloisons très-fines, inégales, serrées et souvent anastomosées; diamètre des polypières, 12 à 15 mill.; hauteur du polypier, 40 à 50 mill. — *Corallien*: Châtel-Censoir (Yonne).

2. D. GRACILIS. = Polypier formant des touffes moins élevées et plus serrées que dans l'espèce précédente. Bourgeonnement fréquent et ayant lieu à la même hauteur; le même polypière peut donner naissance à 9 ou 10 individus également développés; les cloisons et les côtes sont nombreuses et encore plus fines que dans l'espèce précédente; diamètre du polypière, 8 à 9 millim.; hauteur du polypier, environ 40 millim. — *Corallien*: Châtel-Censoir (Yonne).

XXXI^e Famille. — Dendrophylliens.

EUPSAMMIDÆ (*pars*), Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, 3^e série, t. X, p. 65, 1848.

Polypier branchu. présentant des murailles bien développées et criblées de trous; cloisons principales larges, formées de lames parfaites ou peu perforées.

GENRE CXLIV. — LOBOPSAMMIA.

Lobopsammia, Edwards et Haime, *Ann.*, *loc. cit.*, 1848.

Polypier se multipliant par fissiparité; polypières devenant libres de bonne heure; calices irréguliers; columelle spongieuse; cloisons peu débordantes, serrées; celles du dernier cycle plus développées que celles de l'antépénultième; côtes vermicellées, non saillantes; épithèque rudimentaire.

L. CARIOSA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Lithodendron cariosum*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 13, fig. 7. — *Dendrophyllia et Lobophyllia Parisiensis*, Michelin, *Icon.*, pl. 43, fig. 10-11. = Polypier à rameaux courts et épais; 4 cycles bien développés; calice irrégulier, large d'environ 8 millim.; côtes fines et vermicellées. — *Parisien*: Auvert; Valmondois.

GENRE CXLV. — DENDROPHYLLIA.

Dendrophyllia, de Blainville, *Dict. des sc. nat.*, 1850.

Polypier se multipliant par bourgeonnement et formant un ensemble dendroïde, calices ovalaires et profonds; columelle assez bien développée, saillante et spongieuse; cloisons peu débordantes, minces, serrées; celles du dernier cycle plus développées que celles du pénultième; épithèque nulle; côtes vermicellées, non saillantes et devenant droites dans le voisinage des calices.

1. D. TAURINENSIS, Edwards et Haime, *Ann. des sc. nat.*, *loc. cit.* — *D. ramea*, Michelin, *Icon.*, pl. 10, fig. 8, 1842. = Polypier en tronc dressé présentant 5 séries verticales de calices; ceux-ci sont larges de 8 millim.; les côtes sont granuleuses, et le polypier est haut de 90 mill. — *Falunien*: Turin.

2. D. DIGITALIS, Blainville, *loc. cit.* — Michelin, *Icon.*, pl. 10, fig. 10, 1842, et pl. 74, fig. 4. = Cette espèce diffère de la précédente par ses calices qui n'ont que 5 à 6 millim. de diamètre; les côtes sont aussi plus fines et plus saillantes; 5 cycles dans l'étoile terminale, 4 dans les autres; hauteur du polypier, 10 à 15 millim. — *Falunien*: Touraine.

3. D. AMICA, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 4, fig. 9. — Michelotti, *Sérém.*, pl. 3, fig. 5, 1828. — *D. irregularis et coringera*, Michelin, *Icon.*, pl. 10, fig. 9, et pl. 10, fig. 10, 1842. = Polypier en touffe serrée; polypières allongés et cylindroïdes; 5 cycles; cloisons larges, serrées et minces; columelle bien développée et saillante; épithèque basilaire; calices larges de 11 à 13 millim. — *Falunien*: Turin; Lethen.

4. D. DENDROPHYLLOIDES, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Brit. foss. corals*, pl. 6, fig. 2. = Axe droit donnant naissance à des polypières

épars et saillants; 4 cycles de cloisons assez minces; diam. des calices, 4 millim. — *Parisien*: Blacklesham-Bay.

5. *D. IRREGULARIS*, Blainville, *loc. cit.* — *D. Theotdolvensis*, Michelin, *Icon.*, pl. 74, fig. 3, 1847. = Polypier encroûtant; polypières verticaux et parallèles réunis par un cœnenchyme, assez développés mais libres dans une certaine étendue; 5 cycles de cloisons étroites et épaisses à leur bord interne; columelle forte; calices larges de 13 mill.; épithèque pelliculaire. — *Fatunien*: Dax; Doué.

GENRE CXLVI. — STEREOPSAMMIA.

Stereopsammia, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, 1850.

Polypier composé, s'accroissant par gemmation basale; polypières courts, soudés par la base et libres dans le voisinage des calices; ils sont unis inférieurement par le développement des côtes; columelle rudimentaire ou nulle; cloisons peu ou point débordantes; celles du dernier cycle moins développées que celles du pénultième; côtes serrées et interrompues.

S. HUMILIS, Edwards et Haime; *loc. cit.*, pl. 5, fig. 4. = Polypier formé de polypières, saillant et large de 2 millim.; 48 cloisons inégales selon les ordres; les primaires se soudent au centre et y forment une fausse columelle; côtes minces, vermicellées et interrompues. — *Parisien*: Blacklesham-Bay.

Syrtrastrées perforés.

XXXII^e Famille. — Latiméandraréens.

Polypier constitué par des cloisons formées de tigelles serrées et épineuses, comme chez les *DISARÉENS*, mais présentant à la surface calicinale des vallées formées par des calices en séries, et séparées par des collines plus ou moins saillantes et arrondies au sommet; murailles rudimentaires.

GENRE CXLVII. — LATIMCEANDRARÆA.

Latimæandraræa, E. de Fromentel, *Catal. ined. des Pol. foss. de l'Yonne*, 1856. — E. de Fromentel, *in Etallon; Etud. pal. sur le Haut-Jura*.

Meandraræa, Etallon, *loc. cit.*

Polypier en masse subplane ou lobée; calices peu profonds, bien indiqués et placés entre des collines assez élevées, mais dont le sommet est arrondi; cloisons poutrellaires présentant la structure des *Disaræa* et des *Microsolena*; une coupe en travers ne fait voir aucune trace de muraille; les cloisons sont confluentes, et la columelle rudimentaire; épithèque mince, mais bien développée.

1. *L. CORALLINA*. = Polypier en lames étendues et peu épaisses; collines assez larges, élevées et disposées d'une manière irrégulièrement concentrique; calices superficiels à fossette peu profonde; on compte de 18 à 22 cloisons par calice; elles sont épaisses, présentent à la partie

supérieure des lobes serrés, et sont inégales; 6 ou 8 seules arrivent au centre; rayons septo-costaux confluent, dirigés dans le même sens et passant sans interruption par-dessus les collines; les centres calicinaux sont espacés de 5 à 7 millim. dans le sens des séries, et de 10 à 12 dans l'autre sens; les lames sont épaisses de 10 à 14 millim. — *Corallien* : Châtel-Censoir (Yonne).

2. L. COTTEAUL. — Polypier en lames épaisses de 25 à 30 millimètres, collines élevées, assez étroites et peu régulières; calices très-superficiels, à peine déprimés au centre, et larges de 4 millim.; environ 32 cloisons par calice, 8 arrivent seules au centre (type octoméral); les rayons septo-costaux arrivent au sommet des collines, mais là ne se soudent pas aux rayons septo-costaux correspondants; il en résulte au sommet des collines une ligne de démarcation fine, mais visible; les collines sont épaisses de 4 millim. — *Corallien* : Châtel-Censoir (Yonne).

3. L. MARCONANA. — *Meandrea*, id., Etallon, loc. cit. — Polypier élevé, lobé et convexe; calices disposés en séries longues, contournées au centre et droites à la circonférence; environ 20 cloisons par calice; largeur des séries, 1 1/2 à 2 millim. — *Corallien* : Valfin.

4. L. SULCATA. — *Meandrea*, id., Etallon, loc. cit. — Polypier en lames peu épaisses; séries longues, parallèles et larges de 2 millim.; 46 cloisons par calice; ceux-ci sont peu profonds, mais à centres distincts; collines droites; épithèque forte. — *Corallien* : Valfin.

5. L. CEREBRIFORMIS. — *Meandrea*, id., Etallon, loc. cit. — Polypier en lames plus ou moins épaisses; séries courtes, larges de 3 millim. et dirigées vers la circonférence; 36 cloisons minces, serrées, parallèles sur les collines et ondulées ailleurs. — *Corallien* : Valfin.

Polyastrées perforés.

XXXIII^e Famille. — Madréporiens.

MADREPORINÆ, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, p. 140, 1851.

Polypier se multipliant par bourgeonnement; cœnenchyme abondant et spongieux; les murailles sont très peu distinctes du cœnenchyme et très poreuses; loges divisées en deux chambres par deux grandes cloisons opposées et plus développées que les autres.

GENRE CXLVIII. — MADREPORÆ.

Madrepora (pars), Linné, *Syst. nat.*, 1767. — Lamarck, *Hist. des anim. sans vert.*, 1816.

Polypier formant des masses ramifiées ou lobées; cœnenchyme assez lâche et échinulé; calices assez saillants; muraille épaisse et très poreuse; cloisons non débordantes; calices saillants, à bords épais et à ouverture petite; columelle nulle.

1. M. LAVANDULINA, Michelin, *Icon.*, pl. 14, fig. 1. — Polypier en tiges minces; polypières assez saillants, inclinés et larges de 2 à 2 1/2 millim.; on compte 24 côtes au bord du calice. — *Falunien* : Turin; Dax.

2. M. EXARATA, Michelin, pl. 14, fig. 3. — Polypier en tige cylin-

droïdes ; polypières peu saillants, peu inclinés et larges de 2 millim.; calices ronds, larges de 1 1/2 mill.; ils sont entourés d'un cercle ponctué qui sépare la muraille du cœnenchyme. — *Falunien* : Turin.

3. M. SOLANDERI, Michelin, *Icon.*, pl. 45, fig. 7. = Polypier branchu; calices inégaux, inclinés et larges de 1 à 2 1/2 millim. L'échantillon sur lequel on a fondé cette espèce est très altéré. — *Parisien* : Auvert; Valmondois.

4. M. ORNATA, Michelin, *Icon.*, pl. 43, fig. 17. = Polypier en branches grêles, portant des polypières saillants et inclinés; côtes fines; calices larges de 2 millim. et assez écartés. Cette espèce voisine du *M. Lavandulina*, en diffère par ses côtes plus fines et ses calices plus larges. — *Parisien* : Paris.

5. M.? DEFORMIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Heliopora id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 45, fig. 6. = Polypier en buisson épais; calices superficiels, larges de 1/2 à 1 millim.; ils sont inégaux et serrés; il paraît y avoir 12 cloisons. — *Parisien* : Auvert; Valmondois.

XXXIV^e Famille. — Turbinariens.

TURBINARINÆ, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. Pal.*, 1851.

Polypier se multipliant par gemmation; cœnenchyme très abondant, mais distinct du tissu mural; il est réticulé et spongieux; loge divisée au moins par six cloisons également développées.

GENRE CXLIX. — TURBINARIA.

Turbinaria, Oken, 1815. — *Explanaria (pars)*, Lamarck, 1816. — *Gemmipora*, Blainville, 1830.

Polypier foliacé; cœnenchyme abondant, assez dense et échinulé; cloisons subégales; columelle spongieuse et bien développée.

T. CYATHIFORMIS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Gemmipora id.*, Blainville, 1830. — Michelin, *Icon.*, pl. 13, fig. 8 a, b. = Polypier subturbiné à surface convexe ou lobée; calices ronds, peu serrés et larges de 2 millim.; la columelle est forte, bien développée; les cloisons serrées, assez minces, et les côtes sont légèrement flexueuses et subégales. — *Falunien* : Turin; Dax.

GENRE CL. — ACTINACIS.

Actinacis, d'Orbigny, *Note sur les Pol. foss.*, 1849.

Polypier formé d'un cœnenchyme granuleux, bien perforé, assez dense et très développé; cloisons subégales et débordantes; columelle papilleuse ou compacte; palis bien développés.

1. A. MARTINI. — *A. Martinana*, d'Orbigny, *loc. cit.* — Reuss, *Beitr. zur charak. der Kreide.*, 1854, pl. 24, fig. 12-15. = Polypier subdendroïde; calices ronds, peu serrés, marginés et larges de 1 1/2 millim.; 24 cloisons subégales; palis ronds et bien développés; on n'en compte que 6 (Reuss, pl. 24, fig. 13); columelle compacte en haut; côtes vermiculées, courtes et séparées par des sillons perforés. — *Turonien* : Gosau.

2. A. ELEGANS, Reuss, *loc. cit.*, pl. 24, fig. 16-18. = Calices subcirculaires, assez saillants, peu serrés et larges de 2 à 2 1/2 mill.; 24 cloisons égales et crénelées; palis inégaux et arrondis; côtes courtes, irrégulières

et séparées par des sillons largement perforés. — *Turonien* : Gosau, Rontograben.

3. A. HAUERT, Reuss, *loc. cit.*, pl. 8, fig. 13-14. = Polypier subrameux; calices peu saillants, assez espacés et larges d'un peu moins d'un millim.; 18 cloisons subégales et épaisses; columelle compacte; 6 palis arrondis et bien développés; côtes vermiculées et séparées par des sillons bien marqués (d'après Reuss). — *Turonien* : Gosau; Nefgraben.

GENRE CLI. — ASTREOPORA.

Astreopora, Blainville, *Dict.*, t. LX, p. 348, 1830.

Polypier massif; cœnenchyme formé d'un tissu lâche et très échinulé; cloisons inégales; columelle nulle.

1. A. ASPERRIMA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 141. — *Gemmipora id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 45, fig. 5. = Polypier sublamelleux; calices circulaires, marginés et larges de 3 millim.; 2 cycles de cloisons inégales. — *Parisien* : Auvert; Valmondois.

2. A. PANICEA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Michelin, pl. 44, fig. 11. = Polypier peu épais et étendu; calices ronds, serrés, marginés et larges de 1 à 1 1/2 millim.; 6 cloisons égales; cœnenchyme très-poreux. — *Parisien* : Auvert; Valmondois.

3. A. SPHEROIDALIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 44, fig. 9^a. = Polypier subturbiné, à surface convexe; calices assez serrés, circulaires et larges de 5 à 6 mill.; épithèque basale bien développée. — *Parisien* : Environs de Paris.

Les figures 9 b-c n'appartiennent pas à cette espèce.

GENRE CLII. — DENDRACIS.

Dendracis, Edwards et Haime, *Comp. rend. de l'Acad. des sc.*, 1849.

Polypier dendroïde; cœnenchyme dense et granulé à la surface; calices saillants; cloisons peu inégales et peu nombreuses; columelle nulle.

D. GERVILLII, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Brit. foss. corals*, 1851. — *Madrepora id.*, DeFrance, *Dict. des sc. nat.* — Michelin, *Icon.*, pl. 45, fig. 8. = Polypier en rameaux arrondis et larges de 7 à 9 mill.; calices saillants, submammiformes et larges de 1 millim.; cloisons peu développées et subégales; côtes fortes et peu flexueuses. — *Parisien* : Hauteville (Manche).

XXXV^e Famille. — Poritiniens.

PORITINE, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Cœnenchyme nul ou tout à fait rudimentaire.

GENRE CLIII. — HOLARCEA.

Holarcea, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, t. XXIX, 1849. — *Brit. foss. corals*, 1851.

Calices subpolygonaux; cloisons représentées par des trabicules irrégulières; columelle fasciculaire et petite.

H. PARISIENSIS, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 7, fig. 2. — *Alveolites id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 45, fig. 10. = Polypier encroûtant et enveloppant des tiges petites; calices petits, irréguliers, larges de 1 à 1 1/2 millim.; cloisons peu indiquées et représentées par des lignes vermicellées; columelle fasciculaire petite, mais bien développée. — *Paristen*: Grignon; Parme; Barton.

GENRE CLIV. — PORITES.

Porites (pars) Lamarck, *Hist. nat. des anim. sans vert.*, p. 267, 1826. — Edwards et Haime, *Compt. rend.*, t. XXIX, p. 258, 1849.

Polypier composé de sclérenchyme réticulé; calices peu profonds; cloisons peu nombreuses et petites; palis bien développés; épithèque rudimentaire ou nulle.

1. P. INCRUSTANS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.* — *Astrea*, *id.*, DeFrance, 1830. — *Porites Collegniana*, Michelin, *Icon.*, pl. 13, fig. 9. = Polypier subplane; calices polygonaux assez réguliers et larges de 1 1/2 à 2 millim.; 18 à 24 cloisons inégales et assez développées. — *Falunien*: Turin; Bordeaux.

2. P.? STELLULATA, Reuss, *Beitr. zur charak.*, etc., pl. 13, fig. 9-10, 1854. = Polypier subdendroïde; rameaux larges de 10 à 15 mill.; calices petits, superficiels, peu serrés et larges de 1 millim.; de 6 à 7 cloisons épaisses; columelle ronde et compacte; palis indistincts (d'après Reuss). — *Thuronien*: Gosau.

3. P.? MAMILLATA, Reuss, *loc. cit.*, pl. 10, fig. 9-10. = Polypier en masse mamelonnée; calices très-petits et très-superficiels; tubercule columellaire assez développé; 18 à 24 cloisons bien développées, confluentes, serrées et se continuant avec les palis qui sont peu marqués. — *Thuronien*: Gosau.

GENRE CLV. — RHODARÆA.

Rhodaræa, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, t. XXIX, 1849. — *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier ayant des murailles épaisses et assez élevées; cloisons peu développées; palis larges et saillants; épithèque forte.

R. RAULINI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 145, 1851. = Polypier massif, peu élevé et subplane; épithèque bien développée; murailles assez épaisses et présentant un léger sillon à leur sommet; calices subcirculaires, larges de 5 à 6 mill.; 3 cycles de cloisons minces, serrées et un peu débordantes; 6 palis gros et saillants situés devant les cloisons secondaires. — *Falunien*: Dax.

GENRE CLVI. — PROTARÆA.

Protaræa, Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1849 et 1851.

Polypier ayant les murailles assez épaisses, perforées et présentant aux angles des calices de petites colonnes saillantes; cloisons bien développées; columelle et palis nuls.

1. P. VETUSTA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 14, fig. 6. — *Porites id.*, Hall, 1847. — *Astreopora id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypier encroûtant; calices égaux, larges de 1 1/2 à 2 mill.; 12 cloisons subégales

et amincies au centre. — *Silurien* : Oxford ; Cincinnati ; Madison ; Trenton ; Jefferson, etc.

2. P. VERNEUILI, Edwards et Haine, *loc. cit.*, = Cette espèce diffère de la précédente par ses calices larges de 3 millim., et par ses cloisons minces et peu inégales. — *Silurien inf.* : Alexanderville (Ohio).

GENRE CLVII. — MICROSOLENA.

Microsolena, Lamouroux, *Exp. met. des gen. de pol.*, 1811.

Alveopora, Michelin, 1843 (non Quoy et Gaimard).

Dendraræa, d'Orbigny, *Note sur les pol. foss.*, 1849. — *Dactylastrea*, *ibid.*

Polypier constitué par des cloisons confluentes, larges et formées de tigelles écartées et épineuses ; muraille nulle ; point de palis ; la partie supérieure des cloisons ressemble à une ligne ponctuée ; épithèque plus ou moins développée sur le plateau commun ; ordinairement elle est forte et plissée.

A. — De 70 à 80 cloisons par calice.

1. M. AGARICIFORMIS, Etallon, *Etud. pal. sur le Haut-Jura.* = Polypier subturbiné, à surface plane : calices très-superficiels, peu distincts, assez réguliers et larges de 6 à 7 mill. ; 70 à 80 cloisons, et quelquefois 96 par calice ; elles sont flexueuses, disposées en faisceaux et rayonnantes. — *Corallien* : Valfin.

2. M. PULVINATA, Etallon, *loc. cit.* = Polypier digitiforme, à rameaux cylindriques ; calices serrés, polygonaux, peu profonds et larges de 4 à 5 millim. ; 72 cloisons serrées, égales, confluentes, géniculées en dehors ; diamètre des tiges, 10 à 15 millim. — *Corallien* : Valfin.

B. — De 50 à 66 cloisons.

3. M. TENUISTRIATA, E. de Fromentel, *Catal. des pol. foss. de l'Yonne*, 1857. = Polypier en masse arrondie, presque sphérique ; calices tout à fait superficiels ; fossette calicinale à peine marquée ; cloisons très-fines, formées de grains régulièrement espacés et assez écartés ; on en compte 66 par calice ; 24 seulement arrivent jusqu'au centre ; diamètre des calices, 6 à 7 millim. — *Corallien* : Coulanges (Yonne).

4. M. GRANDIFLORA, E. de Fromentel, *loc. cit.* = Polypier pédiculé et s'étendant en lames assez épaisses ; calices larges de 15 à 20 millim. ; cloisons très-minces, très-géniculées et assez espacées ; on en compte 56 par calice, et la plus grande partie atteint le centre ; les primaires sont formées de tigelles plus épaisses que les autres. — *Corallien* : Coulanges (Yonne).

5. M. PAVONIA, Etallon, *loc. cit.* = Polyp. turbiné et pédiculé, à surface supérieure plane ou concave ; calices superficiels, peu distincts, à fossette profonde, assez égaux et larges de 6 à 8 millim. ; 60 à 64 cloisons minces, serrées et droites. — *Corallien* : Valfin.

6. M. CATENATA, Etallon, *loc. cit.* = Polypier dendroïde, à rameaux aplatis et à surface bossuée ; calices superficiels, larges de 3 à 3 1/2 mill. ; environ 60 cloisons fines et peu flexueuses ; largeur des tiges, 10 à 25 millim. ; hauteur, 10 centim. — *Corallien* : Valfin.

7. *M. TENUIRADIATA*, Etallon, *loc. cit.* == Polypier petit, dressé ou lobé; calices superficiels, larges de 5 millim.; espace columellaire creux et arrondi; 50 à 60 cloisons serrées, égales, peu flexueuses, assez écartées et radiées. — *Corallien* : Valfin.

C. — De 36 à 48 cloisons.

8. *M. EXCAVATA*, Etallon, *loc. cit.* == Polypier en lame épaisse; calices profonds, égaux et larges de 5 millim.; 48 cloisons minces, serrées et régulières. — *Corallien* : Valfin.

9. *M. CORALLINA*. == Polypier pédiculé, à surface convexe; calices assez profonds, bien distincts et larges de 8 à 10 millim.; cloisons assez fines, régulièrement ponctuées, peu serrées et géniculées à leur point de rencontre avec les voisines; on en compte 42 par calice, dont 18 arrivent au centre. Les tigelles cloisonnaires les plus épaisses sont les plus éloignées du centre; hauteur du polypier, 40 à 50 millim. — *Corallien* : Champlitte.

10. *M. ROTATA*, E. de Fromentel, *loc. cit.* == Polypier en masse élevée et pédiculée; calices peu profonds, bien distincts et larges de 8 à 9 mill.; cloisons épaisses, très-lobées et un peu contournées; on en compte de 36 à 42 dont 12 seulement arrivent au centre; hauteur du polypier, 70 millim. — *Corallien* : Coulanges (Yonne).

11. *M. PORTLANDICA*, E. de Fromentel, *Bull. de la Soc. géol. de France*, 2^e série, t. XIII, p. 864, 1856. == Polypier en lames planes ou gibbeuses; calices superficiels, larges de 10 millim.; 26, 32 ou 42 cloisons droites, fasciculées et souvent anastomosées; les calices sont séparés d'un centre à un autre de 15 millim. — *Portlandien* : Mantoche; Gray-la-Ville (Haute-Saône).

12. *M. CONICA*, Etallon, *loc. cit.* == Polypier petit, étalé et fixé par un pédicule étroit et central; calices superficiels, peu distincts et larges de 2 1/2 millim.; 40 cloisons régulières et peu flexueuses. — *Corallien* : Valfin.

13. *M. GIBBOSA*, Etallon, *loc. cit.* == Polypier convexe et le plus souvent gibbeux; calices égaux, à fossette petite et larges de 4 à 5 millim.; 36 à 40 cloisons flexueuses et ondulées irrégulièrement; épithèque très-développée. — *Corallien* : Valfin.

D. — De 18 à 36 cloisons.

14. *M. IRREGULARIS*, d'Orbigny, *Prod.* — Etallon, *loc. cit.* — Edwards et Haine, *Ann.* 1849. — *Agaricia granulata*, Michelin, *Icon.*, pl. 23, fig. 1 (non Goldfuss). — *Centrastraea*, *id.*, d'Orbigny. — *Oroseris Sancti-Mihieli*, Edwards et Haine, 1849. == Polyp. turbiné, à surface supérieure plane; calices inégaux, profonds et larges d'environ 5 millim.; 24 à 36 cloisons grossières et irrégulières; épithèque basilaire complète et forte. — *Corallien* : Oyonnax; Valfin.

15. *M. POROSA*, Lamouroux, *Exp. méth.*, pl. 74, fig. 24, 25 et 26, 1821. — Bron, 1824. — DeFrance, 1824. — Blainville, 1834. — Milne-Edwards, 1836. — Edwards et Haine, 1849-51. — *Alveopora microsolen*, Michelin, *Icon.*, pl. 55, fig. 1, 1845. == Polypier turbiné et pédonculé; calices superficiels, indistincts, larges de 3 à 4 millim. et à fossette peu profonde; 18 à 24 cloisons peu flexueuses et peu serrées. — *Bajocien* : Caen.

16. *M. EXCELSA*, Edwards et Haine, *Ann des sc. nat.*, 1852. — *Siderastraea incrustata*, M'Coy, 1848 (non *Alveopora incrustata*, Michelin). —

M. excelsa, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 25, fig. 5, 1851. = Polypier en rameaux droits, cylindriques et digitiformes; calices superficiels, larges de 2 millim., à fossette petite; 18 à 24 cloisons subégales, minces, courbées et flexueuses en dehors. — *Bathonien* : Bath; Minchinhampton.

E. — *De 10 à 12 cloisons par calice.*

17. *M. TUBEROSA*, d'Orbigny, *Prod.* — *Alveopora id.*, Michelin, *Icon.* pl. 25, fig. 7, 1843. = Polypier gibbeux; calices bien distincts et larges de 3 millim.; 12 cloisons formées de tigelles aplaties. — *Corallien* : Saint-Mihiel.

18. *M. INCRUSTATA*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Alveopora id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 25, fig. 8, 1843. = Polypier dendroïde, rameaux subcylindriques, recouverts à leur base de rubans épithéliques. Les calices sont petits, superficiels et larges de 2 à 3 millim.; 10 à 12 cloisons subégales; diamètre des rameaux, 10 à 15 millim. — *Corallien* : Mecrin; Landeyron; Saint-Mihiel.

19. *M. RACEMOSA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Alveopora id.*, Michelin, pl. 25, fig. 6, 1843. — *Dendraræa id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1851. = Polypier dendroïde; rameaux cylindriques, divergents et larges de 20 millim.; calices superficiels, larges de 3 ou 4 millim., subpolygonaux et à fossette peu marquée; 12 cloisons inégales et formées de tigelles grosses et aplaties. — *Corallien* : Sampigny.

20. *M. EXPANSA*, Etallon, *loc. cit.* = Polypier en lames minces, épaisses, de 10 à 20 mill.; 12 cloisons minces, écartées et fines; diamètre des calices, 8 à 9 mill. — *Corallien* : Saint-Claude.

Espèces douteuses.

21. *M. SUBRAMOSA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Dactylastrea id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Corallien* : Châtel-Censoir; Pointe-du-Ché.

22. *M. GRANULATA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Actinoræa id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Agaricia id.*, Goldfuss, *Petref.*, pl. 38, fig. 4. = Cette espèce doit probablement rentrer dans le genre *Microsolena*; cependant s'il existe des palis autour d'une columelle papilleuse, comme la figure l'indique et comme l'a pensé A. d'Orbigny, il faudra garder pour ce fossile le nom générique d'*Actinaræa*, que lui a donné cet auteur. — *Corallien* : Natheim.

Nous avons cru devoir séparer du genre *Microsolena* les fossiles suivants, qui ont l'organisation interne des espèces de ce genre, mais qui, comme les *Dimorphocénies* et les *Dimorphastrées*, possèdent un parent central plus développé que les autres calices. Nous désignerons ces espèces sous le nom générique de *DIMORPHARÆA*.

1. *D. CONVEXA*. = Polypier en masse convexe; gemmation périphérique; calice central beaucoup plus grand que les autres qui se disposent circulairement autour de lui; fossette calicinale petite, mais bien marquée; cloisons fines et très-serrées; on en compte 108 dans le calice central et 36 seulement dans les autres; diamètre du calice central, 15 à 20 millim.; des autres calices, 8 à 10. — *Corallien* : Coulanges (Yonne).

2. *D. KÆCHLINI*. — *Microsolena id.*, J. Haime, *Lettres inédites*, 1855. = Polypier en lames minces, semi-circulaires, adhérentes par le centre;

calices superficiels; rayons septo-costaux confluent et tous dirigés dans le même sens, du centre à la demi-circonférence; calice central placé près de la corde que forme l'arc de la demi-circonférence, plus développé que les autres qui sont placés en demi-cercle autour de lui. Cloisons fines, régulièrement ponctuées, on en compte environ 32 par calice; le calice central en contient souvent davantage; épithèque complète et plissée. — *Corallien inférieur*: Champlitte (Haute-Saône); Chassigny (Haute-Marne); Belfort (Haut-Rhin).

C'est encore à ce genre qu'il faut rapporter le fossile que M. Römer a nommé *Anomophyllum Munsteri*. C'est encore une Microsolénie avec un parent central très-développé. Les échantillons sur lesquels on a nommé cette espèce (Römer, *Verstr. des Nord Deutschen Ool. geb.*, pl. 21, 1836) sont très-altérés et proviennent du terrain jurassique du Hanovre.

GENRE CLVIII. — LITHARÆA.

Litharæa, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, t. XXIV, p. 258, 1840.

Polypier submassif; sclérenchyme irrégulièrement réticulé: calices bien circonscrits et profonds; columelle spongieuse; cloisons bien développées surtout près de la columelle; point de palis.

1. L. WEBSTERI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 6, fig. 1 — *Astrea id.*, Bowerbank, 1840. — *Siderastrea id.*, Lonsdale in Dixon, 1850. = Polypier encroûtant et convexe; polypières soudés par les murailles ou réunis par un cœnenchyme spongieux; columelle forte et saillante; 3 cycles et des cloisons d'un 4^e; les cloisons sont minces, serrées, droites ou courbées; largeur des calices, 4 millim. — *Parisien*: Bracklesham-Bay; Dixon.

2. L. HEBERTI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 39, 1850. = Polypier en masse convexe, formé de couches superposées; calices polygonaux peu profonds et larges de 3 millim.; 12 cloisons subégales, très-poreuses, à bord supérieur dentelé et très-granulées latéralement. — *Parisien*: Auvert; Valmondois; Hauteville.

3. L. BELLULA, Edwards et Haime, *Recher. sur les pol.*, 1852. — *Astrea id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 44, fig. 2, 1844. = Polypier convexe; calices inégaux, polygonaux et larges de 1 1/2 à 2 millim.; columelle peu développée; 16 cloisons peu inégales et faiblement flexueuses. — *Parisien*: Auvert; Parnes; Valmondois.

4. L. DESHAYESI. — *L. Deshayesana*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Porites id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 45, fig. 4. = Cette espèce, voisine de la précédente, paraît en différer par ses murailles peu marquées et ses cloisons plus largement perforées. — *Parisien*: Parnes; Auvert.

5. L. AMELIANA, Edwards et Haime, *Rech. sur les polyp.*, p. 37. — *Astrea id.*, DeFrance, 1826. — Michelin, *Icon.*, pl. 44, fig. 3. — *Astrea muricata*, Goldfuss, pl. 24, fig. 3. — Milne-Edwards, 1836. = Polypier convexe, oblong et fixé sur des tiges molles de fucus, comme l'indique l'ouverture centrale dont il est perforé; calices polygonaux larges de 3 à 4 mill. et assez profonds; 28 cloisons minces, dentées, serrées, très-granulées et peu inégales. — *Parisien*: Ronca; Grignon.

6. L. GRAVESI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Astrea crispa*, Michelin, *Icon.*, pl. 44, fig. 7, 1844 (non Lamouroux). == Polypier libre et convexe; calices polygonaux larges de 3 ou 4 millim., à bords minces et saillants; columelle peu développée; 24 cloisons minces, dentées et anastomosées. — *Parisien* : Guise-Lamotte.

7. L. DESNOYERSI, Edwards et Haime, *Rech. sur les polyp.*, 1853. == Polypier en masse dendroïde et lobée; calices polygonaux, larges de 4 millim., à bords minces et crénelés; 18 à 20 cloisons minces, subégales, dentées, droites ou courbées. — *Parisien* : Hauteville.

8. L. RAMOSA, Edwards et Haime, *loc. cit.* == Polypier en rameaux divergents; calices polygonaux, larges de 2 à 3 millim.: 12 cloisons subégales, minces en dedans, épaisses et géniculées en dehors. — *Falunien* : Dax.

GENRE CLIX. — PLEURODICTYUM.

Pleurodictyum, Goldfuss, *Petref. Germ.*, 1829.

Polypier massif, épithèque recouvrant complètement le plateau; murailles simples, bien perforées; cloisons formées de poutrelles rapprochées.

P. PROBLEMATICUM, Goldfuss, *loc. cit.*, pl. 38, fig. 18. — Bronn, 1835-1837. — Phillips, 1841. — De Verneuil et J. Haime, 1850. — Edwards et Haime, 1851. == Cette seule espèce n'est connue que par un moule ordinairement fixé sur un corps serpuliforme; calices polygonaux larges de 3 à 5 millim.; 20 à 28 cloisons poutrelles assez développées. — *Dévonien* : Nehou; Eifel; Grune; Aléje; Torquay, etc.

Nous devons encore mentionner ici un genre très-douteux qui a été établi sur un fossile de Maëstricht, c'est le genre *Dictyophyllia*, Blainville, *Dict. des sc. nat.*, qui probablement fait partie de la famille des Montiporiens (*MONTIPORINÆ*, Edwards et Haime, *Recherches sur les polyp.*).

On ne connaît que l'espèce qui a été figurée par M. Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 21, fig. 5, et qui porte le nom de *Dictyophyllia reticulata*, que lui a donné Blainville.

SOUS-ORDRE IV. — ZOANTHAIRES TABULÉS.

Polypiers composés de murailles bien développées, loge divisée transversalement par des planchers qui la séparent en une série d'étages; appareil septal peu développé et ne dépendant jamais du type tétraméral.

Monastrées tabulés.

Pas de représentants.

Disastrées tabulés.

XXXVI^e Famille. — Syringoporiens.

HALYSITINÆ (pars), Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier fasciculé; polypiérites libres, ou unis par des tubes de connexion, ou par des expansions murales; cloisons petites mais distinctes; murailles bien développées et non poreuses.

GENRE CLX. — SYRINGOPORA.

Syringopora, Goldfuss, *Petref. Germ.*, t. I, p. 75, 1826.

Harmodites, Fischer, 1828.

Polypier fasciculé; polypiérites longs, cylindriques et unis par des tubes de connexion horizontaux; planchers bien développés et infundibuliformes; épithèque bien développée.

1. *S. DISTANS*, Lonsdale in Murchison, 1845. — Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 20, fig. 1. — *Harmodites distans, ramosa, stotonifera*, Fischer, 1828, 1830. — *H. catenatus*, de Koninck, 1842. — Michelin, *Icon.*, pl. 60, fig. 6. = Polypiérites allongés, un peu contournés, larges de 1 à 2 1/2 mill.; tubes de connexion petits et espacés de 5 à 6 mill.; les polypiérites sont éloignés les uns des autres de 4 à 6 mill. — *Carboniférien*: Sablé; Tournay; Vise; Primosa, etc.

2. *S. CANCELLATA*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 15, fig. 2. — *Harmodites cancellatus et elegans*, Eichwald, 1829. = Polypiérites flexueux, larges de 2 millim.; tubes de connexion peu développés par suite du resserrement des polypiérites. — *Silurien supérieur*: Groningue (Lithuanie).

3. *S. BIFURCATA*, Lonsdale, *loc. cit.* — *Id. reticulata*, id. — *Harmodites catenatus* (pars), Geinitz. — *H. bifurcata*, d'Orbigny, *Prod.* = Polypiérites droits, larges de 1 1/2 à 2 1/2 millim., distants de 3 à 4 millim.; tubes de connexion gros, un peu ascendants et distants de 5 millim. — *Silurien*: Dudley; Cleedon-Hill; Gothland, etc.

4. *S. PARALLELA*, Lonsdale, *loc. cit.* — *Harmodites id., radians, confusa, parallelus*, Fischer, 1828, 1837. = Polypiérites serrés, longs, larges de 1 1/2 millim.; tubes de connexion nombreux et distants de 2 millim. — *Carboniférien*: Sablé; Hinsck; Perimishel; Petschora; Vitegra, etc.

5. *S. TABULATA*, Van Cleve, *Mss.* — Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 15, fig. 3. = Polypiérites longs, droits, rapprochés et larges de 1 millim. et pouvant s'unir par des expansions murales; tubes de connexion distants de 2 millim. — *Silurien sup.*: Baldknob; Scott-County. — *Dévonien*: Chutes de l'Ohio; Delaware.

La présence de cette espèce dans deux terrains doit donner des doutes sur l'identité des différents échantillons.

6. *S. VERNEULI*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypiérites longs, subflexueux et larges d'environ 2/3 de millim.; ils sont distants de 2 mill.; les tubes de connexion sont éloignés de 2 à 3 millim. — *Dévonien*: Columbus; Ohio.

7. *S. RAMULOSA*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 25, fig. 7, 1826. — Morren, 1832. — Phillips, 1836. — M'Coy, 1844. — *Harmodites ramulosus*, d'Or-

bigay, 1850. = Cette espèce, voisine du *S. distans*, en diffère par des individus plus écartés, plus géniculés et larges de 2 1/2 à 3 millim.; les tubes de connexion sont distants de 10 millim. — *Carboniférien* : Visé ; Tournay ; Ohre ; Ratingen ; Oswestry ; Bolland ; Kirby-Lonsdale, etc.

8. *S. RETICULATA*, Goldfuss, pl. 25, fig. 8, 1826. — Phillips, 1836. — Milne-Edwards, 1836. — Portlock, 1843. — *Id. catenata*, M'Coy, 1844. — *Harmodites strues*, d'Orbigny, 1850. = Polypières longs, irradiés et larges de 1 ou 2 millim.; tubes de connexion peu nombreux, espacés de 3 à 4 millim. — *Carboniférien* : Olne ; Bristol ; Buxton, etc.

9. *S. GENICULATA*, Phillips, Yorksh., pl. 2, fig. 1, 1830. — Portlock, 1843. — M'Coy, 1844. — *Harmodites id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Polypières très-longs, larges de 1 1/2 à 2 millim.; tubes de connexion distants de 2 à 3 millim. et courts; environ 14 cloisons minces, égales et droites (type heptaméral?) — *Carboniférien* : Kendal ; Derbyshire ; Ash-Fell ; Mendip ; Derrylorau, etc.

10. *S. VERTICILLATA*, Goldfuss, pl. 25, fig. 6, 1826. — Holl, 1830. — Blainville, 1834. — Edwards, 1836. — *Harmodites id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypières droits, parallèles, larges de 3 mill. et distants de 6 à 8 ; tubes de connexion nombreux et subverticellés. — *Silurien* : Ile de Drummond (lac Huron).

11. *S. TUBIPORIDES*, Yandell et Shumard, *Contrib. to the geol.*, 1847. — Edwards et Haime, 1851. = Polypières longs, flexueux, naissant les uns des autres par une base grêle et ayant 3 à 3 1/2 mill. de diamètre ; 24 petites cloisons. — *Dévonien* : Caledonia (New-York) ; Ohio ; Clark-County, etc.

12. *S. FASCICULARIS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Tubipora id.*, Linné, 1767. — *S. filiformis*, Goldfuss, pl. 38, fig. 16, 1829. — Morren, 1832. — Edwards, 1836. — Lonsdale, 1839. — *Harmodites id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypières d'abord rampants, puis redressés et larges de 1 mill. et moins ; tubes de connexion rares et gros. — *Silurien* : Gothland ; Groningue ; Dudley ; Benthall-Edge ; Wenlock, etc.

13. *S. SERPENS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Tubipora id.*, Linné, 1767. — *Catenipora axillaris*, Lamarck, 1816. — Lamouroux, 1821. — *Aulopora Lonsdalei*, d'Orbigny, 1850. = Polypières d'abord rampants, puis redressés, serrés et larges de 1 1/2 mill.; tubes de connexion peu nombreux ; 18 cloisons rudimentaires. — *Silurien* : Dudley ; Benthall-Edge.

14. *S. CÆSPITOSA*, Goldfuss, pl. 25, fig. 9. — Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Harmonites id.*, d'Orbigny, 1851. = Polypières larges de 1 1/2 millimètres environ et différant très-peu de ceux du *S. reticulata*. La première espèce n'est peut-être qu'une variété de la seconde. — *Dévonien* : Paffrath.

15. *S. ABDITA*, de Verneuil, *Mss.* — Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 15, fig. 4. = Polypières géniculés ou courbés, inégalement distants et larges de 5 millim ; environ 30 cloisons rudimentaires. — *Dévonien* : Nehou (Manche).

Espèces douteuses ou peu connues.

16. *S. CONFERTA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Harmonites confertus*, Keyserling, 1846. — *Alrcolites id.*, d'Orbigny, 1850. — *Carboniférien* : Petschora.

17. *S. EXILIS*, Goldfuss, *Cat. du M. de Bonn.* — Christiana.

18. *S. CLEVIANA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Dévonien* : Carolton ; Dayton.

19. *S. TROOSTI*, Edwards et Haime. — *Dévonien* : Delaware (Ohio).

20. *S. YANDELI*, Edwards et Haime. — *Dévonien* : Drayton ; Springheld (Ohio).

21. *S. RUGOSA*. — *Harmodites id.*, d'Orbigny, 1850. — *Dévonien* (Ohio).

22. *S. ? LAXA*, Phillips, *loc. cit.* — *Silurien* : Ash-Tell ; Derbyshire.

Plusieurs auteurs ont encore donné des noms différents à plusieurs *Syringopores* qu'ils ont pris à cet âge pour des *Aulapores*.

GENRE CLXI. — FLETCHERIA.

Fletcheria, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier fasciculé ; gemmation caliculaire ; planchers horizontaux ; point de tubes de connexion ; cloisons très-petites et peu saillantes ; murailles fortes et garnies d'une épithèque.

1. *F. TUBULIFERA*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 14, fig. 5. — *Syringopora ?*, Hisinger, *Leth. suec.*, pl. 27, fig. 3, 1837. = Polypier fasciculé ; polypières longs, serrés, irréguliers, larges de 3 à 5 millim. ; planchers horizontaux, très-rapprochés ; calices peu réguliers, larges de 5 millim. — *Silurien* : Gothland.

2. *F. ANNULATA*, Reuss, *Über zwei Pol. aus den Hallst. schi.*, pl. 1, fig. 2, 1855. = Polypier en buisson serré et branchu ; polypières assez droits, inégaux en grosseur, couverts d'une forte épithèque qui forme des bourrelets sur la muraille ; planchers horizontaux et distants de 3 à 8 millim. ; 25 à 30 cloisons bien visibles mais petites ; diam. des calices, 3 à 4 mill. — *Conchylien* (Muschelkalk) : Hallstätter, près Aussée.

Syrtrastrées tabulés.

XXXVII^e Famille. — Halysitiniens.

HALYSITINÆ (*pars.*), Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier constituant des lames verticales, libres par leurs côtés et diversement pliées ; le sommet de ces lames est constitué par des calices placés en série ; murailles bien développées et non poreuses ; cloisons petites mais distinctes.

GENRE CLXII. — HALYSITES.

Halysites, Fischer, *Zoognosia*, 1813. — Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1851. — *Catenipora*, Lamouroux, *Hist. des anim. sans vert.*, 1816.

Polypières placés en série unique, soudés par les murailles par deux points opposés et libres par les deux autres côtés ; les lames qui en résultent sont minces, libres, mais par suite de la multiplication elles finissent par se rencontrer et forment un réseau plus ou moins compliqué ; les calices sont oblongs, les cloisons dis-

inctes, les planchers bien développés et l'épithèque forte et complète.

1. *H. CATENULARIA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Tubipora id.*, Linné, 1767. — *T. catenulata*, Gmelin, 1789. — Parkinson, 1808. — *Catenipora tubulosa*, Lamouroux, 1821, 1824. — *C. labyrinthica*, Goldfuss, pl. 25, fig. 5, 1826. — *C. approximata*, *distans*, *communicans*, Eichwald, 1829. — *C. escharoides*, Blainville, 1830. — Lonsdale, 1839. — Portlock, 1843. — Dale-Owen, 1844. — *C. gracilis* et *compressa*, Edwards et Haime, 1849. — *Halysites attenuata*, *dichotoma*, *macrostoma*, *stenostoma*, Fischer, 1828, 1830. — *H. labyrinthica*, Fischer, 1837. — Bron, 1835. — Geinitz, 1845. — Keyserling, 1846. — *H. labyrinthica et agglomerata*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850.

Polypier en masse arrondie et convexe; calices elliptiques et longs de 1 jusqu'à 4 millim.; 12 cloisons poutrelles; planchers bien développés et horizontaux. La variété dans la largeur des calices ne se fait voir que dans des échantillons différents, ce qui nous fait penser que sous le nom de *H. Catenularia*, MM. Edwards et Haime ont au moins compris deux espèces différentes. Ce qui nous confirme encore dans cette idée, c'est que leur espèce se rencontre dans deux gisements différents.

Silurien inf. : Robeston-Walshen; Hughley; Salop; Lickey.

Silurien sup. : Wenlock; Dudley; Lincoln-Hill, etc.

2. *H. ESCHAROIDES*, Fischer, *Oryct. de Moscou*, pl. 38, fig. 3, 1837. — Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1851. — *Catenipora id.*, Lamarck, 1816. — Lamouroux, 1816, 1824. — Goldfuss, pl. 25, fig. 4. — De Blainville, 1830. — Stoll, 1830. — Steininger, 1831. — Morren, 1832. — Heisinger, 1840. — *Halysites id.*, Geinitz, 1845-46. — *H. id. et catenulata*, d'Orbigny, 1850.

== Polypier convexe; séries en réseau; calices elliptiques et longs de 1 à 2 millim.; 12 cloisons; planchers très-serrés. — *Silurien* : Groningue; Gothland; Moscou; Benthall-Edge; île de Drummond; Madison, etc.

Polyastrées tabulés.

XXXVIII^e Famille. — Milléporiens.

MILLEPORIDÆ, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, *loc. cit.*, p. 262, 1849.

Polypier composé d'un cœnenchyme abondant, distinct des murailles et formé d'une substance tubulaire ou cellulaire, mais n'étant jamais compacte; cloisons peu nombreuses; planchers bien développés.

GENRE CLXIII. — AXOPORA.

Axopora, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Axopora*, *Lobopora*, *Holarœa*, *id.*, *ibid.*, *Brit. foss. corals intr.*, 1850.

Polypier ayant un cœnenchyme abondant, d'une structure finement réticulée et présentant souvent des arêtes; calices petits; cloisons rudimentaires; columelle forte, fasciculée et traversée de planchers horizontaux peu développés.

1. A. SOLANDERI, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Pocillopora*, *id.*, De-france, 1830. — *Palmipora* *id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 45, fig. 9. = Polypier en rameaux aplatis; polypières peu serrés et larges d'un demi-millim.; columelle bien développée. — *Parisien* : Auvert; Valmondois.

2. A. PYRIFORMIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Geodia* *id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 46, fig. 2. = Polypier encroûtant et s'étendant sur la surface d'autres corps; calices assez régulièrement espacés et larges à peine d'un demi-millim. — *Parisien* : Monneville (Oise).

GENRE CLXIV. — HELIOLITES.

Heliolites, Dana, 1846.

Porites, Lonsdale, 1849 (non Lamarck).

Palæopora, M'Coy, 1849.

Lonsdalia et *Geoporites*, d'Orbigny, 1849 (non M'Coy) et 1850.

Polypier massif ou dendroïde, ayant un cœnenchyme formé de tubes prismatiques fermés par des diaphragmes assez rapprochés; planchers horizontaux présentant au centre une petite columelle tuberculeuse.

1. H. INTERSTINCTA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Madrepore* *id.*, Linné, 1767. — *Porites* *id.*, Keyserling, 1847. — *Poripital madrepore*, Parkinson, 1808. — *Sarcinula punctata*, Fleming, 1828. — Woodward, 1830. — *Geoporites pyriforme*, *Lonsdalei* et *interstincta*, d'Orbigny, 1850, etc. = Polypier arrondi ou gibbeux; calices larges de 1 1/2 millim., égaux, saillants et distants de 1 à 1 1/2 millim.; 12 cloisons peu inégales. — *Silurien inf.* : Caradoc; Marles-Bay. — *Silurien sup.* : Wenlock; Dudley; Lincoln-Hill; Lindells; Walsall, etc. — *Dévonien* : Nehou; Viré.

Il est probable que le *H. interstincta* renferme deux ou trois espèces différentes, mais dont on ne peut, avec les restes fossiles, trouver les caractères distinctifs.

2. H. MURCHISONI, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Compound madreporite*? Parkinson, 1803. = Polypier en masse arrondie; calices égaux, larges de 1 millim., à bords minces et saillants; 12 cloisons alternativement inégales. — *Silurien infér.* : Wenlock-Edge; Gothland. — *Dévonien* : Vire. L'espèce Dévonienne paraît différer de celle du Silurien, quoique l'échantillon soit mal conservé, et doit former probablement une espèce distincte.

3. H. MEGASTOMA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Porites* *id.*, M'Coy, 1846. — *Geoporites intermedia*, d'Orbigny, 1850. = Polypier en masse arrondie, libre ou fixée; calices larges de 2 à 3 millim., très-serrés et peu élevés; 12 cloisons peu inégales et minces. — *Silurien sup.* : Coniston. — *Silurien sup.* : Wenlock-Edge, Egool.

On a trouvé dans le *Dévonien* de Nehou des fossiles qui présentent quelque analogie avec cette espèce.

4. H. GRAYI, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier dendroïde et frondescant; calices larges d'un peu moins d'un millim. et écartés de 2 ou 3 mill.; 12 cloisons subégales et assez épaisses. — *Silurien sup.* : Walsall.

5. H. INORDINATA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Porites* *id.*, Lonsdale in Murchison, 1839. — *Lonsdalia* *id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypier en branches grêles, cylindroïdes et larges de 3 à 5 millim.; calices larges de

1 1/4 millim.; 12 cloisons subégales et bien développées. — *Silurien inf.* : Robeston-Walthen. — *Silurien inf.* : Ferriter's-Cove; Doonquin; Dingle.

6. H. POROSA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Goldfuss, pl. 21, fig. 7 (figure inexacte). — *Heliopora pyriformis*, Blainville, 1830. — Steininger, 1831. — *Porites id.*, Lonsdale, 1840. — Phillips, 1841. — *Geoporites porosa* et *Phillipsi*, d'Orbigny, 1850. = Polypier arrondi ou gibbeux, calices larges de 1 1/2 millim. et distants de 3 ou 4 millim.; 12 cloisons bien développées et inégales. — *Dévonien* : Eifel; Torquay; Walcombe-Beach; Newton; Plymouth, etc.

7. H. PLACENTA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Conscinopora id.*, Goldfuss, pl. 9, fig. 18. — *Geoporites id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypier mince et circulaire; épithèque forte; calices larges de 2 millim. distants de 4 1/2 et égaux; 12 cloisons. — *Dévonien* : Eifel? Ferques?

8. H.? VERMICULOSA. — *Milleporites id.*, Lesueur, *Mém. du Mus.*, t. VI, p. 293. — *Dévonien* : Lac Erié.

GENRE CLXV. — POLYTREMACIS.

Polytremacis et *Dactylacis*, d'Orbigny, *Note sur les Pol. foss.*, 1849.

Polytremacis, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier constitué par un cœnenchyme formé de petites tigelles cylindroïdes, également espacées et réunies par des diaphragmes assez rapprochés qui présentent à la partie supérieure une surface grenue; cloisons bien développées; pas de columelle.

1. P. BLAINVILLEI. — *P. Blainvilliana*, d'Orbigny, *Prodrome*, t. II, p. 209, 1850. — *Heliopora id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 7, fig. 6. = Polypier mamelonné; calices peu serrés, égaux et larges de 2 millim.; il paraît y avoir une douzaine de cloisons assez développées. — *Turonien* : Uchaux.

2. P. REUSSI. — *P. Blainvilliana*, Reuss, *Beitr.*, *loc. cit.*, pl. 24, fig. 4-7. = Polypier légèrement gibbeux; calices écartés, assez saillants, réguliers et larges de 1 millim.; 12 cloisons minces, égales et assez développées. — *Turonien* : Gosau.

3. P. PARTSCHI, Reuss, *loc. cit.*, pl. 24, fig. 1-3. = Polypier en masse arrondie à peine mamelonnée; calices très-espacés et larges à peine de 2 millim.; 24 cloisons égales et très-épaisses mais peu larges. — *Turonien* : Gosau.

4. P. MACROSTOMA, Reuss, *loc. cit.*, pl. 24, fig. 8-10. = Polypier en petite masse arrondie ou allongée; calices saillants, peu égaux et larges de 2 à 4 millim.; 24 grosses cloisons égales et terminées par une lame peu développée. — *Turonien* : Wolfgang.

Espèces douteuses.

5. P. BULBOSA, d'Orbigny, *Prod.* — *Turonien* : Uchaux.

6. P. COMPLANATA, *id.* — *Turonien* : Uchaux.

7. P. MICROPORA, *id.* — *Turonien* : Uchaux.

8. P. GLOMERATA, *id.* — *Turonien* : Uchaux.

9. P. SUPERCRETACEA, *id.* — *Bull. de la Soc. géol.*, 2^e série, t. VII. — *Danien* : Lafalaise; Vigny.

10. P. RAMOSA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.* — *Dactylacis id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Cénomaniens* : Ile d'Aix.

11. P. SUBRAMOSA, Edwards et Haime, *id.* — *Dactylacis id.*, d'Orbigny. — *Turonien* : Uchaux.

12. P. PROVINCIALIS, Edwards et Haime, *id.* — *Dactylacis id.*, d'Orbigny. — *Turonien* : Uchaux.

GENRE CLXVI. — PLASMOPORA.

Plasmopora, Edwards et Haime, *Comptes rendus*, *loc. cit.*, p. 262, 1849.

Polypier massif, subhémisphérique; calices creux; murailles minces; cœnenchyme constitué par des lames verticales unies par des traverses horizontales; planchers horizontaux; cloisons bien développées; plateau recouvert d'une forte épithèque.

1. P. PETALIFORMIS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Porites id.*, Lonsdale in Murchison, *Sil. syst.*, pl. 16, fig. 4, 1830. — *Astreopora id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier convexe; calices circulaires, égaux, larges de 2 millim.; 12 cloisons minces et peu inégales. — *Silurien* : Dudley; Walsall; Delvees-Green; Egool; île Drummond (lac Huron), etc.

2. P. SCITA, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier circulaire et convexe; calices égaux, peu profonds et larges de moins d'un millim.; 12 cloisons subégales, minces en dedans et assez épaisses en dehors. — *Silurien* : Dudley.

3. P. FOLLIS, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 16, fig. 3. = Polypier pédonculé et pyriforme, à surface convexe; calices larges de 1 à 1 1/2 mill.; 12 cloisons étroites et crénelées. — *Silurien* : Perry-County.

4. P. MACROPORA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Goldfuss, *Mss.* (musée de Bonn). = Polypier largement fixé et convexe; calices larges de 1/3 millim.; 12 cloisons. — *Dévonien* : Eifel?

GENRE CLXVII. — PROPORA.

Propora, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, *loc. cit.*, p. 262, 1849.

Polypier massif; cœnenchyme formé par des traverses exothécales abondantes; calices ronds et assez saillants; cloisons assez bien développées et se continuant par des côtes rayonnantes autour des calices.

1. P. TABULATA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Porites id.*, Lonsdale, *loc. cit.*, 1839. — *Alveopora tabulata*, Lonsdalei et grandis, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier convexe ou subgibbeux; calices subégaux, peu saillants, larges de 1 1/2 millim.; 12 cloisons un peu inégales et débordantes; côtes généralement bien marquées. — *Silurien* : Dudley; Wenlock; Benthall-Edge; Gothland, etc.

2. P. CONFERTA, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier hémisphérique; calices très-serrés, peu inégaux et larges de 2 millim.; 12 petites cloisons; planchers très-rapprochés. — *Silurien* : Borekholm.

Espèces douteuses.

3. P.? ACEROSA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Porites acerosus*, Eichwald, 1829. — *Silurien* : Russie.

4. P.? CYCLOSTOMA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Hydnophora id.*,

Phillips, *Geol. of York.*, pl. 2, fig. 9-10. — *Astreopora antiqua*, M'Coy, *Ann. and. Mag.*, etc. — *Carboniférien* : Northumberland ; Hook-Point.

GENRE CLXVIII. — BATTERSBYIA.

Battersbyia, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 227, 1851.

Polypier massif, formé d'un cœnenchyme lâche et spongieux, à structure irrégulière; murailles épaisses et sans côtes; cloisons petites mais distinctes; planchers vésiculeux.

B. INÆQUALIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier massif; calices circulaires, quelquefois déformés et larges de 2 à 4 millim.; 26 cloisons inégales dans les grands calices. — *Déronien* : Teignmouth.

GENRE CLXIX. — FISTULIPORA.

Fistulipora, M'Coy, *Ann. and Magaz. of nat. hist.*, 2^e série, t. III, p. 130, 1849.

Polypier encroûtant ayant un cœnenchyme vésiculeux; murailles épaisses et non costulées; cloisons rudimentaires; planchers infundibuliformes.

1. F. MINOR, M'Coy, *loc. cit.* = Calices un peu saillants et très-petits, on en compte 4 dans l'espace de 2 millim.; ils sont séparés par de petites vésicules. — *Carboniférien* : Derbyshire.

2. F. MAJOR, M'Coy, *loc. cit.* = Calices larges de 1 1/2 mill., éloignés d'autant; murailles épaisses; cœnenchyme vésiculaire bien développé. — *Carboniférien* : Derbyshire.

3. F.? LONSDALEI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Anthophyllum incrustans*, Lonsdale, in Murchison, *loc. cit.*, 1845. — *Permien* : Ust Vaga (Russie).

GENRE CLXX. — LYELLIA.

Lyellia, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 226, 1851.

Polypier massif; cœnenchyme vésiculeux; calices ronds et saillants; 12 cloisons bien développées; planchers irréguliers.

1. L. AMERICANA, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 14, fig. 3. = Polyp. subplane; calices larges de 2 1/4 mill. et distants du double; surface du cœnenchyme finement réticulée. — *Silurien* : Ile de Drummond.

2. L. GLABRA, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 12, fig. 2. = Polypier subplane; calices larges de 2 1/2 millim. et écartés d'autant; cœnenchyme formé de grandes vésicules. — *Silurien* : Jowa.

XXXIX^e Famille. — Dendroporiens.

SERIATOPORIDÆ, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals introd.*, 1850.

Polypier en touffes arborescentes; cœnenchyme abondant et compacte; planchers peu développés; loges tendant à se remplir par suite du développement de la columelle et des murailles

GENRE CLXXI. — RHABDOPORA.

Rhabdopora, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, t. XXIX, p. 262, 1849.

Polypier à branches prismatiques; cœnenchyme échinulé; calices disposés en séries longitudinales; cloisons distinctes et un peu débordantes.

1. R. MEGASTOMA, Milne-Edwards et J. Haime, *Brit. foss. corals*, 1850. — *Dendropora id.*, M'Coy, 1849. = Polypier en rameaux tétraédriques, à surface granulée ou échinulée et larges de 1 1/2 millim.; calices écartés, disposés en séries simples et larges de 1 à 1 1/4 millim. — *Carboniférien*: Derbyshire.

2. R.? APPROXIMATA. — *Pocillopora id.*, Eichwald, *Zool. spec.*, 1829. — *Silurien*: Lithuanie.

GENRE CLXXII. — DENDROPORA.

Dendropora, Michelin, *Icon. zooph.*, p. 187, 1846.

Polypier rameux; branches grêles et arrondies; cœnenchyme lisse; calices écartés et entourés d'un petit bourrelet; cloisons rudimentaires.

D. EXPLICATA, Michelin, *loc. cit.*, pl. 48, fig. 6. = Branches arrondies, granuloso-striées, larges de 1 1/2 millim.; calices oblongs, saillants, larges de 1/2 millim. et alternes. — *Dévonien*: Ferques.

GENRE CLXXIII. — TRACHYPORA.

Trachypora, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier rameux; cœnenchyme abondant et dense dont la surface est couverte de stries vermiculées, échinulées et irrégulières.

T. DAVIDSONI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 17, fig. 7. = Rameau petit et subcylindrique; calices peu saillants, larges de 1 mill. et écartés de 2 mill.; diamètre des rameaux, 5 millim. — *Dévonien*: Ferques.

XL^e Famille. — Favositiniens.

FAVOSITIDÆ, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — FAVOSITINÆ, *id.*, *ibid.*

Polypier massif; cœnenchyme nul; planchers nombreux et bien développés; murailles lamellaires perforées plus ou moins régulièrement.

GENRE CLXXIV. — ALVEOLITES.

Alveolites, Lamarck, *Syst. des anim. sans vert.*, 1801. — Steinninger, *Mém. de la Soc. géol.*, 1831.

Polypier en masse convexe ou dendroïde; polypiérites basaltiformes, terminés par des calices obliques subtriangulaires et présentant une forte dent cloisonnaire; les autres cloisons sont tout à fait rudimentaires.

1. *A. SUBORBICULARIS*, Lamarek, *loc. cit.* — *A. escharoides*, *id.*, *id.* — *A.*, *id.*, *id.*, de Blainville, 1830. — Lamouroux, 1824. — Edwards et Haime, 1851. — *Calamopora spongites*, Goldfuss, pl. 28, fig. 1, 1829. — Morren, 1832. — *C. suborbicularis*, Michelin, pl. 48, fig. 7. — *C. squamosa* ou *imbricata*, *id.*, pl. 49, fig. 5. — *Favosites suborbicularis* et *Alveolites tuberosa*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier encroûtant, à surface gibbeuse; calices penchés, très-serrés et larges de 1 1/4 millim. sur 1/2. — *Dévonien*: Ferques; Eifel; Torquay, etc.

2. *A. RETICULATA*, Steininger, *Mém. de la Soc. géol. de France*, 1831. = Polypier convexe et pédonculé; calices peu serrés, petits, larges de 1/2 millim. sur 1/4. — *Dévonien*: Ferques; Nehou; Eifel, etc.

L'A. VERMICULARIS, M'Coy, 1850, paraît identique à l'espèce précédente; il est de Teignmouth, New-Quay, etc.

3. *A. SUBÆQUALIS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 17, fig. 4. — *Calamopora spongites*, Michelin, pl. 48, fig. 8 (non Goldfuss). = Polypier gibbeux ou rameux, à branches larges de 1 ou 2 mill.; calices inégaux, larges de 2/3 de millim. à 1 mill. — *Dévonien*: Ferques; Nehou; Eifel.

4. *A. LABECHEI*. — *A. Labechii*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Favosites spongites*, Lonsdale, *loc. cit.*, 1839. — *Calamopora spongites*, Eichwald, 1840. = Polypier convexe ou gibbeux; calices irréguliers, larges d'un millim. — *Silurien*: Wenlock; Benthall-Edge; Egool; Reval, etc.

5. *A. BATTERSBYI*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier hémisphérique; calices inégaux, larges d'un millim; murailles minces et largement tronées. — *Dévonien*: Torquay.

6. *A. FUNGTI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 17, fig. 5. = Polypier en lames minces, garnies en dessous d'une épithèque; calices très-penchés, larges de 3 à 4 millim. — *Silurien*: Gothland.

7. *A. DENTICULATA*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 16, fig. 4. = Polypier rameux; 3 dents cloisonnaires bien marquées; calices larges de moins d'un millim.; diamètre des rameaux, 10 millim. — *Dévonien*: Benberg.

8. *A. GRAYI*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier subplane ou mamelonné; calices irréguliers, larges de 1 1/2 millim. — *Silurien sup.*: Wenlock; Dudley.

9. *A. REPENS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Millepora id.*, Fougé, 1749. — Hisinger, 1837. — Lonsdale, *loc. cit.*, 1839. — *Chaetetes id.*, d'Orbigny, 1850. — *Calamopora fibrosa*, Goldfuss, pl. 28, fig. 4, 1826. = Polypier formé de branches grêles, larges de 5 millim.; calices serrés, larges de 1/2 millim.; 3 dents visibles. — *Silurien*: Montmorency; Falls; Gothland; Dudley; Wenlock, etc.

10. *A. SEPTOSA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Favosites septosus*, Fleming, 1828. — Woodward, 1830. — Phillips, 1836. — M'Coy, 1844. — *Chaetetes id.*, Keyserling, 1846. = Polypier élevé, convexe ou mamelonné; calices polygonaux, inégaux et larges de 1/2 à 2/3 de millim. — *Carboniférien*: Corwen; Bristol; Lée; Nowgorod, etc.

11. *A. DEPRESSA*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1851. — *Favosites id.*, Fleming, 1828. — Woodward, 1830. — *F. capillaris*, Phillips, 1836. — Porthlock, 1843. — M'Coy, 1844. — *Chaetetes id.*, Keyserling, 1846. = Cette espèce diffère de la précédente par ses calices larges seulement de 1/4 ou 1/5 de millim. — *Carboniférien*: Salop; Bristol; Gordale; Petschora, etc.

12. A. SERIATOPORA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Millepora repens*, Lonsdale, *loc. cit.*, 1839. — Wahlenberg, 1821. — *M. ramis*, etc., Fougé, 1849. = Polypier formé de rameaux cylindriques, larges de 3 millim.; calices subcirculaires, larges de 1/2 millim.; les cloisons peu distinctes. — *Silurien* : Dudley; Beat-Grass (Kentucky).

13. A.? SQUAMOSUS, Heininger, *Vert. des Ueberg. geb. der Eifel*, 1849. — *Dévonien* : Eifel.

14. A.? MEGASTOMUS, *ibid.*, *id.* — *Dévonien* : Eifel.

15. A.? RAMOSUS, *ibid.*, *id.* — *Dévonien* : Eifel.

GENRE CLXXV. — RÆMERIA.

Ræmeria, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 253, 1851.

Polypier en masse arrondie; polypiérites polygonaux soudés par les murailles; planchers infundibuliformes.

R. INFUNDIBULIFERA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Calamopora*, *id.*, Goldfuss, pl. 27, fig. 1. — *Alveolites id.*, Blainville, 1830. — Milne-Edwards, 1836. = Polypier massif, sublobé; calices larges de 2 à 3 millim.; cloisons rudiment.; murailles perforées? — *Dévonien* : Eifel; Benberg.

GENRE CLXXVI. — FAVOSITES.

Favosites (pars) Lamarck, *Hist. des anim. sans vert.*, 1816.

Calamopora, Goldfuss, *Petref. germ.*, 1826.

Favosites et Alveolites (pars), Blainville, 1830.

Favosites et Thamnopora, Steininger, 1831.

Polypier en masse convexe ou dendroïde; polypiérites basaltiformes et soudés par les murailles; calices perpendiculaires à l'axe; cloisons trabiculaires; planchers horizontaux; murailles régulièrement perforées; plateau recouvert d'une épithèque mince.

A. — Polypier en masse arrondie ou gibbeuse.

1. F. GOTHLANDICA, Lamarck, *loc. cit.* 1816. — DeFrance, 1820. — Lamouroux, 1821-1824. — Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Corallium Gothlandicum*, Fougé, 1749. — *Calamopora Gothlandica*, Goldfuss, pl. 26, fig. 3. — Morren, 1832. — Eichwald, 1840. — *Favosites subbasaltica*, d'Orbigny, 1850. = Polypier assez élevé; calices inégaux, larges de 3 millim.; 10 à 12 cloisons. — *Silurien* : Gothland; Groningue; Wenlock, etc.

2. F. FAVOSA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Calamopora*, *id.*, Goldfuss, pl. 27, fig. 2. = Calices subégaux, hexagonaux et larges de 4 millim.; 24 cloisons très-inégales; murailles présentant 2 séries de trous distants de plus d'un millim. — *Silurien* : Ile de Drummond (lac Huron).

3. F. ALVEOLARIS, Blainville, 1830. — d'Orbigny, 1850. — Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1851. — *Calamopora*, *id.*, Goldfuss, pl. 26, fig. 1^a 1^e (non les autres). = Polypier subplane; calices inégaux, larges de 3 mill.; planchers présentant 4 ou 8 petites fossettes près de la muraille; cloisons poutrelles; trous rapprochés et situés aux angles. — *Dévonien* : Eifel; Ferques (près Boulogne).

4. F. ASPERA, d'Orbigny, 1850. — *Calamopora alveolaris* (pars), Goldfuss, pl. 26, fig. 1b (non les autres). — Morren, 1832. — Keyserling, 1846. — *Favosites id.*, Lonsdale, 1839-1845. == Cette espèce diffère de la précédente en ce que les fossettes des planchers sont toujours au nombre de 6. — *Silurien* : Pavie; Castle; Llandovery; Malmoë; Dago; Cong; Dingle, etc.

5. F. GOLDFUSSI, d'Orbigny, 1850. — De Verneuil et Haime, 1850. — *Calamopora Gothlandica* (pars), Goldfuss, pl. 26, fig. 3b, 3c (non les autres). — Roemer, 1843. — *Favosites id.*, Lonsdale, 1845. — Phillips, 1841. == Polypier convexe ou pyriforme; calices inégaux, les grands larges de plus de 3 millim.; murailles hérissées de pointes à l'intérieur; trous ronds et souvent alternes. — *Dévonien* : Nehou; Viré; Millar; Eifel; Malmedy; Barton; Plymouth; Dayton, etc.

6. F. BASALTICA, de Blainville, *Dict.*, 1830. — D'Orbigny, 1850. — *Calamopora id.*, Goldfuss, pl. 26, fig. 4c, 4d (non les autres). — Castelnau, 1843. == Polypier arrondi; calices peu inégaux, larges de plus de 3 mill.; environ 20 cloisons; trous muraux en série unique et distants d'un mill. — *Dévonien* : Nehou; Eifel; New-Yorck, etc.

7. F. POLYMORPHA, Dale-Owen, 1844. — De Verneuil et Haime, 1850. — Edwards et Haime, 1851. — *Calamopora id.*, Goldfuss, pl. 27, fig. 2b, 2c, 2d, 3b, 3c (non les autres). — Bronn, 1835. == Polypier gibbeux; calices inégaux, larges de 1 1/2 millim.; une rangée de trous distants de 1 millim. — *Dévonien* : Nehou; Viré; Eifel; Paffrath; Jowa, etc.

8. F. MULTIPORA, Lonsdale, 1839. — D'Orbigny, 1850. — Edwards et Haime, 1851. == Polypier hémisphérique; calices égaux et disposés en séries et larges de 1 1/2 millim., tous serrés et irréguliers. — *Silurien* : Haverford-West; Marloës-Bay, etc.

9. F. TROOSTI, Edwards et Haime, *loc. cit.* pl. 18, fig. 1 = Calices subégaux, larges de 1 1/2 à 2 millim.; 3 séries de pores muraux séparés par de petites lignes verticales; ils sont espacés environ d'un millim. — *Silurien* : Jowa.

10. F. FORBESI, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Calamopora basallica*, Goldfuss, pl. 26, fig. 4b (non les autres). — *Calamopora Gothlandica*, Hisinger, 1837 (non Goldfuss). — *Favosites id.*, Lonsdale, 1839 (non Lamarck). — D'Orbigny, 1850. == Polypier convexe ou gibbeux; calices inégaux; les plus grands ont 2 mill. de diamètre; planchers horizontaux et inégalement serrés. — *Silurien* : Tortworth; Gothland; Benthall-Edge; Ardaun; Egoöl, etc.

11. F. HISINGERI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 17, fig. 2. — *F. alcyon*, DeFrance, 1820. — *F. Gothlandica*?, Blainville, 1830. — *F. Alcyon*, *ibid.* — *Calamopora minutissima*, Castelnau, 1843. == Polypier gibbeux; calices larges de 1 1/2 mill.; 12 cloisons formées de poutrelles arquées; planchers minces et horizontaux. — *Silurien* : Torthworth; Gothland; Wenlock-Edge; Benthall-Edge; Niagara. — *Dévonien*? : Perry-County.

12. F. MAMILLARIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Calamopora id.*, Castelnau, 1843. == Polyp. arrondi; calices polygonaux très-inégaux, larges de 2 à 6 millim. suivant les échantillons; planchers irréguliers, minces et convexes; pores muraux formant deux séries verticales et séparées. — *Dévonien* : Amérique septentrionale.

13. F. FIBROSA (pars), Lonsdale, *Sil. syst.*, 1839. — Edwards et Haime, 1851. — *Calamopora id.*, Goldfuss, pl. 28, fig. 3a, 3b (non les autres). —

Rœmer, 1843. — Keyserling, 1846. — *Alveolites fibrosus*, d'Orbigny, 1850. = Polypier globuleux ou pyriforme; calices polygonaux, larges de 1/2 ou 2/3 de millim.; pores muraux grands et alternant avec les planchers qui sont très-serrés. — *Silurien* : Llandorery; Storderley-Edge; Kerry; Wexford; Kildare; Mayo; Tyrone; Waterford; Wicklow; Lexington, etc. — *Dévonien* : Viré; Eifel; Hartz; Torquay; Delaware, etc.

14. F. PARASITICA, M'Coy, 1844. — d'Orbigny, 1850. — *Calamopora id.*, Phillips, 1836. = Polypier en masse globuleuse, fixé sur des corps étrangers; calices inégaux, larges de 2 à 3 millim.; murailles minces. — *Carboniférien* : Bolland; Irlande; Button-Mould, etc.

B. — *Polypier dendroïde.*

15. F. RETICULATA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Calamopora spongites*, Goldfuss, pl. 28, fig. 2^{a-s} (non les autres). — Geinitz, 1845-46. — Keyserling, 1846. — *Alveolites reticulata*, de Blainville, 1830. — *Favosites Orbignyana*, de Verneuil et J. Haime, 1850. = Branches épaisses de 1 à 2 centim.; calices peu inégaux, larges d'un millim. — *Dévonien* : Brest; Nehou; Pelapoya; Eifel; Bensberg; Torquay, etc.

16. F. CRISTATA; Edwards et Haime, *loc. cit.*, — *Madreporites cristatus*, Blumenbach, 1803. — *Calamopora polymorpha*, Hisinger, 1837. — *C. spongites*, *ibid.* (non Goldfuss). — Eichwald, 1840. — *Alveolites Lonsdalei*, d'Orbigny, 1850. = *Silurien* : Gothland; Wenlock; Ludlow; Aymestry; Dublin; Mayo; Kerry; Reval; Hapsal. — *Dévonien?* : Oural.

17. F. CERVICORNIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Alveolites id.*, Blainville, 1830. — *Calamopora polymorpha*, Goldfuss, pl. 27, fig. 3^a, 4^a, 4^b, 4^c (non les autres). — Rœmer, 1843. — *Favosites cronigera*, de Verneuil et J. Haime, 1850. — *F. id.* et *Alveolites celleporatus*, d'Orbigny, 1850. = Cette espèce diffère du *F. polymorpha* par sa forme dendroïde, et du *F. cristata* par ses calices plus grands et larges de 2 millim. — *Dévonien* : Eifel; Villmar; Bensberg; Brest; Mons; Torquay, etc.

18. F. DUBIA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Alveolites id.*, Blainville, 1830. — *A. polymorpha*, Phillips, 1841. — *A. cervicornis*, Michelin, *Icon.*, pl. 48, fig. 2 et 49, fig. 3, 1845. — d'Orbigny, 1850. — *Calamopora polymorpha*, Goldfuss, pl. 27, fig. 5, 1829. = Polypier dendroïde; branches non coalescentes et larges de 10 à 12 millim.; calices arrondis ou polygonaux larges de 2 millim.; une seule série de pores sur chaque muraille; calices un peu inclinés. — *Dévonien* : Ferques; Viré; Chasse-Grain; Bensberg; Torquay, etc.

Espèces douteuses.

19. F. DENTIFERA, d'Orbigny, 1850. — *Calamopora id.*, Phillips. — *Carboniférien* : Bolland.

20. F. INCRUSTANS, d'Orbigny, *id.* — *Calamopora id.*, Phillips, *Geol. of York.*, pl. 1, fig. 3. — *Carboniférien* : Bolland.

On doit encore rapporter au genre *Favosites* les quatre espèces suivantes, que M. Pauder a désignées sous le nom générique de *Bolporites*, et qu'il a rapprochées des foraminifères; elles sont de l'étage *Silurien* :

21. F. SEMIGLOBOSA. — *Bolporites id.*, Pauder, *Russische Reiches*, pl. 2, fig. 1, 1830.

22. F. TRIANGULARIS. — *Bolporites id.*, *ibid.*, *loc. cit.*, pl. 2, fig. 2.

23. F. UNCINATA. — *Bolporites id.*, *ibid.*, *loc. cit.*, pl. 2, fig. 3.

24. F. MITRALIS. — *Bolporites id.*, *ibid.*, *loc. cit.*, pl. 2, fig. 4.

Les différences spécifiques sont très-difficiles à saisir chez les individus qui composent le genre *Favosites* ; il est possible que l'on ait décrit deux fois , sous deux noms différents , la même espèce ; de même qu'il est à présumer que les échantillons qui sont indiqués comme venant de deux ou trois terrains différents , sont des espèces différentes qui ne présentent pas des caractères assez saillants pour être facilement séparées.

GENRE CLXXVII. — KONINCKIA.

Koninckia, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, 1849.

Polypier assez semblable à celui du *Favosites* , mais présentant des murailles réticulées et irrégulièrement criblées de grands trous.

K. FRAGILIS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 153. = Murailles peu épaisses, percées de trous larges et irréguliers ; calices polygonaux, larges de 2 mill.; 6 cloisons poutrelles ; planchers horizontaux et peu serrés. — *Sénonien* : Royan.

GENRE CLXXVIII. — EMMONSIA.

Emmonsia, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier submassif ; cloisons poutrelles ; planchers irréguliers, doubles, les uns complets, les autres incomplets et inclinés sur les premiers ; plateau recouvert d'une épithèque qui envoie souvent des prolongements radiciformes ; murailles bien développées et régulièrement perforées.

1. E. HEMISPHERICA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Favosites id.*, Yandelle et Shumard, 1847. — De Verneuil et J. Haime, 1850. — *Atreolites id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypier en masse arrondie et formé d'étages superposés ; calices pentagonaux, inégaux, larges de 1 1/2 à 2 mill.; 12 cloisons assez développées ; trous muraux assez grands et distants de 2/3 de mill. — *Silurien* : Springfield (Ohio) ; Perry-County. — *Dévonien* ? : Caledonia ; Ohio ; Erie County ; Torquay, etc.

2. E. ALTERNANS, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier massif ; calices subégaux, polygonaux et larges de 3 mill.; trous muraux distants de 2 mill., placés en deux séries et alternés. — *Carboniférien* : Tournay.

3. E.? CYLINDRICA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Favosites id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 60, fig. 1. = Polypier élevé et convexe ; calices larges de 6 à 7 mill.; série de 4 ou 5 trous petits alternant avec les grands planchers. — *Silurien* : Louisville ; Wisconsin. — *Dévonien* ? : Caledonia ; New-York ; Ohio ; Delaware ; Dayton.

GENRE CLXXIX. — MICHELINIA.

Micheliniana, de Koninck, *Anim. foss. des terr. carb. de la Belgique*, 1842.

Polypier submassif ; cloisons représentées par des stries peu développées ; planchers irréguliers et doubles ou vésiculaires ; plateau recouvert d'une épithèque qui émet des prolongements radiciformes.

1. *M. FAVOSA*, Koninck, *loc. cit.*, pl. C, fig. 2. — Michelin, pl. 59, fig. 2. — *M. favosa et scutis*, d'Orbigny, 1850. — *Manon favosum*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 1; fig. 14. — *Porites cellulosa*, Woodward, 1830, — *Favosites alveolata*, Geinitz, 1845-46. = Polypier en masse arrondie; calices peu profonds, à bords épais, larges de 6 à 8 millim.; de 30 à 40 stries cloisonnaires. — *Carboniférien* : Tournay; Visé; Ratingen; Masbury; Hook-Point; Derbyshire, etc.

2. *M. TENCISEPTA*, Koninck, *loc. cit.*, pl. C, fig. 3. — Michelin, *Icon.*, pl. 16, fig. 3. — *Calamopora id.*, Phillips, pl. 2, fig. 30, 1836. — *Favosites* et *Michelinia id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypier élevé, entouré d'une forte épithèque; calices polygonaux, larges de 7 à 8 millim.; 30 à 40 stries costales. — *Carboniférien* : Sablé; Juigné; Tournay; Bristol; Bolland; Derbyshire; Masbury.

3. *M. CONVEXA*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1851. = Polypier arrondi et convexe; calices subégaux, larges de 8 à 10 millim.; environ 10 stries cloisonnaires; planchers minces, serrés et convexes. — *Dévonien* : Michigan; Preston-County (Virginie).

4. *M. MEGASTOMA*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1851. — *Calamopora id.*, Phillips, 1836. — *Favosites id.*, d'Orbigny, 1850. — *Favosites id. et grandis*, M'Coy, 1844, 1849. = Polypier turbiné et pédiculé; calices subégaux, profonds et larges de 15 à 18 millim.; stries cloisonnaires très-fines et très-nombreuses. — *Carboniférien* : Kendal; Bolland; Attre, près Mons.

5. *M. ANTIQUA*, d'Orbigny, *Prod.* — *Dictyophyllia id.*, M'Coy, 1844. — *M. compressa*, Michelin, *Icon.*, pl. 59, fig. 3, 1846. = Polypier en lame mince et subplane; calices peu profonds, larges de 10 à 15 millim.; 40 à 50 stries cloisonnaires. — *Carboniférien* : Tournay; Hook.

6. *M. GEOMETRICA*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 17, fig. 2. = Polyp. plat, libre ou encroûtant; calices régulièrement polygonaux et larges de 5 à 7 millim.; 28 stries cloisonnaires; planchers horizontaux et granulés. — *Dévonien* : Viré; Loué.

7. *M. CONCIENNA*, Lonsdale in Murchison, de Verneuil et Keyserling, *Russia and Ural*, pl. A, fig. 3, 1845. = Calices polygonaux et larges de 3 millim.; planchers horizontaux et serrés; de petites vésicules au bord des calices. — *Carboniférien* : Est de Ust-Koïva (Russie).

Nous rapportons encore à ce genre deux fossiles de l'étage corallien qui ne nous paraissent pas pouvoir prendre place dans un autre genre.

8. *M. EXCELSA*. = Polypier pédiculé, subturbiné, à surface convexe; calices irréguliers, assez profonds et larges de 7 à 9 millim.: 36 stries cloisonnaires, dont 6 plus fortes que les autres; planchers irrégulièrement horizontaux, écartés généralement de 1 à 1 1/2 mill.; hauteur du polyp, 30 à 35 millim.; largeur de la surface calicinale, environ 30 millim. — *Corallien* : Charcenne.

9. *M. CORALLINA*. = Cette espèce diffère de la précédente par sa forme qui est convexe en haut et subplane inférieurement; le plateau est recouvert d'une forte épithèque; les calices sont évasés, profonds de 3 à 4 millim., subégaux et larges de 9 à 10 mill.; les murailles s'épaississent à mesure que le polypierite grandit et acquièrent souvent au sommet une épaisseur de 3 à 4 mill.; 24 stries cloisonnaires, dont 6 plus marquées, elles sont assez épaisses et on n'en compte que 3 dans une étendue de 2 mill.

Les planchers sont irréguliers et vésiculeux; les calices augmentent en diamètre à mesure qu'ils s'élèvent; aussi trouve-t-on des échantillons de cette espèce qui ont des calices larges seulement de 5 à 6 mill. — *Corallien* : Charcenne (Haute-Saône).

XLI^e Famille — Chætétiniens.

Chætetinae, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier massif; murailles imperforées et soudées entre elles; cœnenchyme nul; cloisons rudimentaires.

GENRE CLXXX. — CONSTELLARIA.

Constellaria, Dana, *Zooph.*, 1849. — Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1851.

Stellipora, Hall, *Pol. of New-York*, 1847.

Polypier massif, présentant à sa surface de petits mamelons étoilés, convertis, ainsi que le reste de la surface, de petits calices circulaires.

L'espèce unique qui constitue ce genre a beaucoup de ressemblance avec certains bryozoaires, mais elle paraît en différer par des planchers qui divisent la loge en une série d'étages, et jusqu'à ce jour on n'a jamais rencontré de planchers dans les *testiers* des bryozoaires.

C. ANTHELOIDEA, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 20, fig. 7. — *Stellipora id.*, Hall, *loc. cit.* — d'Orbigny, 1850. = Polypier en branches rameuses et très-aplaties, et présentant à la surface des mamelons ou étoiles formées de 6, 8 ou 10 rayons; calices ronds et larges de 1/4 millim.; les étoiles sont lisses au centre et ont un diamètre de 2 ou 3 mill. — *Silurien* : Oxford (Ohio); Dayton; Cincinnati; Madison; comté de Lewis.

GENRE CLXXXI. — BAUMONTIA.

Baumontia, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier constitué par des polypières intimement soudés par les murailles; planchers vésiculeux, présentant quelquefois des dépressions cloisonnaires; épithèque assez bien développée.

1. B. VENELORUM, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 16, fig. 6. = Polyp. en masse arrondie; calices polygonaux, larges de 6 millim. et présentant des planchers qui offrent 6 dépressions irrégulières. — *Dévonien* : Nehou.

2. B. EGERTONI, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier élevé et lobé; calices polygonaux inégaux, larges au plus de 6 millim.; planchers horizontaux et souvent convexes. — *Carbonifère* : Sracrapagls.

3. B. LAXA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Columnaria id.*, M'Coy, 1849. = Polypières très-longues, tendant à s'isoler, mais le plus ordinairement unies et prismatiques; épithèque forte et complète; calices larges de 8 mill.; planchers formés de vésicules grandes et irrégulières. — *Carbonifère* : Wellington; Derbyshire.

4. B. GUERANGERI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 17, fig. 1. = Polyp.

lobé ; calices inégaux, larges de 2, 3 ou 4 mill., planchers souvent horizontaux et quelquefois obliques et vésiculeux. — *Déronien* : Viré ; Brulon ; Brest.

GENRE CLXXXII. — DANIA.

Dania. Edwards et Haime, *Compt. rend.*, 1849.

Polypier massif ; polypiérites prismatiques, soudés par les murailles et présentant des planchers qui se trouvent à la même hauteur dans toutes les loges du polypier ; cloisons nulles ; calices polygonaux.

D. HURONICA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 18, fig. 2. = Polypier en masse élevée : polypiérites parallèles et larges de 1 mill. ; planchers inégalement distants mais toujours placés à la même hauteur dans les loges ; on ne voit point de cloisons. — *Silurien* : Ile de Drummond.

GENRE CLXXXIII. — CHÆTETES.

Chætetes, Fischer, *Oryct. du Gt. de Moscon*, 1837.

Dianulites et *Orbitolites*, Eichwald, 1829.

Stenopora, Lonsdale in Murchison, 1844.

Monticulipora, d'Orbigny, 1850.

Polypier en masse plane, convexe ou subdendroïde ; polypiérites longs et basaltiformes ; murailles bien développées ; planchers nombreux, horizontaux et ne se montrant pas à la même hauteur dans toutes les loges ; point de cloisons.

A. — *Polypier dendroïde*,

1. C. RAMOSUS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 19 ; fig. 2. — *Monticulipora id.*, d'Orbigny, 1850. = Rameaux larges de 6 à 10 millim. ; mamelons coniques, un peu comprimés, larges et hauts de 1 1/2 millim. ; calices très-petits et subégaux. — *Silurien* : Cincinnati ; Madison.

2. C. DALII, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 19, fig. 6. = Rameaux cylindriques, larges de 6 à 8 mill. ; calices larges de 1/3 ou 1/4 de mill. ; mamelons coniques et saillants. — *Silurien* : Ohio.

3. C. RUGOSUS, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 20, fig. 6. = Cette espèce diffère du *C. ramosus* en ce que les mamelons sont ici très-allongés transversalement et simulent des bourrelets ; les calices ont environ 1/4 de millim. — *Silurien* : Ohio.

4. C. TORRUBIÆ, de Verneuil et J. Haime, *Bull. de la Soc. géol.*, 1850. = Rameaux larges de 1 à 2 cent. ; mamelons arrondis, larges de 2 mill. et substellés ; calices peu inégaux, larges de 1/2 à 2/3 de millim. — *Déronien* : Asturies ; Eifel ; Viré ; Ferques.

5. C. GOLDFUSSI, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Ceripora id.*, Michelin, pl. 48, fig. 9 et 10. — *Calamopora spongiles*, Goldfuss, pl. 64, fig. 10 (non pl. 28, fig. 3. — *Ceripora Boltoniensis*, Goldfuss et affinis, d'Orbigny, 1850. = Rameaux grêles et lisses ; calices larges de 1/4 ou 1/3 de mill. — *Déronien* : Ferques ; Viré.

6. *C. TUMIDUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Calamopora tumida*, Phillips, 1836. — *Alveolites id., irregularis et scabra*, Michelin, pl. 60, fig. 2, 4 et 3. — *Chaëtes Koniuckii: Ceriopora irregularis, inflata, tumida; Favosites tumida*, d'Orbigny, 1850. = Branches cylindroïdes; calices inégaux, larges de 1/4 de millim., et un peu plus grands sur les mamelons qui sont peu saillants, mais assez compactes. — Carboniférien : Tournay; Viré; Brough; Hooek; Clonea; Kulkeag; Benburn, etc.

7. *C. FLETCHERI*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Branches lisses et larges de 3 à 5 millim.; calices inégaux, larges de 1/4 à 1/2 millim. — Silurien : Dudley.

8. *C. PULCHELLUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Branches larges de 5 à 10 millim. et souvent comprimées; mamelons larges et substellés, ils sont polygonaux et inégaux. — Silurien : Wenlock; Dudley, etc.

9. *C.? CRASSUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Stenopora crassa*, Lonsdale in Murchison, 1845. — Keyserling, 1846. = Branches épaisses et divergentes; polypières longs, inclinés et brusquement tournés en dehors. — Permien : Ust-Vaga; Wytschegda (Russie).

10. *C.? OVATA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Stenopora id.*, Lonsdale in Strzelecki, 1845. = Rameaux larges de 15 mill.; diamètre des calices, 1/2 mill. — Terr. paléoz. : Wellington (Mouts); Norfolk; Van-Diemen.

B. — Polypier en masse mamelonnée.

11. *C. BOWERBANCKI*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Favosites spon-gites et Discopora squammata*, Lonsdale, *loc. cit.*, 1839. = Polypier mamelonné et subdendroïde; surface calicinale lisse; calices serrés, un peu penchés, larges de 1 à 1 1/2 millim. — Silurien : Dudley; Walsall, etc.

12. *C. MAMMULATUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 19, fig. 1. — *Monticulipora mammulata*, d'Orbigny, 1850. = Polypier en masse gibbeuse et lobée; mamelons forts et aplatis; calices polygonaux, larges de 1/5 de millim. — Silurien : Ohio; Dayton, etc.

13. *C. MILLEPORACEUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier gibbeux; calices larges de 1/4 de millim. et polygonaux; planchers nombreux et assez serrés. — Carboniférien : Cumberland; Ohio.

C. — Polypier frondescant ou lamelleux.

14. *C. FRONDOSUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 19, fig. 5. — *Monticulipora frondosa*, d'Orbigny, 1850. = Frondes larges, épaisses de 4 à 6 millim.; mamelons arrondis et peu saillants; calices inégaux, larges de 1/5 à 1/3 de mill. — Silurien : Cincinnati; Oxford (Ohio).

15. *C. PAVONIA*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 19, fig. 4. — *Ptilodictya paronia*, d'Orbigny, 1850. = Frondes épaisses de 2 ou 3 mill.; mamelons peu saillants; calices polygonaux et larges de 1/4 à 1/3 de mill. — Silurien : Cincinnati (Ohio).

D. — Polypier en masse convexe ou arrondie.

16. *C. RADIANS*, Fischer, pl. 33, fig. 3, 1830. — *C. dilatatus, cylindricus, jubatus et excentricus*, *ibid.* — *C. radians*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 20, fig. 4. — *C. id. et dilatatus*, Lonsdale, *Rus. and Ural.*, 1845. = Polypier pyriforme et convexe; calices inégaux et larges de 1/3 de mill.; surface calicinale lisse; planchers écartés de 2/3 de millim. — Carboniférien : Andoma; Pakhra; Tessovo; Kendal, etc.

Le *C. concentricus*, Fischer, paraît devoir être confondu avec cette espèce.

17. *C. PETROPOLITANUS*, Lonsdale in Murchison, 1845. — *Calamopora fibrosa* (pars), Goldfuss, pl. 64, fig. 9 (non pl. 28, fig. 3). — Eichwald, 1840. — Castelnau, 1843. — *C. lycoperdon* et *rugosus*, Hall, 1847. — *C. petropolitanus*, *lycoperdon* et *subfibrosus*, d'Orbigny, 1850. = Polypier convexe, couvert à la base d'une forte épithèque; mamelons arrondis, larges de 3 millim.; calices inégaux, larges de 1/2 millim.; planchers horizontaux distants de 1/5 de millim. — *Silurien*: Ottawa-River; Trenton; Ohio; Madison; Caradoc; Ony-River, etc.

18. *C. PANDERI*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Favosites petropolitanus*, Pander, Russ. *reiche*, pl. 1, fig. 8 (non les autres), 1830. = Polypier turbiné, entouré d'une épithèque et à surface convexe; les mamelons sont représentés par des cercles de calices arrondis, ceux-ci sont larges de 1/2 millim. — *Silurien*: Saint-Petersbourg.

19. *C. FILIASA*, Edwards et Haime. *loc. cit.* — *Monticulipora id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier fixe, à surface convexe, garnie de petits mamelons arrondis et coniques; calices larges de 1/4 ou 1/3 de millim. — *Silurien*: Kentucky; Francfort; Cincinnati (Ohio), etc.

20. *C. TRIGERI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 17, fig. 6. = Polypier convexe; calices inégaux, larges de 1 à 1 1/2 millim.; planchers horizontaux et distants de 1/2 millim. — *Dévonien*: Brulon (Sarthe).

21. *C. CRINITUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Stenopora crinita*, Lonsdale in Strzelecki, 1845. = Polypier convexe, en masse élevée et considérable; calices larges de 1 mill.; planchers horizontaux. — Illawara, Nouvelle-Galles du Sud.

E. — Polypier encroûtant.

21. *C. TUBERCULATUS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 19, fig. 3. = Polypier en couches minces et encroûtantes; mamelons petits et comprimés; calices polygonaux et larges de 1/4 à 1/3 de millim. — *Silurien*: Cincinnati; Oxford; Labanon (Ohio).

Espèces douteuses.

22. *C.?* *HEMISPHERICUS*. — *Orbitolites id.* et *apiculatus*; *Dianulites pyri-formis*, Eichwald, *Zool. spec.*, pl. 2, fig. 1, 3, 2. *Silurien*: Esthland.

23. *C.?* *DUBIUS*. — *Verticillopora dubia*, M'Coy, *Syn. of carbon.*, etc., pl. 27, fig. 12. — *Cerriopora id.*, d'Orbigny, 1850. — *Carboniférien*: Irlande.

24. *C.?* *POLYMORPHA*. — *Favosites id.*, Portlock, *Rep. on the Lond.*, pl. 21, fig. 2. — *Silurien*: Desertcreat.

25. *C.?* *HETEROSOLEN*, Keys. *Reise in das Pelsch.*, fig. a, b, 1846. — *Silurien*: Ylytsch.

26. *C.?* *OVATUS*. — *C. ovata*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Stenopora id.*, Lonsdale in Strzelecki, 1845. — *Silurien*: Norfolk; Van-Diemen.

27. *C. INFORMIS*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Stenopora id.*, Lonsdale, *loc. cit.* — *Silurien*: Spring-Hill; Van-Diemen.

28. *C. TASMANIENSIS*, Edwards et Haime, *l. c.* — *Stenopora id.* Lonsdale, *loc. cit.* — Islande.

MM. Edwards et Haime rapportent encore, avec doute, au genre *Chaetetes* les fossiles suivants :

CALAMOPORA MACKROTHII, Geinitz, 1848. — King, 1850. — Permien : Tunstall-Hill ; Humbleton-Hill.

STENOPORA COLUMNARIS, King, *Permian foss.*, etc., pl. 3, fig. 7, 8, 9. — Permien : Humbleton ; Tunstall-Hill ; Whitley.

ALVEOLITES BUCHIANA, King, *l. c.*, pl. 3, fig. 10, 11, 12. — Permien : Humbleton-Hill.

MILLEPORA GRONINGANA, Morren, *Des coral. Bel.*, pl. 6, fig. 1-2. — Belligue.

CHÆTETES LYCOPERDON (*pars*). Hall, *Pal. of New-York*, pl. 12, fig. 3 et pl. 24, fig. 18. — Watertown.

CHÆTETES SUBANTIQUA, d'Orbigny, 1850. — *O biculites antiqua*, M'Coy, *Syn. carb.*, etc. — Carboniférien : Irlande.

GENRE CLXXXIV. — DEKAYIA.

Dekayia, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier massif ; calices polygonaux ; murailles fortes et surmontées çà et là de petites colonnes pointues ; pas de cloisons.

D. ASPERA, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 16, fig. 2. = Polypier subdendroïde ; calices très-petits, polygonaux, ils ont à peine 1/4 de mill. ; colonnes murales nombreuses et striées. — Silurien : Ohio.

GENRE CLXXXV. — LABECHIA.

Labechia, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier massif, hérissé à sa surface calicinale de petites pointes qui existent sur le bord supérieur des murailles, celles-ci sont souvent interrompues ; cloisons rudimentaires.

L. CONFERTA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Monticularia conferta*, Lonsdale in Murchison, 1839. = Polyp. massif, en lames assez épaisses ; épithèque bien développée ; calices larges de 2/3 de millim. ; murailles épaisses de 1/2 millim. et couvertes de tubercules coniques, petits et sail-lants. — Silurien : Wenlock ; Benthall-Hedge ; Gleedon-Hill ; Ardaur ; Cong.

XLII^e Famille. — Pocilloporiens.

POCILLOPORINÆ. Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier en masse gibbeuse ou dendroïde ; murailles épaisses, imperforées et donnant lieu à la surface supérieure à un cœneuchyme compacte ; cloisons rudimentaires.

GENRE CLXXXVI. — POCILLOPORA.

Pocillopora (*pars*), Lamarck, 1816. — Dana, 1846. — Edwards et Haime, 1851.

Polypier à calices peu profonds et présentant au centre une saillie columellaire épaisse et transverse ; Cœnenchyme mural granulé.

P. MADREPORACEA, Edwards et Haime, *l. c.* — *Alveolites id.*, Lamarck, 1816. — *Madrepora glabra*, Goldfuss, pl. 30, fig. 7. — Michelin, pl. 14, fig. 1. = Polypier subdendroïde ; rameaux larges de 15 à 20 millim. ;

calices circulaires, larges de 1 millim. et présentant 12 cloisons peu développées. — *Falunien* : Dax ; Turin.

GENRE CLXXXVII. — CŒNITES.

Cœnites, Eichwald, *Zool. spec.*, 1829. — Edwards et Haime, 1851.

Limaria, Steininger, *Mém. de la Soc. géol.*, 1831.

Polypier massif, dendroïde ou frondescant ; calices allongés et présentant trois dents irrégulières ; cœnenchyme mural lisse.

1. C. JUNIPERINUS, Eichwald, 1829. — *Limaria Lonsdalei*, d'Orbigny, 1850. = Rameaux cylindroïdes, flexueux, larges de 5 à 6 mill. ; calices serrés, larges de 1/4 sur 1 millim. — *Silurien* : Dudley ; Lithuanie.

2. C. INTERTEXTUS, Eichwald, *Zool. spec.*, pl. 2, fig. 16, 1829. — Edwards et Haime, 1851. — *Limeria fruticosa*, Lonsdale, 1839 (non Steiniger). = Rameaux subcylindriques non coalescents ; calices triangulaires, larges de 2/3 de millim. et à bords élevés ; diamètre des branches, 5 à 8 mill. — *Silurien* : Dudley ; Wenlock ; Ledbury ; Abberley ; Vilna, etc.

3. C. LINEARIS, Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1851. = Polypier massif convexe ou gibbeux ; calices serrés, superficiels, linéaires, larges de 1/6 de millim. et longs de 1 à 1 1/4 millim. — *Silurien* : Dudley.

4. C. LABROSUS, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier pédiculé en forme de coupe ; calices espacés, à lèvres saillantes, larges de moins de 1 millim. ; 3 dents distinctes. — *Silurien* : Dudley.

Espèces douteuses.

5. C. CLATHRATUS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Limaria clathrata*, Steininger, 1831. = Rameaux coalescents, à calices anguleux. — *Dévonien* : Eifel.

6. C. FRUTICOSUS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Limaria fruticosa*, Steininger, 1831. = Rameaux cylindriques, rugueux comme une lime ; calices obliques, peu saillants et triangulaires. — *Dévonien* : Eifel.

7. C. ESCHAROIDES. — *Limaria id*, Steininger, *Vert. des Uberg.*, etc., 1849. — *Dévonien* : Eifel.

8. C. PUNCTATUS. — *Limaria punctata*, Steininger, *loc. cit.* — *Dévonien* : Eifel.

MM. Edwards et Haime pensent que le *LIMARIA ANGULARIS*, d'Orbigny (*Escharina id.*, Lonsdale in Murchison, *loc. cit.*), appartient à la classe des Bryozoaires.

XLIII^e Famille. — Thécostégitiniens.

HALYSITINÆ (*pars*), Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 155, 1851.

Polypier massif ; polypières libres mais unis par les côtes ou des expansions murales ; murailles non poreuses ; cloisons petites mais distinctes.

GENRE CLXXXVIII. — CHONOSTEGITES.

Chonostegites, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 299, 1851.

Polypier à croissance intermittente ; polypières formés par des

séries d'entonnoirs placés les uns sur les autres et qui envoient au dehors des expansions qui unissent entre eux les polypières; stries septales peu prononcées, planchers irréguliers et lisses; épithèque complète.

C. CLAPPI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 14, fig. 4. = Polypier élevé et arrondi; polypières formés par une succession d'entonnoirs évasés placés les uns sur les autres, la base en bas et réunis par des expansions qui partent des bords des entonnoirs; stries cloisonnaires égales et nombreuses; planchers irréguliers et convexes; les polypières sont larges de 8 à 10 millim. — *Dévonien*: Dayton.

GENRE CLXXXIX. — THECOSTEGITES.

Thecostegites, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, *loc. cit.*, p. 261, 1849.

Polypier submassif et encroûtant; polypières cylindriques, courts et unis par de fortes expansions murales situées à différentes hauteurs; planchers horizontaux; cloisons peu distinctes et au nombre de 12.

1. T. BOUCHARDI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, 1850. — *Harmodites id.*, Michelin, pl. 48, fig. 10. — *Harmodites id.*, *Geoporites americana* et *boloniensis*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier encroûtant, fixé sur d'autres corps; polypières circulaires, espacés, larges de 1 à 1 1/2 mill.; 12 petites dents cloisonnaires; planchers horizontaux. — *Dévonien*: Fergues; Eifel; Ohio.

2. T. AULOPOROIDES, de Verneuil et J. Haime, 1850. = Polypier subramifié; polypières rampants et larges de 2/3 de millim.; 12 dents cloisonnaires. — *Dévonien*: Ferrones (Asturies).

3. E. PARVULA, de Verneuil et J. Haime; 1850. = Polypier mince et encroûtant; polypières droits, peu saillants, assez espacés et larges de 1/4 de millim. — *Dévonien*: Ferrones.

GENRE CXC. — CYATHOPHORA.

Cyathophora, Michelin, *Icon. zooph.*, p. 104, 1843.

Stylina (pars), *Cyathophora (pars)*, Edwards et Haime, 1849-1856.

Cyathophora, E. de Fromentel, *Pol. foss. de l'étage néoc.*, p. 40, 1857.

Polypier massif; polypières cylindriques et unis par les côtes qui ne sont pas très-développées; planchers horizontaux et simples; cloisons représentées par des stries, plus ou moins saillantes, qui descendent le long de la paroi interne des murailles.

Ce genre, qui a pour type le *C. Richardi*, de M. Michelin, a été placé par MM. Edwards et Haime dans le sous-ordre des Zoanthaires Apores. Ces auteurs n'ont probablement pas eu entre les mains des échantillons bien conservés, car ce genre trouve naturellement sa place ici, tant à cause des planchers bien développés que

possèdent les espèces que nous allons décrire, que de leurs cloisons rudimentaires, et qui ne sont pas, comme J. Haime le pensait, le reste de cloisons brisées.

1. C. RICHARDI, Michelin, *Icon. zooph.*, p. 104, pl. 26, fig. 1. — *Astrea Bourgueti et spherica*, DeFrance, 1826. — *Stylina* et *Cyathophora Bourgueti*, Edwards et Haime, 1849 et 1851. — *Stylida Bourgueti* et *Cyathophora Richardi*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. (Nous avons cru devoir conserver le nom de *C. Richardi*, de M. Michelin qui, le premier, a donné la figure de ce fossile, au lieu des noms que DeFrance avait d'abord assignés à cette espèce). = Polypier en masse arrondie; calices peu saillants, assez serrés et larges de 5 millim.; côtes subégales et serrées; 3 cycles et des cloisons d'un 4^e; elles sont inégales et peu saillantes. — *Corallien* : Natheim; Champlitte; Tonnerre, etc.

2. C. ALVEOLATA. — *Astrea id.*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 22, fig. 3 (dans cette figure, les calices sont un peu trop écartés). — *Stylina id.*, Edwards et Haime, 1851 (non *Stylina astroides*). — *Cryptocænia id.*, d'Orbigny, *Prod.* = Polypier convexe; calices superficiels, profonds et larges de 6 millim.; côtes fortes et inégales; 4 cycles souvent incomplets; les stries cloisonnaires sont inégales selon les ordres. — *Corallien* : Natheim; Wurtemberg.

Le fossile que MM. Edwards et Haime ont décrit (*Hist. nat. du coral.*, p. 236) sous le nom de *Stylina alveolata*, ne peut pas avoir d'analogie avec l'*Astrea alveolata* de Goldfuss; ce doit être, en effet, une Styline qui provient du *Corallien* de Norvillards (Doubs).

3. C. CORALLINA. = Polypier en masse convexe; calices circulaires assez rapprochés; côtes peu développées; planchers horizontaux et assez rapprochés; 8 stries cloisonnaires bien développées et 8 rudimentaires; diamètre des calices, 3 à 4 millim.; profondeur, 2 à 3. — *Corallien* : Champlitte.

4. C. EXCAVATA, E. de Fromentel, *Pol. foss. de l'étage néocom.*, pl. 5, fig. 9-10. — *Cryptocænia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Stylina id.*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. = Polypier convexe; calices circulaires, larges de 4 millim., profonds de 3 à 4; 2 cycles complets; planchers un peu bombés au centre. — *Néocomien* : St-Dizier; Cheney.

5. C. ANTIQUA, E. de Fromentel, *loc. cit.*, p. 42. — *Cryptocænia id.*, d'Orbigny, *Prod.* — *Stylina id.*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier en lames étendues et ondulées; calices peu profonds et larges de 2 à 2 1/2 millim.; 3 cycles rudimentaires; côtes fortes et égales. — *Néocomien* : St-Dizier; Fontenoy; Veney; Cheney.

Les *Cyathophora Pratti*, *Lucensis* et *Monticularia* de MM. Edwards et Haime, *loc. cit.*, appartiennent à d'autres genres.

XLIV^e Famille. — Théciens.

THECIDÆ, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 158. — ASTRÆACÆ (pars), *Hist. nat. des coral.*, p. 455, 1856.

Polypier massif; murailles bien développées ou nulles; cloisons lamellaires n'atteignant pas le centre du calice; planchers bien développés.

GENRE CXCI. — COLUMNARIA.

Columnaria (pars), Goldfuss, *Petref. Germ.*, p. 72, t. 1, 1826. — Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier massif; calices polygonaux; murailles bien distinctes des cloisons et compactes; planchers horizontaux.

1. C. ALVEOLATA, Goldfuss, *loc. cit.*, pl. 24, fig. 7. — Bronn, 1835. — Edwards, 1836. — Edwards et Haime, 1851. — Hall, 1847. = Polypier élevé en masse astréiforme; murailles simples et polygonales; calices larges de 6 à 7 millim.; 12 à 18 cloisons peu développées; planchers distants de 1 à 1 1/2 millim. — *Silurien*: Ohio; Madison; Tennessee; Chazy; Lowville, etc.

2. C. GOTHLANDICA, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 14, fig. 2. = Polyp. astréiforme; calices polygonaux, larges de 7 millim.; 18 à 22 cloisons subégales et minces; planchers distants de 2 1/2 millim. — *Silurien*: Gothland.

GENRE CXCII. — THECIA.

Thecia, Edwards et Haime, *Compt. rend.*, *loc. cit.*, 1849.

Polypier massif, présentant un faux cœnenchyme, qui est le résultat de la soudure latérale des cloisons, celles-ci sont épaisses et subconfluentes; les calices sont ronds, peu profonds et à planchers épais.

1. T. SWINDERNANA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, 1850, et *Pol. des terr. pal.*, 1851. — *Agaricia id.*, Goldfuss, pl. 38, fig. 3. — Morren, 1832. — *Astreopora expaliata*, d'Orbigny, 1850. = Polypier plane ou gibbeux, libre ou fixé; calices inégaux, larges de 1 mill.; 12 à 18 cloisons bien développées, épaisses et subflexueuses; planchers horizontaux. — *Silurien*: Gothland; Groningue; Dudley; Wenlock; Aston, etc.

2. T. GRAYANA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 307, 1851. = Polypier en lames minces et fines; calices à fossette ronde et larges de 1 1/4 millim.; 12 cloisons égales, serrées, épaisses et confluentes. — *Silurien*: Dudley.

3. T.? LONSDALEI. — *Hydnophora Sternbergii*, Lonsdale, *Russ. and Ural*, 1845 (non Fischer). — *Silurien*: Meshkovitza.

GENRE CXCIH. — CLAUSASTRÆA.

Clausastrea, d'Orbigny, *Note sur les pol. foss.*, p. 9, 1849.

Polypier massif, à surface subplane; calices ronds et peu profonds; murailles rudimentaires ou nulles; polypières prismatiques; cloisons minces, subconfluentes et n'atteignant jamais le centre du calice; planchers bien développés, déprimés au centre et se continuant et à un même horizon entre les rayons septo-cos-taux sous forme de traverses continues qui unissent les cloisons.

Ce genre a été placé par MM. Edwards et Haime, d'Orbigny, etc., parmi les ZOANTHAIRES APORES; mais les échantillons nombreux et bien conservés que nous avons étudiés, ne nous ont laissé aucun

doute sur la disposition des organes internes de ces polypiers, et nous n'avons pas hésité à les placer parmi les ZOANTHAIRES TABULÉS, à côté des *Thecia*, avec lesquels ils ont assez d'analogie.

A. — De 32 à 36 cloisons.

1. C. LIMITATA. = Polypier en lames étendues et subplanes; calices petits, peu profonds et bien séparés les uns des autres par un petit sillon jusqu'auquel les rayons septo-costaux arrivent, mais qu'ils ne franchissent pas; 36 cloisons inégales selon les ordres; diamètre des polypiérites, 6 à 7 mill.; de la fossette calicinale, 2 à 3 mill. — *Corallien* : Champlitte.

2. C. EDWARDSI. = Polypier à surface subplane; calices un peu déformés et assez profonds; cloisons assez épaisses, serrées, confluentes et géniculées à leur point de rencontre avec les cloisons voisines, on en compte 32 par calice, dont 14 arrivent près du centre en se soudant deux à deux et en formant des angles aigus; planchers bien développés, assez épais et très-rapprochés; diamètre des calices, 7 à 8 mill.; de la fossette, 4 à 5. — *Corallien* : Gy (Haute-Saône.).

3. C. COSTATA. = Polypier un peu convexe; calices ronds et assez profonds; rayons septo-costaux confluentes mais géniculés en dehors; cloisons minces, élevées et réunies par des traverses larges et continues; pourtour de la fossette un peu saillant; 32 cloisons dont 6 plus développées; diamètre des calices, 6 à 7 millim.; de la fossette, 2 à 3. — *Corallien* : Charcenne; Champlitte.

4. C. CONSOBRINA, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Synastrea id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Calices larges de 8 à 10 millim.; 34 cloisons minces, droites, un peu inégales et subconfluentes; traverses distantes de 1/2 millim. — *Bajocien* : Langres.

B. — De 24 à 30 cloisons.

5. C. PARVA, Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, 1856. = Polyp. convexe; calices larges de 6 mill.; 26 à 30 cloisons minces et inégales; planchers distants de 1/2 millim. — *Corallien* : Belfort; Champlitte; Gy.

6. C. TESSELLATA, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — Edwards et Haime, 1851. = Polypier à surface subplane; calices larges de 16 à 18 mill.; 24 cloisons minces, subégales et écartées; traverses flexueuses et distantes de 1 1/2 millim.; planchers horizontaux au centre des calices. — *Bajocien* : Langres.

C. — De 18 à 20 cloisons.

7. C. DUBIA. = Polypier à surface subplane; calices petits, à fossette ronde et entourée d'une légère saillie formée peut-être par des cloisons débordantes; rayons septo-costaux tout à fait confluentes, longs et sensiblement dirigés dans le même sens; 18 à 20 cloisons dont 6 plus développées que les autres; diamètre des fossettes, 2 à 2 1/2 millim., elles sont très-rapprochées dans un sens et écartées de 4 à 6 millim. dans l'autre. — *Corallien* : Champlitte.

SOUS-ORDRE V. — ZOANTHAIRES RUGUEUX.

Appareil septal dépendant toujours du type tétraméral, qui est représenté ou par de grandes cloisons ou par des fossettes septales; multiplication par bourgeonnement; peu ou point de cœenchyme; cloisons généralement bien développées et ne se montrant jamais poreuses ni poutrellaires; planchers bien développés, simples ou composés et vésiculeux.

Monastrées Rugueux.

XLV^e Famille. — Cystiphylliens.

Cystiphyllidæ, Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. pal.*, 1851.

Polypier constitué par un tissu vésiculaire; cloisons rudimentaires représentées par des stries peu marquées.

GENRE CXCIV. — CYSTIPHYLLUM.

Cystiphyllum, Lonsdale in Murchison, *Sil. syst.*, p. 691, 1839. — Dana, 1846.

Polypier turbiné; épithèque complète; columelle nulle; loge entièrement remplie de petites traverses vésiculaires.

1. *C. VESICULOSUM*, Phillips, pl. 4, fig. 12, 1841. — De Verneuil et J. Haime, 1850. — Edwards et Haime, 1851. — *C. secundum*, d'Orbigny, 1850. — *Cyathophyllum vesiculosum*, Goldfuss, pl. 17, fig. 5; pl. 18, fig. 1; pl. 17, fig. 2^k; pl. 18, fig. 2. = Polypier allongé et contourné; épithèque plissée; vésicules larges de 2 à 3 millim.; hauteur du polypier, de 8 à 30 centim.; diam., de 4 à 8 centim. — *Dévonien* : Eifel; Keldenich; Ohio; Torquay; Plymouth, etc.

2. *C. LAMELLOSUM*, d'Orbigny (*pars*), *Prod.*, 1850. — Edwards et Haime, 1851. — *Cyathophyllum id.*, Goldfuss, pl. 18, fig. 3. — *C. placetiforme id.*, pl. 18, fig. 4. = Polypier peu élevé et assez large, formé de disques empilés et réunis par une forte épithèque; calices circulaires, superficiels, larges de 5 ou 6 centim.: vésicules grosses; stries peu marquées; hauteur du polypier, 2 à 3 centim. — *Dévonien* : Eifel.

3. *C. AMERICANUM*, Edwards et Haime, *Pol. fos. des terr. pal.*, pl. 13, fig. 4. — *C. cylindricum*, Hall, 1843. = Polypier allongé; épithèque fine et plissée; calices ronds et larges de 4 à 5 mill.; vésicules larges surtout au centre; hauteur du polyp., 8 ou 9 cent. — *Dévonien* : Lac Skeneateles; York; Moscou, etc.

4. *C. CYLINDRICUM*, Lonsdale in Murchison, 1839. — Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1839. = Polypier allongé, droit et couvert de bourrelets épithécaux et quelquefois de prolongements radiciformes; calices peu profonds, larges de 10 à 15 mill.; hauteur du polypier, 50 mill. — *Silurien* : Benthall-Edge; Dudley, etc.

5. *C. GRAYI*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier turbiné, droit

et pédicellé; environ 70 côtes subégales; diamètre du calice, 30 à 50 mill.; hauteur du polypier, 60 à 70 millim. — *Silurien* : Dudley.

6. *C. SILURIENSE*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Id. (pars)*, Lonsdale in Murchison, 1839. — *C. vesiculosum*, Eichwald, 1840. = Polypier turbiné, droit, court et large; calices très-vésiculeux et larges de 60 mill.; hauteur du polypier, 40 à 50 millim. — *Silurien* : Wenlock; Dudley; Ardaun; Cong; Reval; Powlowsk.

Espèces douteuses.

7. *C. IMPUNCTUM*, Lonsdale, *loc. cit.* = Cette espèce, à en juger par la description qui en est donnée, doit appartenir aux Disastrées rugueux. — *Silurien* : Russie.

8. *C. EXCAVATUM*; Keyserling, 1846. = *Silurien* : Wachkina.

XLVI^e Famille. — Axophylliens.

Axophyllinae (pars), Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier entouré d'une épithèque complète; deux murailles; columelle essentielle et forte; loge remplie par un tissu vésiculaire abondant.

GENRE CXCIV. — AXOPHYLLUM.

Axophyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, p. 72, 1850.

Polypier turbiné; parties externes vésiculeuses et recouvertes d'une épithèque complète; columelle grosse, formée de lames tordues; muraille interne bien distincte; cloisons bien développées et lamellaires.

1. *A. EXPANSUM*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 12, fig. 3, 1851. = Polypier allongé, turbiné, haut de 30 millim.; columelle peu saillante et elliptique; 60 cloisons inégales et droites; calices larges de 25 millim. — *Carboniférien* : Visé.

2. *A. RADICATUM*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 12, fig. 4. — *Cyathophyllum id.*, de Koninck, *Mss.* = Polypier turbiné, courbé et haut de 30 à 40 mill.; 72 cloisons droites et inégales; calice large de 30 à 35 mill.; columelle forte; extérieur vésiculeux, recouvert par une forte épithèque. — *Carboniférien* : Visé.

3. *A. KONINCKI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 13, fig. 2. = Polypier droit, turbiné et haut de 10 millim.; 48 cloisons inégales; calice large de 6 à 7 millim.; columelle cannelée et rugueuse. — *Carboniférien* : Visé.

XLVII^e Famille. — Polycæliens.

Stauridae (pars), Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 161, 1851.

Polypier ayant les cloisons bien développées et point de fossettes septales; murailles fortes et imperforées; cloisons s'étendant dans toute la hauteur du polypier.

GENRE CXCVI. — POLYCÆLIA.

Polycælia, King, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, 2^e série, t. III, 1849.

Polypier trochoïde; calice divisé en 4 systèmes par 4 cloisons plus développées que les autres.

1. *P. DONATIANA*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1851. — *Calophyllum Donatianum*, King, 1850. = Polypier petit et allongé; 4 grandes cloisons et 16 petites. — Permien : Humbleton-Hill.

2. *P. PROFUNDA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Cyathophyllum profundum*, Germer, 1840. — Geinitz, 1842, 1848. — *Petraia dentalis*, King, 1848. — *P. profunda*, King, 1850. — *Caryophyllia quadrifiga*, Howse, 1848. = Polypier conique et un peu courbé; 24 cloisons dont 4 plus développées que les autres. — Permien : Ilmenau ; Humbleton.

GENRE CXCVII. — METRIOPHYLLUM.

Metriophyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals.*, 1850.

Polypier turbiné et adhérent; cloisons bien développées et un peu contournées, elles s'étendent jusqu'au centre du calice; traverses simples et se correspondant dans les diverses chambres; les cloisons des premier, second et troisième cycles sont sensiblement égales,

1. *M. BOUCHARDI*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Cyathophyllum mitratum*, Michelin, *Icon.*, pl. 47, fig. 7. = Polypier turbiné, libre ou adhérent et à peu près droit; de 22 à 24 cloisons principales, un peu flexueuses au centre et alternant avec un nombre égal de petites cloisons; planchers horizontaux; diamètre du calice, 10 millim.; hauteur du polypier, 20 ou 30 millim. — Dévonien : Ferques, près Boulogne.

2. *M. BATTERSBYI*? Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. = Calice large de 20 millim.; 48 cloisons principales alternant avec un nombre égal de petites, elles sont assez minces et un peu flexueuses au centre. Cette espèce n'est encore connue que par une coupe horizontale faite près du calice; on ne connaît pas le polypier entier. — Dévonien : Torquay.

XLVIII^e Famille — Zaphrentiniens.

Zaphrentinae, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier libre ou subpédicellé; calice présentant une seule fossette septale, qui est quelquefois remplacée par un sillon ou une crête, et détermine ainsi plus ou moins d'irrégularité dans la forme radiaire de l'appareil septal.

GENRE CXCVIII. — COMBOPHYLLUM.

Combophyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, p. LXVII, 1850.

Polypier discoïde; cloisons débordantes et régulièrement radiées; une seule fossette septale; muraille nue et costulée.

1. *C. OSISMORUM*, Edwards et Haime, *Pol. foss.*, pl. 2, fig. 2. = Polyp. à plateau horizontal et couvert de côtes striées et inégales; 14 grandes cloisons et 14 petites, elles paraissent dentées; hauteur du polypier, 2 millim.; largeur, 7 ou 8. — *Dévonien* : Brest.

2. *C. LEONENSE*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 6, fig. 6. — *Disco-phyllum id.*, de Verneuil et Haime, *Bull. de la Soc. géol.*, 1850 = Polypier mince et plane en dessous; côtes fines et droites; 26 cloisons principales tendant à former quatre groupes et alternant avec un nombre égal de petites cloisons; hauteur, 2 ou 3 millim.; largeur, 12. — *Dévonien* : Peña de la Venera (Léon).

GENRE CXCIX. — AMPLEXUS.

Amplexus, Sowerby, *Miner. conchol.*, 1814.

Cyathopsis, d'Orbigny, *Prod.*, 1850.

Polypier allongé et entouré d'une forte épithèque; cloisons n'atteignant jamais le centre du calice et y laissant une surface plane et lisse; planchers très-développés; fossette septale bien marquée.

1. *A. CORALLOIDES*, Sowerby, *loc. cit.*, pl. 72. — Bronn, 1824. — De Koninck, 1842. — Michelin, 1846. — Edwards et Haime, 1851. = Polypier long et contourné, large de 4 à 5 centim.; de 28 à 58 cloisons égales, écartées et minces. Ce fossile n'est connu que par des fragments de différentes tailles. — *Carboniférien* : Cork; Tournay; Visé; Dublin, etc.

2. *A. CORNU-BOVIS*, Edwards et Haime, *Pol. des terr. pal.*, pl. 2, fig. 1. — *Cyathophyllum mitratum*, de Koninck, *Anim. foss. des terr. carb.*, pl. C, fig. 5^d (non les autres). — *Caninia cornu-bovis*, Michelin. *Icon.*, pl. 47, fig. 8. — *Cyathopsis id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypier très-allongé, courbé et large de 20 millim.; 60 cloisons inégales; hauteur, 7 à 8 centim. — *Carboniférien* : Tournay. — *Dévonien* ? : Ferques.

3. *A. YANDELLI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 3, fig. 2. = Polypier long et irrégulièrement contourné; calice peu profond et large de 15 mill.; 76 cloisons inégales, minces et droites; longueur du polypier, 70 millim. — *Dévonien* : Chutes de l'Ohio.

4. *A. NODULOSUS*, Phillips, *Palæoz. foss.*, 1841. — M'Coy, 1844. — *A. serpuloides*, de Koninck, 1842. — Michelin, 1846. = Polypier très-long et flexueux; épithèque formant des bourrelets saillants; 30 cloisons peu développées; diamètre, 6 millim.; longueur, 60 à 80 millim. — *Carboniférien* : Visé; Irlande.

5. *A. ANNULATUS*, de Verneuil et Haime, 1850. = Polypier très-long et peu contourné, présentant à des intervalles de 20 mill. des bourrelets saillants; 32 cloisons peu développées; diamètre, 18 mill.; longueur, de 10 à 11 centim. — *Dévonien* : Vire; Brulon; Espagne.

6. *A. SPINOSUS*, de Koninck, *loc. cit.*, pl. C, fig. 1. — *Cyathaxonia spinosa*, Michelin, *Icon.*, pl. 59, fig. 10. = Polypier allongé et peu contourné; bourrelets peu marqués; 32 cloisons inégales; côtes subégales, planes en haut et épineuses en bas; hauteur, 30 à 40 millim.; diamètre du calice, 10 millim. — *Carboniférien* : Tournay; île de Man.

7. *A. HENSLOWI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 10, fig. 3. — *Cyathophyllum ceratites*, Michelin, pl. 47, fig. 3 (non Goldfuss). = Polypier turbiné et arqué; cloisons nombreuses et inégales; diamètre, 4 à 5 cent.; hauteur, 6. — *Carboniférien* : Visé; île de Man.

8. *A. TORTUOSUS*, Phillips, *Palæoz. foss.*, pl. 3, fig. 8, 1841. = Polyp. allongé et tortueux; 24 cloisons marginales; planchers bien développés; côtes et bourrelets bien marqués extérieurement. — *Dévonien*: Plymouth; Torquay; Barton, etc.

Espèces douteuses.

9. *A.?* *ORNATUS*, Eichwald, *Bull. de la Soc. de St-Petersbourg*, 1840. — Fossile de Bystriza.

10. *A.?* *DECORATUS*, Eichwald, 1846. — Russie.

11. *A.?* *ARUNDINACEUS*, Lonsdale in Strzelecki. — Nouvelles-Galles du Sud.

GENRE CC. — ZAPHRENTIS.

Zaphrentis, Rafinesque et Clifford, *Ann. des sc. phys. de Bruxell.*, 1820.

Caninia, Michelin, *Dict. des sc. nat.*, 1841.

Siphonophyllia, Scouler in Mac Coy, 1844.

Polypier trochoïde, libre ou pédicellé; épithèque complète; fossette septale bien marquée et occupant la place d'une cloison; columelle nulle; planchers peu développés et couverts par les cloisons qui s'étendent de la muraille au centre du calice; cloisons nombreuses, denticulées et bien développées.

A. — *Planchers bien développés; fossette septale bien marquée.*

1. *Z. PATULA*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Caninia* id., Michelin, *Icon.*, pl. 59, fig. 4. = Polypier conique, courbé et pédicellé; fossette située dans le sens de la courbure; 40 cloisons égales et minces; hauteur, 5 à 6 cent.; diamètre du calice, 4. — *Carboniférien*: Boulogne; Torquay; Hook; Wexford.

2. *Z. CYLINDRICA*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Caninia gigantea*, Michelin, *Icon.*, pl. 16, fig. 1. — *Siphonophyllia cylindrica*, Scouler in Mac Coy, 1844. — d'Orbigny, 1850. = Polypier très-long et arqué; bourrelets bien marqués; 60 grandes cloisons minces, serrées, subégales et alternant avec un nombre égal de petites; planchers serrés, séparés par des vésicules; diamètre, 5 à 7 centim.; hauteur, 20 à 30 centim. — *Carboniférien*: Sablé; Tournay; île de Man; Angleterre.

3. *Z. GIGANTEA*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 4, fig. 1. — *Caryophyllia* id., Lesueur, 1820. — *Zaphrentis Clappi*, de Verneuil et J. Haime, *loc. cit.*, 1850. = Polypier cylindroconique et allongé; fossette septale petite; 70 cloisons égales, un peu flexueuses au centre, alternant avec un nombre égal de petites; longueur du polypier, 40 à 50 centim.; diamètre du calice, 7 à 8. — *Dévonien*: Ohio; Waren; Sabero? (Léon).

4. *Z. RÖMERI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1851. = Polypier conique, allongé, arqué et présentant de forts bourrelets transversaux; fossette marginale et située du côté de la grande courbure; 40 cloisons minces, peu inégales, flexueuses au centre et alternant avec un nombre égal de petites cloisons; hauteur, 4 à 5 centim.; diamètre du calice, 3 à 3 1/2. — *Silurien*: Bethleem; Halderberg-Mountains; Moscow.

5. *Z. HALLI*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier allongé et sub-turbiné; épithèque forte formant des bourrelets saillants et rapprochés;

50 cloisons minces, subégales, un peu flexueuses au centre et 50 petites cloisons qui alternent avec les précédentes; longueur, 15 centim.; diam., 4. — *Dévonien* : Lac Skeneateles (New-York).

B. — *Planchers peu développés; fossette septale bien marquée.*

6. *Z. CORNICULA*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 6, fig. 1. — *Caryophyllia id.*, Lesueur, 1820. — *Z. phrygia*, Rafinesque et Clifford, 1820. — *Caninia punctata*, d'Orbigny, 1850. — *Cyathophyllum Ammonis, dilatatum, conicum*, de Castelnau, *Terr. sil. de l'Amér. du Nord*, pl. 21, fig. 1, 2 et 3. — Polypier conique, allongé et arqué à la base: fossette longue et profonde située du côté de la grande courbure; de 72 à 92 cloisons minces, serrées et alternativement inégales; diamètre du calice, 5 centim.; hauteur du polypier, 8. — *Dévonien* : Ohio (lac Huron); Clark-Country.

7. *Z. CENTRALIS*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 3, fig. 6. — Polypier allongé et courbé; épithèque mince et lisse; fossette large, centrale et située dans le sens de la petite courbure; 40 cloisons assez épaisses et peu inégales; hauteur, 30 mill.; diamètre du calice, 20. — *Carboniférien* : Louisville (Kentucky).

8. *Z. RAFINESQUEI*. — *Z. Rafinesquii*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 3, fig. 7. — Polypier allongé, contourné et à bourrelets bien marqués; fossette étroite et située dans le sens de la petite courbure; 32 cloisons fortes, dentelées, subflexueuses et alternant avec un nombre égal de petites cloisons; hauteur, 6 à 7 centim.; diamètre du calice, 2 centim. — *Dévonien* : Chutes de l'Ohio.

9. *Z. CLIFFORDI*. — *Z. Cliffordana*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 3, fig. 5. — Polypier conique, courbe et lisse; fossette grande et située du côté de la petite courbure; de 32 à 36 grandes cloisons assez épaisses et alternant avec un nombre égal de petites cloisons; hauteur, 3 à 4 centim.; diamètre du calice, de 1 1/2 à 2 cent. — *Carboniférien* : Louisville.

10. *Z. DALII*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 329. — Cette espèce, voisine de la précédente, ne paraît en différer que par des cloisons plus nombreuses et pourrait bien n'en être qu'une variété; de 60 à 70 cloisons un peu inégales; hauteur, 5 centim.; diamètre du calice, 2 1/2. — *Carboniférien* : Varsaw (Amérique septentrionale).

11. *Z. STOKESI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 3, fig. 9. — Polypier allongé, un peu courbé et comprimé; fossette large, dirigée dans le sens de la grande courbure; 64 grandes cloisons alternant avec un nombre égal de petites; hauteur, 8 centim.; largeur du calice, 4. — *Silurien* : Ile Drummond.

12. *Z. MICHELINI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 3, fig. 8. — Polypier turbiné et un peu courbé; fossette large, dirigée dans le sens de la grande courbure; 36 grandes cloisons épaisses, 36 plus petites; hauteur, 5 cent.; largeur du calice, 4. — *Dévonien* : Eifel.

13. *Z. CORNU-COPIE*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 5, fig. 4. — *Caninia id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 59, fig. 5. — Polypier petit, turbiné et courbé; calice ovalaire large de 10 millim.; 32 cloisons assez épaisses, bien développées et alternant avec un nombre égal de plus petites; hauteur, 20 millim. — *Carboniférien* : Vourmay; Glasgow; Ile de Man.

14. *Z. KONINCKI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 5, fig. 5. — Cette espèce, voisine de la précédente, en diffère par son calice circulaire, sa fossette septale plus large et par 30 cloisons bien développées, alternant

avec un nombre égal de cloisons rudimentaires. — *Carboniférien* : Tournay; Ath.

15. Z. PHILLIPSI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 5, fig. 1. = Polypier turbiné et courbé; fossette située du côté de la grande courbure; 32 cloisons principales bien développées et 32 petites; hauteur, 20 millim.; diamètre du calice, 15 mill. — *Carboniférien* : Sablé; Tournay; Ath, etc.

16. Z. DELANOUËI. — Z. Delanouii. Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 5, fig. 2. — *Cyathophyllum mitratum (pars)*, de Koninck, 1842. — *Caninia ibirina*, Lonsdale, 1845. = Polypier trochoïde, peu courbé; fossette située du côté de la petite courbure; de 28 à 30 cloisons fortes, alternant avec un nombre égal de petites; hauteur, 30 millim.; diamètre du calice, 15 millim. — *Carboniférien* : Tournay; Velikovo (Russie).

17. Z. DESORI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 333. = Polypier en cône courbé; fossette située dans le sens de la petite courbure; environ 40 grandes cloisons et 40 petites; hauteur, 30 millim.; diamètre du calice, 20 mill. — *Dévonien* : Ténésée; Perry-County.

Cette espèce n'est probablement qu'une variété du Z. *Cliffordi*.

18. Z. GRIFFITHI, Edwards et Haime, *loc. cit.* — Polypier en cône court et courbé; fossette forte et située dans le sens de la grande courbure; 36 cloisons principales un peu inégales et alternant avec un nombre égal de cloisons rudimentaires; hauteur, 25 millim.; diamètre du calice, 25 à 27 millim. — *Carboniférien* : Clifton.

19. Z. SPINULOSA, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 5, fig. 7. = Polypier trochoïde et peu courbé; épithèque mince et formant à la base de petites éminences épineuses; 60 cloisons alternativement inégales; hauteur, 30 mill.; diamètre du calice, 15 à 20. — *Carboniférien* : Chester et Kaskakia.

20. Z. ENNISKILLIENI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 334. = Polypier conique et courbé; fossette située du côté de la petite courbure; 80 cloisons alternativement inégales et fortes; hauteur, 60 millim.; diamètre du calice, 30. — *Carboniférien* : Longh-Gill (Irlande).

21. Z. DENTICULATA, Edwards et Haime, *l. c.*, p. 335. — *Anthophyllum denticulatum*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 13, fig. 11. — Milne-Edwards, 2^e édit. de *Lamarch*, 1836. = Calice circulaire et large de 20 mill.; fossette septale petite; 44 cloisons larges, dentelées et alternant avec un nombre égal de petites; hauteur, 4 ou 5 centim. — *Silurien* : Niagara.

C. — Planchers peu développés; fossette septale peu prononcée.

22. Z. TORTUOSA, Edwards et Haime, *l. c.*, p. 335. — *Cyathophyllum plicatum*, de Koninck, 1842 (non Goldfuss), pl. C, fig. 4^a et 4^b. — *Caninia flexuosa*, M'Coy, *Ann.*, 2^e série, t. III, p. 133. = Polyp. allongé, tortueux et courbé; fossette peu marquée; environ 100 cloisons étroites, serrées et inégales; hauteur, 80 millim.; diamètre du calice, 3 ou 4 centim. — *Carboniférien* : Tournay; Kendal.

23. Z. CYATHOPHYLLOIDES, Edwards et Haime, pl. 5, fig. 8. = Polyp. cylindro-conique et courbé; fossette située en dehors du plan de la courbure; environ 120 cloisons assez bien développées et inégales; hauteur, 60 mill.; largeur du calice, 25 mill. — *Dévonien* : Ferques, près Boulogne.

24. Z. GUERANGERI, Edwards et Haime, *l. c.*, pl. 5, fig. 9. = Polypier trochoïde, pédiculé et peu courbé; fossette septale, petite et située en dehors du plan de la courbure; 80 cloisons très-minces et inégales; hauteur, 5 à 6 cent.; largeur du calice, 4. — *Carboniférien* : Juigné, près Sablé.

25. *Z. EXCAVATA*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 2, fig. 5. = Polypier turbiné et pédiculé; fossette peu marquée; 90 cloisons très-étroites, minces et un peu inégales; des vésicules endothécales au pourtour interne du calice; hauteur, 4 centim.; diamètre du calice, de 4 à 4 1/2 centim. — Carboniférien : Juigné, près Sablé (Sarthe).

Cette espèce établit un passage entre les *Zaphrentis* et les *Cystiphyllum* en participant aux caractères de ces deux genres.

26. *Z. OMALIUSI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 5, fig. 3. = Polypier en cône courbé; fossette septale petite et située dans le sens de la grande courbure; 26 cloisons fortes, un peu flexueuses au centre et un nombre égal de petites; hauteur, 25 millim.; diamètre du calice, 12 millim. — Carboniférien : Tournay.

27. *Z. MARCOUI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 337. = Polyp. conique, allongé et droit, fossette septale peu marquée; 26 cloisons subégales, épaisses en dehors, minces en dedans et atteignant le centre; hauteur, 30 millim.; diamètre du calice, 18. — Silurien : Lockport (Amérique du Nord).

28. *Z. NÆGGERATHI*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 338. — *Cyathophyllum ceratites (pars)*, Goldfuss, *Petref.*, pl. 17, fig. 2^a, 2^d (non les autres). = Polypier en cône court et courbé; fossette peu marquée et située du côté de la grande courbure; environ 40 cloisons subégales; haut., 20 mill.; largeur du calice, autant. — Dévonien : Eifel.

29. *Z. BOWERBANKI*, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier cylindro-turbiné, courbé et allongé; bourrelets bien marqués; fossette petite et située du côté de la petite courbure; 48 cloisons fortes et inégales; hauteur, 40 à 50 millim.; largeur du calice, 12. — Carboniférien : Oswestry; Frome.

GENRE CCI. — AULACOPHYLLUM.

Aulacophyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, 1850.

Polypier libre ou pédiculé; cloisons nombreuses et bien développées, mais irrégulièrement radiaires dans une moitié du calice où elles sont séparées par une fossette septale vers laquelle elles convergent pour venir s'entrecroiser au fond du sillon; columelle nulle, planchers peu développés.

1. *A. SULCATUM*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 6, fig. 2. — *Caninia sulcata*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polyp. conique et courbé; calice subovalaire, large de 45 millim. sur 37; fossette située dans le sens de la grande courbure; 70 cloisons minces et bien développées et dont presque la moitié vient s'entrecroiser dans la fossette; un nombre égal de cloisons rudimentaires; hauteur, 60 millim. — Dévonien : Rapides de l'Ohio (Amérique).

2. *A. ELHUYARI*, de Verneuil et Haime, *Bull. de la Soc. géol. de France*, 1850. = Polyp. conique et courbé; calice penché et large de 25 millim.; fossette bien marquée; environ 40 cloisons bien développées, un peu flexueuses; celles qui se portent dans le sillon se croisent avec celles qui leur sont opposées; 40 petites cloisons intermédiaires; hauteur du polyp., 40 à 50 millim. — Dévonien : Sabero (Espagne).

3. *A. MITRATUM*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 2, fig. 6. — *Hippurites mitratus (pars)*, Schlottheim, 1820. — *Turbinolia obliqua, furcata, mitrata*,

Hisinger, 1831, 1837. — *Cyathophyllum mitratum*, Geinitz, 1845-1846. = Polyp. allongé et arqué; sillon peu marqué; 34 cloisons principales dont la moitié se croisent dans le sillon; 34 petites cloisons rudimentaires; hauteur, 4 à 5 centim.; diamètre du calice, 2. — *Silurien* : Gothland; Dudley, etc.

GENRE CCII. — BARYPHYLLUM.

Baryphyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, intr., p. LXVI, 1850.

Polypier court et subdiscoïde; calice superficiel; une fossette septale peu développée et formant l'une des branches d'une croix dont les trois autres sont constituées par des cloisons primaires plus fortes et plus saillantes que les autres; les cloisons des autres ordres s'infléchissent vers les primaires.

B. VERNEUIL. — *B. Verneuillanum*, Edwards et Haime, *Pol. foss.*, pl. 6, fig. 7. = Polyp. discoïde; côtes grosses et assez semblables aux cloisons; fossette peu marquée et située en face de la plus grande cloison; les deux autres cloisons primaires forment un T avec celle-là; les autres, au nombre de 6 à 7 dans chaque système, sont épaisses et subflexueuses; hauteur, 5 à 7 millim.; diamètre, 20 à 25. — *Dévonien* : Perry-County.

GENRE CCIII. — ANISOPHYLLUM.

Anisophyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, p. LXVI, 1850.

Polypier subpédicellé, trochoïde, à calice profond; 3 cloisons beaucoup plus développées que les autres et dont la médiane est opposée à une fossette septale qui se confond avec le centre du calice; planchers peu développés; point de columelle.

A. AGASSIZI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 1, fig. 2. = Polypier conique, peu allongé et courbé; épithèque peu développée; environ 32 cloisons inégales; hauteur, 20 millim.; diamètre du calice, 10 millim. — *Dévonien* : Perry-County.

GENRE CCIV. — LOPHOPHYLLUM.

Lophophyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. LXVI, 1850.

Polypier trochoïde et entouré d'une épithèque complète; columelle aplatie, cristiforme et se continuant par une de ses extrémités, avec une petite arête cloisonnaire qui occupe le fond de la fossette septale, et par l'autre avec la grande cloison opposée.

1. L. KONINCKI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 3, fig. 4. = Polypier petit, conique et arqué; fossette septale située dans le sens de la grande courbure et renfermant une saillie cloisonnaire très-fine et qui s'unit à une columelle forte et cristiforme; 32 cloisons bien développées alternant avec un nombre égal de petites; hauteur, 12 mill.; diamètre du calice, autant. — *Carboniférien* : Tournay.

2. L. DUMONTI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 3, fig. 3. = Polypier assez allongé et arqué; fossette longue et profonde; columelle petite:

mince et se continuant avec la cloison opposée à la fossette; 32 cloisons minces et autant de petites; hauteur, 20 millim.; diamètre du calice, 12. — *Carboniférien* : Tournay,

3. *L. BICOSTATUM*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, p. 350. — *Anthophyllum id.*, Goldfuss, *Petref.*, pl. 13, fig. 12. — *Ellipsocyathus bicostatus*, d'Orbigny, *Prod.* == Polypier presque droit et portant deux côtes saillantes et opposées; fossette petite; columelle comprimée; 64 cloisons alternativement inégales; hauteur, 60 millim.; diamètre du calice, 28. — *Dévonien* : Heisterlein.

GENRE CCV. — HALLIA.

Hallia, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, p. LXVII, 1850.

Polypier libre, subpédicellé, allongé ou turbiné; cloisons bien développées et atteignant le centre du calice dans une moitié duquel elles sont régulièrement radiées; les autres s'inclinent obliquement vers une grande cloison qui s'avance au milieu du calice et y simule une columelle lamellaire.

Ce genre offre, par la disposition des cloisons, quelque ressemblance avec l'organisation des organes internes des calices de notre genre *Pleurostyliina* des Zoanthaires Apores.

1. *H. INSIGNIS*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 6, fig. 3. == Polypier conique, allongé et arqué à la base; un sillon dorsal occupant le milieu de la grande courbure; 70 cloisons principales, minces et serrées; un nombre égal de petites; hauteur, 5 à 6 centim.; diamètre du calice, 25 millim. sur 30. — *Dévonien* : Columbus (Ohio).

Espèces douteuses.

2. *H. PENGILLYI*, Edwards et Haime, *l. c.*, p. 354. — *Brit. foss. corals.*, pl. 49, fig. 6. == Polypier trochoïde et à peu près droit; 54 cloisons principales un peu flexueuses au centre et alternant avec un nombre égal de petites; la cloison columellaire est peu marquée et on en trouve deux semblables opposées et renflées au centre; hauteur, 30 à 35 millim.; diamètre du calice, 22 sur 15. — *Dévonien* : Torquay.

Cette espèce ne nous semble pas devoir être une Hallie; elle paraît se rapprocher plutôt des *Cyathophyllum* ou des *Clisiophyllum*.

3. *H. ?? PPLICATA*. — *Cyathophyllum plicatum*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 15, fig. 12. — *Carboniférien* : Kentucky.

GENRE CCVI. — TROCHOPHYLLUM.

Trochophyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, p. LXVII, 1850.

Polypier trochoïde; calice peu profond; fossette septale peu prononcée et occupée par une cloison plus petite que les autres; celles-ci sont entières, larges et subégales; planchers peu développés.

1. *T. VERNEUILI*. — *T. Verneuilanum*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 5, fig. 6. == Polypier conique et arqué; côtes fortes; calice rond, large de 8 à 9 millim. et déprimé au centre; fossette peu marquée

et indiquée par la brièveté de la cloison qu'elle renferme; 19 autres cloisons épaisses et égales; hauteur, 20 millim. — *Carboniférien* : Louisville (Kentucky).

GENRE CCVII. — MENOPHYLLUM.

Menophyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, 1850.

Polypier libre et subpédicellé; épithèque complète; deux fossettes septales placées obliquement de chaque côté d'une fossette médiane plus développée entre les fossettes que sur le reste du calice.

M. TENUIMARGINATUM, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 3, fig. 1. = Polypier conique et arqué; fossette médiane large, les deux autres plus étroites et courbées; 32 grandes cloisons et 32 petites; les 16 qui se trouvent entre les fossettes sont inclinées vers la fossette médiane, hauteur, 20 millim.; diamètre du calice, 15. — *Carboniférien* : Tournay.

GENRE CCVIII. — HADROPHYLLUM.

Hadrophyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, p. LXVII, 1850.

Polypier court et subpédicellé; épithèque complète; 4 fossettes septales formant une croix dans le calice; l'une des fossettes est beaucoup plus prononcée que les autres.

1. H. ORBIGNYI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 6, fig. 4. = Polypier subconique et court; calice plus ou moins convexe; 28 cloisons épaisses, irrégulières et quelquefois soudées entre elles; il paraît y avoir des cloisons rudimentaires; hauteur, 10 millim.; diamètre, 15. — *Dévonien* : Charleston; Clarke-County (Ohio).

2. H.? PAUCIRADIATUM, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 6, fig. 5. = Polypier conique; 3 fossettes bien marquées, la 4^e rudimentaire ou nulle; 16 cloisons épaisses et le double de cloisons rudimentaires; hauteur, 10 millim.; diamètre du calice, 12. — *Dévonien* : Eifel.

Cette espèce doit très-probablement appartenir au genre *Menophyllum*.

XLIX^e Famille. — Cyathophylliens.

CYATHOPHYLLINÆ (*pars*), Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 167, 1851.

Appareil septal régulièrement radiaire ou divisé en quatre groupes par des fossettes septales superficielles plus ou moins marquées; une ou deux murailles; planchers irrégulièrement développés.

GENRE CCIX. — AULOPHYLLUM.

Aulophyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, 1850.

Polypier libre et pédicellé; épithèque complète; deux murailles, l'une épithéciale, l'autre colonnaire et presque centrale; columelle nulle; cloisons bien développées.

1. A. FUNGITES, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 413. —

Turbinolia id., Fleming, 1828. — Woodward, 1830. — *Cyathophyllum id.*, Geinitz, 1845-56. — *Clisiophyllum prolapsum*, McCoy, 1849. — *Autophyllum id.*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, 1850. == Polypier conique et arqué; épithèque forte; muraille intérieure formant un cercle qui est le tiers de celui de la muraille extérieure; 180 rayons septo-costaux, minces, droits et inégaux; hauteur, 8 centim.; diamètre du calice, 25 mill. — *Carboniférien*: Kildare; Derbyshire.

2. A. BOWERBANCKI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 38, fig. 1. == Polypier allongé, subcylindrique et arqué; cercle de la muraille interne étant moitié du cercle total du calice; environ 120 rayons septo-costaux inégaux; hauteur, 20 centim. ?; diam., 45 mill. — *Carboniférien*: Irlande.

GENRE CCX. — GONIOPHYLLUM.

Goniophyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, p. LXIX, 1850.

Polypier ayant la forme d'une pyramide quadrangulaire; cloisons fortes, nombreuses et s'étendant jusqu'au centre du calice; 4 fossettes septales correspondant aux angles du calice; planchers peu développés.

1. G. PYRAMIDALE, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 2, fig. 4. — *Turbinolia pyramidalis*, Hisinger, 1831, 1837. — *Calceola id.*, Girard, 1842. — *Petraia quadrata*, McCoy, 1846. == Polypier en pyramide quadrangulaire et arqué; 72 cloisons assez épaisses et subflexueuses au centre; hauteur, 2 à 3 centim.; diamètre, 25 sur 35 millim. — *Silurien*: Gothland; Ardaun; Kilbride; Cong.

2. G. FLETCHERI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 68, fig. 3. == Polypier presque droit; calice carré et profond; environ 50 cloisons assez épaisses; hauteur, 26 millim.; diamètre, 12 sur 16. — *Silurien*: Dudley.

GENRE CCXI. — OMPHYMA.

Omphyma, Rafinesque et Clifford, *Ann. des sc. phys. de Bruxell.*, 1820.

Polypier turbiné, subpédicellé et entouré d'une épithèque qui donne lieu à des prolongements radiciformes; 4 fossettes septales; planchers bien développés et lisses au centre; cloisons nombreuses et régulières.

1. O. TURBINATA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 69, fig. 1. — *Madrepora id.*, Fougé, 1749. — Linné, 1761-67. — Esper, *Pflanz. petref.*, pl. 2, fig. 1-2 (non les autres). — *Turbinolia id.*, Lamarck, 1816. — Lamouroux, 1821. — Deslongchamps, 1824. — DeFrance, 1828. — *Caryophyllia id.*, Brogniart, 1829. == Polypier droit et court; fossettes bien marquées; de 100 à 120 cloisons minces et peu élevées; hauteur, 4 à 5 centim.; diamètre, 7 ou 8. — *Silurien*: Gothland; Wenlock-Edge; Benlhal-Edge, etc.

Le *Cyathophyllum turbinatum*, de McCoy, est peut-être la même espèce.

2. O. SUBTURBINATA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 68, fig. 1. — *Madrepora simplex et turbinata (pars)*, Fougé, 1749. — Esper, *Pflanz. Petref.*, pl. 2, fig. 4, et pl. 3, fig. 5. — *Turbinolia verrucosa, turbinata*,

echinata, Hisinger, 1831-1837. — *Cyathophyllum turbinatum*, Lonsdale, 1839. — Eichwald, 1840. — *Cyathophyllum subturbinatum*, d'Orbigny, *Prod.* = Polypier allongé et droit ou un peu courbé à la base; fossettes septales petites; 80 cloisons fines et inégales; planchers bien développés et lisses au centre; hauteur, 10 centim.; diamètre du calice, 30 à 40 mill. — *Silurien*: Gothland; Wenlock-Edge; Walsal; Beuthal-Edge, etc.

MM. Edwards et Haime, *loc. cit.*, rapportent encore à cette espèce le *Ellipsocyathus grandis*, de d'Orbigny.

3. O. MURCHISONI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 67, fig. 3. — *Cystiphyllum siluriense*, Lonsdale in Murchison, 1839. = Polypier allongé et un peu arqué; vésicules interseptales saillantes au pourtour interne du calice; 60 cloisons minces, inégales et subflexueuses au centre; hauteur, 4 à 5 centim.; diamètre du calice, 25 millim. — *Silurien*: Wenlock (Angleterre).

4. O. GRANDIS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Cyathophyllum grande*, Barrande, *Mss.* = Polypier conique et court; fossettes septales peu prononcées; de 100 à 124 cloisons inégales et serrées; vésicules interseptales bien développées; hauteur, 6 à 7 centim.; diamètre du calice, 10 à 12. — *Silurien*: Beraun.

5. O. VERRUCOSA, Rafinesque et Clifford, *loc. cit.* = Polypier allongé et souvent arqué; prolongements radiciformes espacés et montant non loin du calice; hauteur, 6 à 7 centim.; diamètre du calice, 3 ou 4. — *Silurien*: Ile de Drummond (lac Huron).

GENRE CCXII. — CYATHOPHYLLUM.

Cyathophyllum (pars), Goldf., *Pet. Germ.*, 1826. — Dana, *Zooph. Strombodes*, Hall, 1843.

Petraia, Munster, 1839.

Cyathophyllum (pars), Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Palæosmilia, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, 1850.

Polypier simple; cloisons bien développées et s'étendant jusqu'au centre où elles se replient et forment une columelle tortile; planchers occupant le centre de la loge; les parties externes sont remplies d'un tissu vésiculaire; une seule muraille recouverte d'une épithèque complète.

Nous ne laissons dans le genre *Cyathophyllum* que les espèces véritablement simples, et nous avons formé, avec les espèces composées, dendroïdes ou astréiformes, que les auteurs, comme nous l'avons déjà dit, ont eu le tort de réunir aux premières, les genres *Disphyllum* et *Polyphyllum*.

1. C. CERATITES (pars), Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 17, fig. 1-2^f. — *C. turbinatum*, Goldfuss, pl. 16, fig. 8^c, 8^d, 8^f, 8^h, 8^s (non les autres). — Hall, 1830. — D'Orbigny, 1850. — *Cyathophyllum ceratites*, Deshayes, 1831. — Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. = Polypier simple, turbiné et un peu courbé; une ou deux fossettes septales rudimentaires; de 60 à 120 cloisons minces et inégales; hauteur, de 10 à 15 centim.; diamètre du calice, de 7 à 8. — *Dévonien*: Eifel; Devonshire.

2. C. RÆMERI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 8, fig. 3. — C. *Dianthus*, Goldfuss, pl. 16, fig. 1c. == Polypier allongé et courbé; 74 cloisons serrées, dentelées, un peu arquées et inégales; hauteur, 4 centim.; diamètre du calice, 25 millim. — *Dévonien* : Eifel; Bensberg.

3. C. VERMICULARE, Goldfuss, pl. 17, fig. 4. — Edwards et Haime, 1850 et 1851. — *Cystiphyllum id.*, d'Orbigny, 1850. == Polypier allongé et contourné; de 64 à 100 cloisons minces, dentelées et inégales; hauteur, 13 centim.; diamètre du calice, 3. — *Dévonien* : Eifel.

4. C. GOLDFUSSI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 2, fig. 3. == Polypier en cône, courbé; épithèque forte et à bourrelets; 88 cloisons droites, peu débordantes, assez épaisses et inégales; hauteur, 22 millim.; diamètre du calice, 30. — *Dévonien* : Eifel.

5. C. ? EXCENTRICUM, Goldfuss, pl. 16, fig. 4. == Polypier conique et courbé; calice ovalaire, à bord mince, peu profond et large de 25 mill; 62 cloisons alternativement inégales; une petite fossette du côté de la petite courbure; hauteur, 40 millim. — *Carboniférien* : Ratingen.

6. C. LOVENI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 66, fig. 2. — *Cyathophyllum flexuosum* (1), Hisinger, 1837 (non Goldfuss). — *Tryplasma articulata*, Lonsdale in Murchison, 1845. == Polypier très-long, cylindrique et un peu courbé à la base; bourrelets bien prononcés; 60 cloisons serrées, dentées et inégales; les côtes sont opposées aux petites cloisons et non aux grandes; hauteur, 5 à 6 centim.; diamètre du calice, 10 à 12 millim. — *Silurien* : Gothland; Dudley.

7. C. ANGUSTUM, Lonsdale, *Sil. syst.*, pl. 16, fig. 9, 1839. — D'Orbigny, *Prod.* — Edwards et Haime, *loc. cit.* == Polypier droit, allongé et comprimé; cloisons larges et espacées; des vésicules assez développées et inclinées dans les chambres; hauteur, 10 centim. ?; largeur, 4. — *Silurien* : Lickey; Attwoods-Schaft.

8. C. DECHENI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 365. — C. *ceratites (pars)*, Goldfuss, pl. 17, fig. 2^a, 2^b, 2^c, 2^e. — D'Orbigny, *Prod.* == Polypier allongé, pédicellé et courbé; bourrelets bien marqués; 60 cloisons un peu épaisses, dentées, arquées en dedans et inégales; hauteur, 3 à 4 centim.; diamètre du calice, 2 ou 3. — *Dévonien* : Eifel; Chimay; Bensberg; Ferques.

9. C. OBTORTUM, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 59, fig. 7. — *Strombodes vermicularis*, Lonsdale, 1840. — Phillips, 1841. == Polypier allongé et subcylindrique; de 64 à 68 cloisons assez minces, tordues au centre et inégales; traverses vésiculeuses bien développées; hauteur, 6 centim.; diamètre du calice, 25 mill. — *Dévonien* : Torquay; Plymouth; Newton, etc.

10. C. MICHELINI, de Verneuil et J. Haime, *Bull. de la Soc. géol.*, 1850. — C. *Dianthus*, Michelin, *Icon.*, pl. 47, fig. 4 (non Goldfuss). == Polypier court, fixé, turbiné et courbé à la base; bourrelets bien marqués; une petite fossette du côté de la grande courbure; 60 cloisons minces, peu inégales et contournées au centre; hauteur, 2 ou 3 centim.; diam., autant. — *Dévonien* : Ferques; Ferrones; Eifel.

11. C. BOUCHARDI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 10, fig. 2. = Polyp. allongé et peu courbé; épithèque forte; 56 à 60 cloisons

(1) Non *plexuosum*, qui est une faute typographique dans les *Pol. foss. des terr. pal.*, Edwards et Haime, p. 364, 1851.

bien développées, peu inégales et dentelées; hauteur, 5 à 10 centim.; diamètre du calice, 25 à 30 millim. — *Dévonien* : Ferques.

12. *C. HETEROPHYLLUM*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. X, fig. 1. = Polypier court, épais et courbé à la base; 96 cloisons larges, droites et un peu inégales, quelquefois on trouve entre elles des cloisons rudimentaires; hauteur, 4 centim.; diamètre du calice, 5. — *Dévonien* : Eifel.

13. *C. MARGINATUM*, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 16, fig. 3. = Polyp. turbiné et courbé; épithèque forte; 80 cloisons arquées en haut et peu inégales; hauteur, 3 ou 4 centim.; diamètre du calice, 36 mill. — *Dévonien* : Eifel; Bensberg.

14. *C. PSEUDO-CERATITES*, M'Coy, *Brit. pol. foss.*, pl. 1 B, fig. 20. — Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 66, fig. 3. — *Madrepora simplex*, Fongt, 1749. — *Cyathophyllum ceratites*, Eichwald, 1840. — *Turbinolopsis elongata*, Portlock, *Rep. on Geol. of Lond.* = Polypier en cône allongé et arqué à la base; 76 cloisons assez développées et inégales; hauteur, 4 à 6 millim.; diamètre du calice, 2. — *Silurien* : Gothland; Dudley; Wenlock.

15. *C. MURCHISONI*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 33, fig. 3. — *Palæosmilia Murchisoni*, Edwards et Haime. *Ann. des sc. nat.*, 1848. — *Strephodes multilamellatum*, M'Coy, 1849. = Polypier long, courbé et un peu comprimé; environ 150 cloisons minces, serrées et subégales; haut., 15 centim.; diamètre du calice, 3 sur 4. — *Carboniférien* : Frome; Clifton; Kendal, etc.

Les *Cystiphyllum excavatum* et *obliquum*, de Keyserling, paraissent très-voisins de cette espèce.

16. *C. WRIGHTI*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 34, fig. 6. = Polypier allongé, courbé seulement à la base et comprimé; 130 cloisons peu inégales et courbées au centre; hauteur, 7 centim.; diamètre du calice, 2 sur 5. — *Carboniférien* : Frome.

17. *C. MULTIPLEX*, Keyserling, *Reise in das Ptschora land*, pl. 2, fig. 1, 1846. = Polypier droit et conique, bourrelets bien marqués; vésicules petites et abondantes; planchers vésiculeux; hauteur, 5 centim.; diamètre du calice, 3. — *Carboniférien* : Yltsch.

18. *C. SHUMARDI*, de Verneuil, *Mss.* — Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 7, fig. 3. = Polyp. allongé, presque droit et montrant des bourrelets saillants et assez régulièrement espacés; 30 à 40 cloisons épaisses, égales, dentelées, flexueuses et minces au centre et alternant avec un nombre égal de petites; hauteur, 6 à 7 centim.; diamètre, 15 mill. — *Silurien* : Comté de Perry (Tennessee).

19. *C. DAMNONIENSE*, Phillips, *Pal. foss.*, pl. 4, fig. 11, 1841. — *Cystiphyllum id.*, Lonsdale, *Geol. Trans.*, 1840. — *Cyathophyllum id.*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 50, fig. 1. = Polypier subturbiné, allongé et droit; environ 100 cloisons serrées, minces, flexueuses au centre et inégales; diamètre, 8 cent.; hauteur...? — *Dévonien* : Torquay; Plimouth; Newton, etc.

20. *C. LESUEURI*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 371. = Polyp. en cône courbé, à base grêle; 70 grandes cloisons et 70 petites; les côtes sont larges et peu saillantes; hauteur, 6 à 7 centim.; diamètre du calice, 4. — *Dévonien* : Caledonia (New-York).

21. *C. RECTUM*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Strombodes rectus*, Hall, 1843. = Polypier allongé, droit et pédicellé; environ 50 grandes cloisons et autant de petites; côtes planes, subégales et correspondant aux espaces

intercloisonnaires; hauteur, 3 à 4 cent.; diamètre du calice, 15 ou 20 mill.
— *Dévonien* : Moscow; Seneca-Lake; York, etc.

22. *C. DISTORTUM*, d'Orbigny, *Prod.* — Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Strombodes distortus*, Hall, 1843. = Polypier allongé et un peu contourné; bourrelets saillants, coupants et inégaux; de 26 à 34 cloisons minces et espacées; hauteur, 3 à 4 centim.; diamètre, 1 ou 2. — *Dévonien* : Moscow; York.

23. *C. EXPANSUM*, d'Orbigny, *Prod.*, p. 159, 1850 (non Fischer). — *Turbinolia expansa*, M'Coy, 1844. — *Cyathophyllum Stutchburyi*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 373, 1851. = Polypier presque droit, aussi large que haut ou très-allongé; bourrelets bien marqués; de 120 à 140 cloisons bien développées, minces, serrées et inégales; fossette septale petite; hauteur, de 5 à 15 centim.; diamètre du calice, 4 à 5. — *Carboniférien* : Bristol; Lilleshall; Clifton; Bolland; Bowes; Harves; Durham; Orton, etc.

24. *C. CELTICUM*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Turbinolia celtica*, Lamouroux, 1821. — Deslongchamps, 1824. — Milne-Edwards, 1836. — Phillips, 1841. — *Petraia id.*, Lonsdale, 1840. = Cette espèce n'est connue que par des moules mal conservés; on compte de 36 à 48 cloisons inégales et flexueuses au centre. — *Dévonien* : Kerliver; Saint-Columb; Combes; Torquay, etc.

25. *C. HELIANTHOIDES*, Goldfuss, *Petref.*, pl. 20, fig. 2c, 2* (et peut-être 2a, 2b, 2d, mais non les autres). — Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 8, fig. 5. — *Brit. foss. corals*, pl. 51, fig. 1 (mauvais échantillon, non fig. 12). — *Discophyllum id.*, d'Orbigny, *Prod.*, = Polypier subturbiné, court et large; bord du calice renversé; 60 à 80 cloisons égales et contournées au centre; hauteur, 3 centim.; diamètre du calice, 6 ou 8. — *Dévonien* : Viré; Eifel; Rokeskill; Harrisville (Ohio), etc.

26. *C. HYPOCRATERIFORME*. — *C. hypocrateriforme (pars)*, Goldfuss, *l.c.*, pl. 17, fig. 1b (non les autres), pl. 16, fig. 8c, 8d et peut-être 8b (non les autres). = Polypier trochoïde plus ou moins élevé; cloisons droites, subégales, arquées en dedans et assez minces, on en compte environ 72; hauteur, 4 à 6 centim.; diamètre du calice, 6 centim. dans les grands exemplaires. — *Dévonien* : Eifel; Bensberg.

Les figures 5a, 5b, pl. 16, *Petref.*, Goldfuss, appartiennent peut-être à des jeunes de cette espèce.

27. *C. HAIMEI*. — *C. hypocrateriforme*, Goldfuss, *Petref.*, pl. 17, fig. 1a (non les autres). — Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 381. = Polypier cylindroturbiné; calice rond, assez profond au centre et large de 30 millim.; 40 cloisons assez épaisses, peu serrées, droites et subégales; hauteur, 5 centim. — *Dévonien* : Eifel.

Espèces douteuses.

28. *C.? PAUCIRADIATUM*, d'Orbigny, *Prod.* — *Silurien* : Indiana.

29. *C. SIMPLEX*, d'Orbigny, *loc. cit.* — *Strombodes id.*, Hall, *Geol. of New-York*, p. 209, fig. 6. — *Dévonien* : Moscow.

30. *C. BINUM*, Edwards et Haime, *Pol. fos. des terr. pal.*, 1850. — *Dévonien* : Folliwood; Nash-Scar; Botville, etc.

MM. Edwards et Haime rapportent à cette espèce les *Turbinolopsis bina*, *pauciradialis*, *elongata* et *rugosa*, de Phillips; le *Petraia bina*, de M'Coy, et les *Streptelasma bina* et *pluriradialis*, de A. d'Orbigny.

31. C.? BUCKLANDI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.* — *Petraia Gigas*, M'Coy, 1849. — *Dévonien* : New-Quay.

32. C.? VANUXEMI, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Dévonien* : Moscow.

33. C.? CORNICULUM, Keyserling, *Petschora*, pl. 2, fig. 4. — *Carboniférien* : Ylytsch.

34. C.? ZIGZAG, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Petraia id.*, M'Coy. — *Silurien* : Ardoun-Cong.

35. C.? INCRUSTATUM, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Turbinolia incrustata*, Kutorga. — De Sadierw à Elistfer.

36. C.? ACUMINATUM, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Turbinolia acuminata*, Kutorga. — Sadierw.

37. C. KUTORGAI. — *C. Kutorgæ*, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *C. plicatum*, Kutorga (non Goldfuss). — Sadierw.

Les fossiles suivants, qui sont très-mal connus, paraissent encore se rapporter au genre *Cyathophyllum*.

TURBINOLIA CONICA, ARIETINA, IBICINA, Fischer, *Oryct. de Moscow*, pl. 30, fig. 4-5-6.

CYATHOPHYLLUM? ARIETINUM, IBICINUM, Keyserling.

CYATHOPHYLLUM? LITUOIDES, Munster.

TRYPLASMA EQUALIS, Lonsdale.

DISCOPHYLLUM PELLATUM, Hall.

STREPHODES GRACILIS, M'Coy.

CYATHOPHYLLUM? GALEA, DISCUS, OBSOLETUM, EXPLANATUM, EIFLIENSE et PRIMÆVUM, Steininger, etc.

GENRE CCXIII. — CLISIOPHYLLUM.

Clisiophyllum (pars), Dana, *Expl. expe. zooph.*, 1848.

— Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1850.

Cyathophyllum (pars), de Koninck.

Polypier turbiné et pédicellé; cloisons larges et formant au centre un bourrelet au milieu duquel se trouve une columelle lamellaire qui paraît unie à une grande cloison; traverses abondantes; épithèque complète.

1. C. HISINGERI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 7, fig. 5. = Polypier en cône arqué à la base; 44 cloisons minces et fortement élevées au centre où elles forment un cône; hauteur, 6 centim.; diamètre du calice, 35 millim. — *Silurien* : Gotland.

2. C. FUNGITES. — *Turbinolia Fungites (pars)*, Fleming, *Brit. anim.*, 1828. — *Cyathophyllum id.*, de Koninck, 1842. — *Clisiophyllum turbinatum*, M'Coy, 1851. — Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 33, fig. 1-2. *C. Konincki*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 410. = Polyp. en cône courbé, plus ou moins allongé et évasé; 44 cloisons dont la moitié arrivent au centre, s'y relèvent et forment autour de la columelle une couronne qui simule des palis; hauteur, de 5 à 6 centim.; diamètre du calice, 20 à 35 millim. — *Carboniférien* : Visé; Oswestry; Frome; Castleton, etc.

Le *Turbinolia mitrata*, Portlock, semble appartenir à cette espèce.

3. C. CONISEPTUM, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 37, fig. 5. — *Cyathophyllum id.*, de Koninck, 1846. — *Cyathaxonia conisepta*, d'Or-

bigny, *Prod.* == Polypier très-allongé et cylindro-conique; épithèque forte et à bourrelets peu saillants: 60 à 70 cloisons inégales et droites d'abord, puis les principales se relèvent en suivant une direction flexueuse et constituent une fausse columelle, au sommet de laquelle on remarque une lame columellaire peu développée; longueur, de 7 à 20 centim.; diamètre du calice, 25 à 50 millim. — *Carboniférien*: Ticknell; Mold; Corven; Ylytsch.

4. C. BOWERBANKI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 37, fig. 4. — C. *bipartitum*, M'Coy, 1849. == Polypier conique et arqué: 70 cloisons inégales; 8 principales arrivent jusqu'à la columelle; les cloisons du 3^e cycle se courbent vers les primaires et s'y soudent; les autres cloisons sont très-petites (la figure 4^a, de MM. Edwards et Haime, *l. c.*, montre 108 cloisons dont la moitié sont rudimentaires; le texte ne porte que 70); hauteur, 5 centim.; diamètre du calice, 2, 5. — *Carboniférien*: Irlande.

5. C. DANAI. — C. *Danaanum*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 412. == Polypier en cône courbé et à épithèque plissée; fausse columelle grosse et saillante; environ 70 cloisons égales, serrées, dentelées et relevées au centre; hauteur, 30 millim; diamètre du calice, 15. — *Silurien*: Perry-County.

6. C. KEYSERLINGI, M'Coy, *Ann. and Mag.*, etc., 1849. — Edwards et Haime, *l. c.* == Polypier allongé et souvent contourné; 40 à 50 cloisons principales, épaisses, contournées et se relevant au centre; un nombre égal de petites; hauteur, 6 à 10 centim.; diamètre du calice, 3 ou 4. — *Carboniférien*: Visé; Oswestry, etc.

7. C. COSTATUM, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 412. — *Cyathaxonia costata*, M'Coy, 1849. == Polypier petit, conique et haut de 2 centim.; 26 cloisons assez épaisses; diamètre du calice, 10 millim. — *Carboniférien*: Derbyshire.

Espèce douteuse.

8. C. STRIATUM, Edwards et Haime, *l. c.* — *Turbinolia striata*, d'Orbigny, *Pal. de l'Am. du Sud.* — *Cyathaxonia striata*, *ibid.*, *Prod.* — *Carboniférien*: Yarbichambi.

GENRE CCXIV. — HELIOPHYLLUM.

Heliophyllum, Hall in Dana, *Zooph.*, 1846.

Strombodes (pars), Phillips, 1841. — Hall, 1843.

Polypier subturbiné; cloisons bien développées et réunies par des traverses arquées assez rapprochées qui sont elles-mêmes soutenues par des traverses verticales; planchers centraux et vésiculeux.

H. HALLI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 7, fig. 6. — *Strombodes helianthoides*, Phillips, 1841. == Polypier conique et arqué à la base; bourrelets épithécaux peu marqués; environ 80 cloisons minces, serrées, dentelées et inégales; plancher central libre, bombé et irrégulier; hauteur, 5 à 6 centim.; diamètre du calice, 4. — *Dévonien*: Moscow; chutes de l'Ohio; Pavilion-York; Torquay; Plymouth, etc.

GENRE CCXV. — CAMPOPHYLLUM.

Campophyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, 1850.

Polypier libre et subpédicellé; épithèque forte; calice profond; cloisons bien développées mais n'atteignant pas le centre du calice; planchers larges et lisses au centre; chambres remplies de vésicules.

1. *C. FLEXUOSUM*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 8, fig. 4. — *Cyathophyllum id.*, Goldfuss, pl. 17, fig. 3. — Bronn, 1835-37. — Michelin, *Icon.*, pl. 47, fig. 6. — Geinitz, 1845-46. = Polypier long, contourné et à bourrelets d'accroissement bien marqués; 50 cloisons étroites, minces et inégales; longueur, 8 à 10 centim.; diamètre du calice, 16 millim. — *Dévonien*: Eifel; Aix-la-Chapelle; Mons (Belgique); Babba-combe; Ferques.

2. *C. DUCHATELI*, Edwards et Haime, *l. c.* = Cette espèce ne paraît différer de la précédente que par ses planchers plus serrés et sa longueur moindre; hauteur, 60 millim.; diamètre du calice, 25. — *Dévonien*: Mons (Belgique).

3. *C. MURCHISONI*, Edwards et Haime, *l. c.* = Polypier allongé et non contourné; bourrelets peu prononcés; 66 cloisons principales, minces et inégales; un nombre égal de rudimentaires; hauteur, 7 à 8 centim.; diamètre du calice, 3, 5. — *Carboniférien*: Angleterre.

C. ? PRISCUM, Edwards et Haime, *l. c.* — *Cyathophyllum id.*, Munster, *Best. Petref.*, pl. 9, fig. 11, 1840. — *Dévonien*: Schubelhammer.

GENRE CCXVI. — STREPTELASMA.

Streptelasma, Hall, *Pol. of New-York*. t. I, pl. 17, 1847.

Polypier libre et subpédicellé; épithèque nulle; muraille costulée depuis la base; cloisons bien développées et tordues au centre; planchers étendus et irréguliers.

1. *S. CORNICULUM*, Hall, *l. c.* — Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 7, fig. 4. — *S. crassa*, *multilamellosa*, *parvula*, Hall, *l. c.*, pl. 25, fig. 1, 2, 3, 4. = Polypier conique et un peu courbé; 120 ou 130 cloisons étroites, inégales et courbées au centre; hauteur, 10 centim.; diamètre du calice, 35 millim. — *Silurien*: Oxford; Cincinnati; Trenton; Madison; Middleville; Turin, etc.

Espèces douteuses.

2. *S. EXPANSA*, Hall, *l. c.*, pl. 4, fig. 6. — *Silurien*: Ile Drummond.

3. *S. PROFUNDA*, Hall, *loc. cit.*, pl. 12, fig. 4. — *Silurien*: Watertown; Chazy; Ile la Motte; Manheim.

GENRE CCXVII. — PTYCHOPHYLLUM.

Ptychophyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, 1850.

Strombodes, Lonsdale, *Sil. syst.*, 1839.

Cyataxonia (pars), d'Orbigny, *Prod.*, 1850.

Polypier constitué par une série de planchers infundibuliformes superposés et dont la surface supérieure est couverte de cloisons tordues au centre de manière à y constituer une fausse columelle.

1. *P. PATELLATUM*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 67, fig. 4. — *Fungites patellatus*, Schlotheim, *Petrefact.*, 1820. — Kruger, 1823. —

Hisinger, 1837. — *Strombodes plicatus*, Lonsdale, 1839. — M'Coy, 1846. — *Cyataxonia plicata*, d'Orbigny, *Prod.* = Polypier peu élevé et presque droit; épithèque plissée; environ 100 cloisons peu inégales, minces et tordues au centre; hauteur, 3 à 4 centim.; diamètre du calice, 6 à 10. — *Silurien*: Gothland; Malvern; Dingle, etc.

2. P. STOKESI, Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1850. = Polypier court et feuilleté; 100 cloisons tordues au centre et y formant une fausse columelle grosse; hauteur, 4 centim.; diamètre du calice, 6. — *Silurien*: Ile Drummond (lac Huron).

3. P. EXPANSUM, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 8, fig. 2. = Polypier court et large; fausse columelle large et peu saillante; de 70 à 80 cloisons subégales, minces et tordues au centre; hauteur, 3 centim.; diamètre du calice, 4 à 5. — *Dévonien*: Nehou.

GENRE CCXVIII. — CHONOPHYLLUM.

Chonophyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, 1850.

Polypier constitué par des planchers infundibuliformes dont la surface supérieure est couverte de cloisons droites et qui ne sont pas tordues au centre; point de fausse columelle; point de muraille.

1. C. PERFOLIATUM, Goldfuss, *Musée de Bonn.* — Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 68, fig. 2. = Polypier conique, peu élevé et un peu arqué; de 60 à 74 cloisons minces, droites et égales; hauteur, 6 à 8 cent.; diamètre, 5 à 6. — *Silurien*: Gothland.

2. C. ELONGATUM, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. Pal.*, pl. 8, fig. 1. = Polypier subcylindrique et allongé, peu ou point arqué; bourrelets saillants et séparés par des solutions de continuité; 74 à 76 cloisons droites, minces et subégales; hauteur, 7 à 8 centim.; diamètre du calice, 2 ou 3. — *Dévonien*: Nehou (Manche).

Disastrées Rugueux.

L^e Famille. — Eridophylliens.

CYATHOPHYLLINÆ (*pars*), Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 167, 1851.

Appareil septal régulièrement radiaire; une seule muraille; planchers plus ou moins développés.

GENRE CCXIX. — PACHYPHYLLUM.

Pachyphyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, 1850.

Polypier se multipliant par gemmation latérale; polypierites unis par les côtes et l'exothèque, mais libres dans une certaine étendue; cloisons larges; planchers bien développés; épithèque forte.

1. P. BOUCHARDI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 7, fig. 7. = Polypier submassif; polypierites libres en haut mais réunis à la partie inférieure par le développement des côtes et de l'exothèque; les côtes sont fortes, cristiformes, égales et espacées; environ 30 cloisons subégales,

assez épaisses en dehors, minces et subflexueuses en dedans; un nombre égal de cloisons rudimentaires; largeur des calices, 15 à 20 millim. — *Dévonien* : Ferques.

2. P.? DEVONIENSE, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 52, fig. 5. = MM. Edwards et Haime ont désigné sous ce nom un fossile qui n'est connu que par une coupe polie; les calices sont espacés, larges de 10 à 11 millim. et réunis par des côtes subconfluentes; 40 cloisons alternativement inégales. — *Dévonien* : Torquay.

GENRE CCXX. — DISPHYLLUM.

Cyathophyllum (pars), Edwards et Haime, *Pol. foss. des ter. pal.*, 1851.

Polypier fasciculé; polypiérites généralement libres dans une grande étendue et n'étant qu'accidentellement soudés par les murailles; cloisons bien développées, assez régulièrement radiaires et flexueuses au centre où souvent elles donnent lieu à une fausse columelle tortile; épithèque bien développée.

1. D. ARTICULATUM. — *Cyathophyllum articulatum* et *vermiculare*, Hisinger, 1831-32-37. — *C. Dianthus* et *cæspitosum*, Lonsdale, 1839 (non Goldfuss). — *C. cæspitosum*, Eichwald, 1840. — d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *C. articulatum*, Edwards et Haime, 1850. = Polypier assez serré et subcylindrique; bourrelets épithécaux bien marqués; bourgeonnement calicinal; 60 cloisons égales et serrées; diamètre du calice, 15 millim.; planchers irréguliers; vésicules interseptales bien développées. — *Silurien* : Gothland; mont Klinteberg; Wenlock; Dudley.

Le *Cladocora sulcata*, de Lonsdale, et le *Cyathophyllum cæspitosum*, de M'Coy, paraissent n'être que des variétés de l'espèce précédente.

2. D. STEININGERI. — *Cyathophyllum Dianthus (pars)*, Goldfuss, pl. 16, fig. 1^a, b, c, d (non les autres). — *C. Steiningeri*, Edwards et Haime, *l. c.*, p. 378. = Polypier allongé et subcylindrique; bourrelets bien marqués et saillants; bourgeonnement latéral; 50 cloisons minces et courbées au centre et autant de rudimentaires; hauteur, 7 à 8 centim.; diamètre des calices, 15 millim. — *Dévonien* : Eifel; Bensberg.

3. D. TRUNCATUM. — *Madrepora truncata*, Linné, 1758-61-67. — *Strombodes truncatus*, Schweiger, 1820. — Eichwald, 1829. — *Strombastrea truncata*, de Blainville, 1830. — *Cyathophyllum Dianthus*, Lonsdale, 1839 (non Goldfuss). — *C. truncatum*, Bronn, 1848. — Edwards et Haime, 1851. — *C. subdianthus*, d'Orbigny, 1850. — *C. truncatum*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 66, fig. 5. = Polypier de forme turbinée dont la base est formée par un individu unique sur le calice duquel se développent les bourgeons qui donnent plus tard naissance à des polypiérites fasciculés; calices assez serrés mais libres et un peu déformés; de 50 à 60 cloisons inégales, épaisses et serrées; hauteur des polypiérites, 3 à 4 centimètres; diamètre des calices, 10 à 22 millim. — *Silurien* : Gothland; Wenlock; Benthall-Edge; Dago, etc.

4. D. DIANTHUS. — *Cyathophyllum id.*, Goldfuss, pl. 15, fig. 13. — Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.* = Polypier fasciculé; gemmation latérale ou caliculaire; calices inégaux, profonds et larges de 5 centim.; environ 60 cloisons dentelées et peu inégales. — *Dévonien* : Eifel.

5. D. CÆSPITOSUM. — *Cyathophyllum cæspitosum*, Goldfuss, pl. 19,

fig. 2. — Lonsdale, 1840. — Phillips, 1841. — Edwards et Haime, 1850. — *Cladocora Goldfussi*, Geinitz, 1845-46. — *Diphyphyllum cæspitosum*, d'Orbigny, 1850. = Polypier élevé et fasciculé; gemmation calicinale; calices circulaires et larges de 10 millim.; 40 à 50 cloisons minces et inégales. — *Dévonien* : Eifel; Bensberg; Torquay; Newton; Plymouth.

6. D. PARACIDA. — *Cyathophyllum id.*, M'Coy, *Ann. and Mag.*, 1849. = Polypier fasciculé; gemmation calicinale; calices circulaires et larges de 6 à 10 mill.; 32 cloisons subégales et minces. — *Carboniférien* : Mold; Derbyshire.

7. D. MICHELINI. — *Cyathophyllum cæspitosum*, Michelin, pl. 47, fig. 5. (non Goldfuss). — *C. Marmini (pars)*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.* = Polypier dendroïde; polypières subcylindriques et ondulés; calices ronds, un peu évasés et larges de 1 centim.; côtes bien marquées; une trentaine de cloisons subégales et serrées; gemmation latérale. — *Dévonien* : Ferques.

8. D. FLEXUOSUM. — *Madrepora flexuosa*, Linné, 1767. — *Caryophyllia id.*, Lonsdale, 1839 (non Lamarck). — *Diphyphyllum flexuosum*, d'Orbigny, 1850. — *Cyathophyllum id.*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.* = Polypier dendroïde; gemmation calicinale; polypières allongés et larges de 3 à 4 millim.; environ 20 côtes recouvertes par une épithèque mince. — *Silurien* : Gothland; Wenlock-Shale, etc.

9. D. SPEUDOVERMICULARE. — *Cyathophyllum id.*, M'Coy, *loc. cit.*, 1849. = Polypier dendroïde; polypières allongés, sinueux et annelés; de 24 à 27 cloisons peu développées. — *Carboniférien* : Kendal; Roscommon.

10. D. RADICANS. — *Cyathophyllum id.*, Goldfuss, pl. 16, fig. 2. — d'Orbigny, 1850. — Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 13, fig. 3. = Polyp. fasciculé; polypières cylindro-tubinés et souvent unis entre eux par des expansions épithécales; 24 à 26 cloisons minces et subégales; diamètre des calices, 10 millim.; gemmation latérale ou submarginale. — *Dévonien* : Eifel; Bensberg; Ferques.

11. D. ÆQUISEPTATUM. — *Cyathophyllum id.*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 52, fig. 2. = Polypier fasciculé; polypières écartés et ronds, larges de 10 à 12 millim.; épithèque mince; gemmation latérale; environ 36 cloisons étroites et égales. — *Dévonien* : Ilfracombe.

12. D.? LACAZII. — *Cyathophyllum id.*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 389. = Polypières longs, subcylindriques; bourrelets faibles; épithèque mince; gemmation latérale; calices ronds et larges de 10 millim.; environ 40 cloisons très-minces. — *Carboniférien* : Boulogne.

13. D. DIANTHOIDES. — *Cyathophyllum id.*, M'Coy, 1849. — Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, p. 182. = Polypier cespiteux; gemmation caliculaire; 96 à 100 cloisons minces, crénelées, droites et inégales; diam. des calices, 15 millim., ils sont généralement arrondis. — *Carboniférien* : Arnside; Kendal.

Espèces douteuses.

14. D. PROFUNDUM. — *Cyathophyllum id.*, Owen. — *Silurien* : Russie.

15. D. FASCICULUS. — *Cyathophyllum id.*, Kutorga. — Camby.

16. D. CALICULARIS. — *Cyathophyllum Loersi*, Edwards et Haime. — *Caryophyllia calicularis*, Steiniger, *Mém. Soc. géol.* — *Dévonien* : Eifel.

17. D. DUPLICATUM. — *Caryophyllia duplicata*, de Koninck, *Anim. foss.*, etc. — *Cyathophyllum Burtini*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 391. — *Carboniférien* : Visé.

GENRE CCXXI. — ERIDOPHYLLUM.

Eridophyllum, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier fasciculé; polypières allongés et recouverts d'une forte épithèque qui engendre des prolongements radiciformes épais, courts et qui s'étendent sur le polypière voisin; cloisons étroites et n'atteignant pas le centre du calice qui est occupé par des planchers bien développés.

1. E. VERNEUILI. — *E. Verneuilanum*, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 8, fig. 6. == Polypières irréguliers, écartés et réunis par des crampons épithéaux épars; 22 cloisons minces, écartées et s'étendant seulement dans la moitié du rayon du calice; diamètre des polypières, 7 à 10 mill. — *Dévonien*: Columbus (Ohio).

2. E. STRICTUM, Edwards et Haime, *l. c.*, pl. 8, fig. 7. == Polypières allongés et serrés; gemmation calicinale; crampons épithéaux peu prononcés; diamètre des individus, 8 à 10 millim. — *Dévonien*: Columbus (Ohio).

3. E.? RUGOSUM, Edwards et Haime, *l. c.*, pl. 10, fig. 4. == Polypières grêles, allongés et subcylindriques; crampons épithéaux bien développés, rapprochés et dirigés tous dans le même sens; 20 cloisons inégales; diamètre des polypières, 3 à 4 millim. — *Silurien*: Gothland.

GENRE CCXXII. — DIPHYPHYLLUM.

Diphyphyllum, Lonsdale in Murchison, *Russ. and Ural*, 1845.

Lithostrotion (pars), Edwards et Haime, 1850-51.

Diphyphyllum, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Acroclyathus*, *ibid.*

Siphonodendron, M'Coy, 1849.

Polypier fasciculé et arborescent; gemmation latérale; cloisons bien développées; chambres remplies par des vésicules; centre du calice occupé par des planchers bien formés et traversés par une columelle styloforme.

Nous avons cru devoir conserver le nom générique de *Diphyphyllum*, bien que ce nom ait été donné à un fossile sans columelle; mais nous pensons avec MM. Edwards et Haime que le polypier type était un *Lithostrotion* fasciculé dont la columelle avait été détruite.

1. D. EDWARDSI. — *Lithostrotion mamillare (pars)*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 13, fig. 1^a, 1^b (non fig. 1). == Polypier fasciculé; polypières cylindriques, serrés; gemmation latérale; calices ronds et larges de 10 à 15 millim.; columelle saillante et aplatie; on compte dans les grands calices 48 cloisons droites et inégales. — *Carbonifère*: Amérique septentrionale.

2. D. JUNCUM. — *Caryophyllia Juncea*, Fleming, 1828. — Woodward, 1830. — *Lithodendron Junceum*, Keferstein, 1834. — *Lithodendron sexdecimale et coarctatum*, M'Coy, 1844. — Portlock, 1843. — *Cladocora sexdecimalis*, Geinitz, 1845-46. — *Diphyphyllum sexdecimale*, d'Orbigny, 1850. — *Lithostrotion Junceum*, Edwards et Haime, 1850 et 51. == Polypières

allongés, cylindriques et courbés au point d'origine; 16 à 18 cloisons alternant avec un nombre égal de petites; columelle comprimée; diam. des polypières, 2 à 3 mill. — *Carboniférien* : Visé; Mold; Wellington; Kettewell; Veynal, etc.

3. D. FASCICULATUM, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Caryophyllia fasciculata*, Fleming, 1828. — De Koninck, 1842. — *Lithodendron fasciculatum*, Phillips, 1846. — Lonsdale, 1845. — *Cladocora fasciculata*, Geinitz, 1845-46. — *Lithostrotion Martini*, Edwards et Haime, 1850-1851. = Polypières allongés et cylindriques, légèrement flexueux; columelle comprimée et mince; 26 grandes cloisons et 26 petites; diamètre des calices, 9 millim. — *Carboniférien* : Rugley; Corwen; Oswestry; Bristol; Bakewell; Winstert, etc.

4. D. IRREGULARE, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Lithodendron id.*, Phillips, 1836. — Portlock, 1843. — *Cladocora irregularis*, Morris, 1843. — *Lithostrotion irregularis*, Edwards et Haime, 1850-51. = Polypier élevé; polypières très-longes et flexueux; columelle peu comprimée; 24 cloisons principales, minces et écartées et 24 très-petites; diam. des calices, 5 millim. — *Carboniférien* : Castleton; Corwen; Oswestry; Bristol; Ash-Fell; Desertcreat; Northumberland, etc.

5. D. AFFINE. — *Caryophyllia affinis*, Fleming, 1828. — De Blainville, 1830. — Woodward, 1830. — *Lithodendron sociale* et *Longiconicum*, Portlock, 1843. — Phillips, 1836. — M'Coy, 1844. — *Diphyphyllum id.*, *id.*, d'Orbigny, 1850. — *Lithostrotion affine*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 39, fig. 2. = Polypier en touffes serrées; polypières courbés à la naissance et cylindro-turbinés; columelle forte et comprimée; 32 grandes cloisons et 32 petites; diam. des calices, 10 ou 12 mill. — *Carboniférien* : Castleton; Monntarm; Settle; Winstert, etc.

6. D. PHILLIPSI. — *Lithodendron fasciculatum*, Keyserling, 1846. — *Lithostrotion Phillipsi*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 39, fig. 3. = Polypières cylindriques, flexueux et coalescents, ils se soudent de distance en distance avec leurs voisins et ont de la tendance à se mettre en série; 30 cloisons un peu inégales et bien développées et 30 rudimentaires; diamètre des calices, 7 ou 8 millim. — *Carboniférien* : Yltsch.

7. D. PAUCIRADIALE, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Lithodendron id.*, et *siphonodendron id.*, M'Coy, 1844-1849. — *Lithostrotion id.*, Edwards et Haime, 1851. = Polypières flexueux et lisses; 10 ou 12 grandes cloisons et autant de petites; diamètre des calices, 3 millim. — *Carboniférien* : Irlande; Magheramore; Tobercurry.

8. D. ANTIQUUM. — *Lithodendron caespitosum*, Goldfuss, pl. 13, fig. 4. — Hall, 1830. — *Caryophyllia caespitosa*, de Blainville, 1830. — Steiniger, 1831. — *Cladocora id.*, Geinitz, 1845-46. — *Cladocora antiqua*, Bronn, 1848. — *Lithostrotion antiquum*, Edwards et Haime, 1851. = Polypières allongés et écartés; épithèque mince et plissée; 32 ou 34 grandes cloisons minces, peu inégales et autant de petites; diamètre des calices, 5 ou 6 millim. — *Dévonien* : Bensberg.

9. D. HARMODITES. — *Lithodendron irregulare*, Castelnau, 1843. — *Lithostrotion harmodites*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 15, fig. 1. = Polypières cylindriques et flexueux, ils sont unis par des tubes de connexion comme les *Syringopora*; 18 grandes cloisons et 18 petites; diamètre des polypières, 5 millim. — *Carboniférien* : Amérique septentrionale.

10. D. STOKESI. — *Lithostrotion id.*, Edwards et Haime, *l. c.*, pl. 20,

fig. 2. == Polypières assez espacés et parallèles; bourrelets épithécaux assez forts et formant des expansions murales qui souvent unissent les individus; 36 cloisons peu inégales et peu développées; diamètre des polypières, 5 à 6 millim. — *Carboniférien* : Lac Wennipeg.

11. D. DECIPENS. — *Nemaphyllum id.*, M'Coy, 1849. — *Lithostrotion id.*, Edwards et Haime, 1851. == Cette espèce, qui ne diffère du *D. irregulare* que par ses cloisons plus droites et ses vésicules plus nombreuses, n'est probablement qu'une variété de celle-ci. — *Carboniférien* : Derbyshire.

12. D. CONCAMERATUM, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Lithodendron id.*, Lonsdale, 1845. — Keyserling, 1846. — *Lithostrotion id.*, Edwards et Haime, 1851. == Cette espèce ne diffère du *D. Harmodites* que par ses murailles lisses et le diamètre des polypières qui n'est que de 3 millim. — *Carboniférien* : Russie.

13. D.? STELLARE. — *Lithostrotion stellare*, Bronn, 1848. — *Columnaria stellaris*, Steininger, *Mém. Soc. géol.* == Columelle saillante et forte; polypières larges de 3 millim. — *Dévonien* : Eifel.

14. D.? CONCIUNUM, Lonsdale, 1845. — *D. latiseptatum*, M'Coy, *Ann. and Mag.*, — *Lithostrotion concinnum*, Edwards et Haime, 1851 == Polypières allongés, larges de 10 millim.; bourrelets peu marqués; 32 cloisons grandes et minces; 32 petites. — *Carboniférien* : Russie.

15. D.? ANNULATUM. — *Lithodendron id.*, Lonsdale, 1845. == Cette espèce, qui diffère du *D. affine* par des bourrelets épithécaux plus prononcés, paraît n'en être qu'une variété. — *Carboniférien* : Ilinsk; rivière Issetz.

L^e Famille. — Lonsdaliens.

AXOPHYLLINÆ (*pars*), Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier présentant deux murailles distinctes; appareil cloisonnaire bien développé et touchant à une columelle essentielle.

GENRE CCXXIII. — LONSDALEIA.

Lonsdalia (pars), Edwards et Haime, *l. c.*, p. 74, 1851.

Lithostrotion, Lonsdale, 1845. — *Lonsdaleia*, M'Coy, 1849.

Polypier fasciculé et se multipliant par gemmation latérale; deux murailles distinctes; cloisons lamellaires bien développées; columelle grosse, cylindrique et formée de tigelles tordues sur elles-mêmes.

1. L. BRONNI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 11, fig. 1. == Polypier fasciculé; polypières très-rapprochés mais rarement soudés par les murailles qui restent presque toujours arrondies; 30 cloisons entières et subégales et un nombre égal de rudimentaires; columelle forte et arrondie; diamètre des polypières, 25 millim. — *Carboniférien* : Russie.

2. L. RUGOSA, Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1851. — *Lonsdaleia id.*, M'Coy, 1849. == Polypières subcylindriques; bourrelets bien marqués; columelle large; environ 40 cloisons minces et subégales. — *Carboniférien* : Mold; Corwen.

3. *L. CRASSICONUS*, Edwards et Haime, *l. c.* — *Lonsdaleia id.*, M'Coy. 1849. — *Erismatolithus Madreporites duplicatus*, Martin, 1809. — *Caryophyllia duplicata*, Woodward, 1830. — *Cladocora id.*, Geinitz, 1845-1846. = Polypières presque lisses; columelle peu large; de 24 à 26 cloisons subégales et minces. — *Carboniférien* : Angleterre, Arnside; Kendal; Backwell, etc.

Syrtrastrées rugueux.

Pas de représentants.

Polyastrées rugueux.

LII^e Famille — Stauriens.

STAUROIDÆ (pars), Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 161, 1851.

Polypier ayant des cloisons bien développées et en lames parfaites, s'étendant dans toute la hauteur de la loge et divisées en quatre systèmes bien visibles; murailles bien développées et imperforées.

GENRE CCXXIV. — STAURIA.

Stauria, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier massif et astréiforme; quelques polypières ont de la tendance à s'isoler; muraille couverte d'une épithèque complète; cloisons larges et bien développées; les primaires s'unissent entre elles par leur bord interne qui est épaissi et forment une croix dans le centre du calice; pas de columelle; traverses vésiculaires externes, traverses horizontales centrales et tenant lieu de planchers.

S. ASTREIFORMIS, Edwards et Haime, *loc. cit.*, pl. 1, fig. 1. — *Columaria sulcata*, Lonsdale, 1845. — *Madrepora aggregata*, etc., Fougé, 1749. = Polypières soudés par les murailles et le plus ordinairement polygonaux, ils sont larges de 6 à 7 millim.; 36 à 40 cloisons très-inégales. — *Silurien* : Gothland; Dago; Reval.

GENRE CCXXV. — HOLOCYSTIS.

Holocystis, Lonsdale, *Quarterly Jour. of the Geol.*, 1849.

Polypier massif, astréiforme; polypières unis par des côtes bien développées; point d'épithèque; cloisons fortes mais ne s'étendant pas jusqu'au centre du calice, où on remarque une petite columelle; planchers assez développés et traversés par les cloisons.

1. *H. ELEGANS*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. X, fig. 5, 1850. — *Cyathophora id.*, Lonsdale, *l. c.* — *Astrea id.*, Fitton, 1847. = Polypier convexe; gemmation extracalculaire; calices unis par des côtes épaisses et souvent subpolygonaux par suite du resserrement des individus; trois

cycles complets; les cloisons primaires plus développées que les autres; diamètre des calices, 2 1/2 mill. — *Néocomien* : Ile de Wight; Redhill-Cutting.

2. H. DUPINI. — *Tetracænia Dupiniana*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier convexe et élevé; calices assez serrés et unis par des côtes qui ne sont pas confluentes, arrondis et assez profonds; cloisons peu épaisses, débordantes et entières; 3 cycles complets; diamètre des calices, 3 à 3 1/2 millim. — *Aptien* : Les Croutes (Aube); Seignelay (Yonne).

LIII^e Famille. — Acervulariens.

CYATHOPHYLLINÆ (*pars*), Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Appareil septal régulièrement radiaire; planchers plus ou moins développés; point de columelle; une ou deux murailles par polypierite.

GENRE CCXXVI. — SMITHIA.

Smithia, Edwards et Haime, *l. c.*, p. 421, 1851.

Polypier astréiforme; gemmation submarginale; polypierites unis par des côtes subconfluentes; une seule muraille; point de columelle.

1. S. HENNAHI, Edwards et Haime, *l. c.* — *Astrea id. (pars)*, Lonsdale, 1840. — Phillips, 1841. — *Cyathophyllum id.*, Bronn, 1848. — *Lithostrotion id.*, *Actinocyathus id.*, *Phillipsastrea id. (pars)*, d'Orbigny, 1840. = Calices circulaires; de 24 à 26 rayons costaux par individu; 12 à 13 cloisons assez épaisses en dehors, minces en dedans et présentant au centre des lobes paliformes; diamètre des calices, 3 ou 4 millim. — *Dévonien* : Torquay; Plymouth; Newton.

2. S. PENGILIYI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 55, fig. 1. — *Astræa Hennahii (pars)*, Lonsdale, 1840. = Muraille peu marquée; calices limités par un renflement des rayons septocostaux, on en compte 40 qui sont inégaux en épaisseur et en longueur et dont la moitié pénètrent seuls dans les calices, ceux-ci sont larges de 5 à 6 mill. — *Dévonien* : Torquay; Plymouth.

3. S. BOLONIENSIS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. = Calices circulaires larges de 2 à 2 1/2 mill.; de 24 à 26 rayons septocostaux un peu inégaux. — *Dévonien* : Ferques, près Boulogne.

4. S. BOWERBANCKI, Edwards et Haime, *l. c.* — *Brit. foss. corals*, pl. 55, fig. 2. = Calices bien marqués, écartés, larges de 1 3/4 à 2 mill.; 18 ou 20 rayons septo-costaux, confluentes, minces et flexueux; les cloisons sont inégales et ne présentent pas de lobes paliformes; diamètre des calices, 2 millim. — *Dévonien* : Torquay.

GENRE CCXXVII. — POLYPHYLLUM.

Cyathophyllum (pars), Goldfuss, 1826. — Edwards et Haime, 1851 et 1851.

Favastrea (pars), de Blainville, 1830.

Polypier massif et astréiforme; polypierites intimement soudés

par les murailles qui sont polygonales; cloisons bien développées, s'étendant jusqu'au centre des calices où elles sont courbées et souvent relevées de manière à former une fausse columelle tortile; planchers bien développés au centre des calices, dont les parties latérales sont remplies par des vésicules abondantes.

1. P. HELIANTHOIDES. — *Cyathophyllum id.*, Goldfuss, pl. 20, fig. 2ⁱ, 2^k, 1826. — Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 375 (non pl. 8, fig. 5, qui est le véritable *Cyathophyllum helianthoides*). — *Favastrea helianthoidea*, de Blainville, 1830. = Polypier astréiforme; calices polygonaux et larges de 25 à 30 millim.; de 60 à 80 cloisons dans les grands calices; elles sont bien développées, tortueuses au centre où elles présentent de petits lobes paliformes. — Dévonien : Eifel; Luxembourg, etc.

2. P. REGIUM. — *Cyathophyllum id.*, Phillips, 1836. — Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 32, fig. 1, 2, 3, 1851. — *Favastrea regia*, d'Orbigny; 1850. = Polypier astréiforme; calices polygonaux, irréguliers et larges de 3 à 6 centim.; 120 à 130 cloisons minces, droites, inégales, tortueuses et relevées au centre; fausse columelle oblongue et portant un petit sillon au sommet. — Carboniférien : Bristol; Corwin; Bakewell; Lofthouse.

Les *Cyathophyllum crenulare*, Phillips; — *Astrea crenularis*, M'Coy; — *Actinocyathus id.*, d'Orbigny, — et le *Peripodium heliops*, Keyserling, paraissent se rapporter à l'espèce précédente.

3. P. HYPOCRATERIFORME. — *Cyathophyllum id.*, Goldfuss, pl. 17, fig. 1^c (non les autres; non pl. 16, fig. 5-8, qui doivent se rapporter au genre *Disphyllum*). — *Favastrea hypocrateriformis*, de Blainville, 1830. — D'Orbigny, 1850. = Polypier astréiforme; calices polygonaux et larges de 2 à 3 centim.; environ 50 cloisons minces, peu serrées, dentelées et un peu flexueuses au centre où elles n'arrivent pas entièrement. — Dévonien : Eifel; Bensberg.

4. P. HEXAGONUM. — *Cyathophyllum id.*, Goldfuss, pl. 20, fig. 1. — Morren, 1832. — Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 50, fig. 4. — *Astrea ananas*, Römer, 1843. — *Favastrea hexagona*, Blainville, 1830. = Polypier astréiforme; calices polygonaux, larges de 12 à 15 millim.; 45 cloisons inégales, minces, denticulées et présentant des lobes paliformes bien développés. — Dévonien : Bensberg; Montignies; Chimay; Grund; Torquay, etc.

5. P. QUADRIGEMINUM. — *Cyathophyllum id.*, Goldfuss, pl. 19, fig. 1 et 5^f, et pl. 18, fig. 6. — *Columnaria sulcata id.*, pl. 24, fig. 9. — *Montastrea adamantina* et *coniformis*, *Favastrea quadrigemina* et *alveolata*, *Favosites quadrigeminata*, de Blainville, 1830. — *Monticularia hexagona* et *Astrea alveolata*, Steininger, 1831. — *Lithostrotion quadrigeminum*, *Favastrea quadrigemina* et *sulcata*, d'Orbigny, 1850. = Polypier astréiforme; calices polygonaux larges de 7 à 10 millim.; 46 cloisons minces, égales, serrées et courbées au centre. — Dévonien : Visé (Sarthe); Eifel; Bensberg, etc.

6. P. BOLONIENSE. — *Montastrea Boloniensis*, Blainville, 1830. — *Cyathophyllum hexagonum*, Michelin, pl. 47, fig. 2. — *Cyathophyllum Boloniense*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 52, fig. 1. — *Lithostrotion arachnoides*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polyp. subcirculaire, peu élevé et astréiforme; calices polygonaux larges de 18 à 20 millim.; de 42 à 46 cloisons subégales, minces, serrées, dentelées et droites. — Dévonien : Ferques.

7. P. PROFUNDUM. — *Cyathophyllum id.*, Michelin, pl. 48, fig. 1 (non

Geinitz). — *Lithostrotion profundum*, d'Orbigny, 1850. — *Cyathophyllum Marmini*, Edwards et Haime, 1851. = Polypier astréiforme; calices polygonaux, larges de 10 à 12 millim. et profonds de 6 à 7; 40 cloisons subégales, minces, dentées et lobées au centre. — *Dévonien* : Ferques; Torquay; Teignmouth.

8. P. RUGOSUM. — *Astrea rugosa*, Hall, 1843. — Dale-Owen, 1844. — Clapp, 1847. — *Cyathophyllum Englypticum* id. — *Cyathophyllum Dianthus*, Hall, 1843. — *Favastrea rugosa*, d'Orbigny, 1850. — *Cyathophyllum rugosum*, Edwards et Haime, 1851. = Polypier astréiforme; calices inégaux, polygonaux et larges de 15 millim.; environ 80 cloisons alternativement grandes et petites, les premières sont minces et courbées au centre. — *Dévonien* : Ohio; Madison; Sandusky; Jowa; Louisville; Leroy; Caledonia, etc.

9. P. SEDWICKI. — *Cyathophyllum* id., Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. = Polypier astréiforme; calices inégaux, polygonaux, larges de 15 mill.; de 32 à 42 cloisons peu inégales, assez minces, lobées et courbées au centre. — *Dévonien* : Torquay; Babbacombe-Beach.

10. P. DAVIDSONI. — *Cyathophyllum* id., Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier convexe; calices polygonaux, profonds et larges de 6 millim.; 28 cloisons alternativement inégales, assez épaisses et larges. — *Dévonien* : Ferques.

GENRE CCXXVIII. — SPONGOPHYLLUM.

Spongophyllum, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 425, 1851.

Polypier massif et astréiforme; polypiérites soudés par les murailles; point de murailles internes; point de columelle; cloisons nombreuses et peu distinctes au milieu d'un tissu vésiculaire qui remplit les chambres; planchers horizontaux au centre de la loge.

S. SEDWICKI, Edwards et Haime, *l. c.* = Calices polygonaux, inégaux et larges de 6 à 7 millim.; de 14 à 16 cloisons principales, larges, minces et flexueuses; autant de rudimentaires; tissu vésiculaire bien développé. — *Dévonien* : Torquay.

GENRE CCXXIX. — ENDOPHYLLUM.

Endophyllum, Edwards et Haime, *l. c.*, p. 393, 1851.

Polypier astréiforme; polypiérites unis par des murailles extérieures peu développées et un tissu vésiculaire irrégulier; murailles internes bien distinctes; cloisons se prolongeant très-peu en dehors des murailles internes; planchers petits.

1. E. BOWERBANCKI, Edwards et Haime, *l. c.*, p. 394. = Deux murailles bien marquées, distantes de 15 à 20 millim.; de 30 à 32 cloisons principales, minces, flexueuses et autant de petites; diamètre des cercles muraux, 20 millim. — *Dévonien* : Torquay.

2. E. ABDITUM, Edwards et Haime, *l. c.* = Polypiérites soudés par les murailles et larges de 40 à 50 millim.; diamètre des cercles muraux internes, 30 millim.; de 34 à 40 cloisons principales, minces, courbées au centre et autant de petites. — *Dévonien* : Teignmouth-Beach.

GENRE CCXXX. — ACERVULARIA.

Acervularia, Schweigger, *Handb. der naturg.*, p. 418, 1820.

— Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Lithostrotion (pars), d'Orbigny, *Prod.*, 1850.

Polypier massif et astréiforme ; gemmation caliculaire ; deux murailles bien distinctes et espacées ; cloisons bien développées surtout entre les deux murailles ; planchers peu marqués ; columelle nulle.

1. A. LUXURIANS, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Madrepora composita* (pars). Fougé, 1749. — *Madrepora ananas*, Linné, 1767. — Parkinson, 1808. — *Floscularia luxurians*, Eichwald, 1829. — *Astrea ananas*, Hisinger, 1837. — Lonsdale, 1839. — *Astrea truncata*, Hisinger, 1837. — *Cyathophyllum dianthus*, Lonsdale, 1839. — *Lithostrotion Lonsdalei*, d'Orbigny, 1850. = Polypier convexe et élevé ; polypières prismatiques rarement libres par leurs murailles ; diamètre des murailles externes, 15 millim. ; des murailles internes, 5 ou 6 ; environ 54 cloisons dans les grands calices et 30 à 35 dans les petits ; elles sont subégales et assez épaisses. — Dévonien : Dudley ; Wenlock, etc.

Le *Porites astréiformis*, de D. Owen, paraît appartenir à cette espèce ; il provient de Dowa ou du Wisconsin.

2. A. TROSCHLI, Edwards et Haime, *l. c.* — *Cyathophyllum ananas*, Goldfuss, pl. 19, fig. 4^b (non 4^a). = Calices larges de 5 millim. ; polypières prismatiques et larges de 12 millim. ; de 28 à 34 cloisons minces, droites et inégales. — Dévonien : Namur ; Eifel ; Grund.

3. A. CORONATA, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier connu seulement par une coupe polie ; calices larges de 10 à 15 millim. ; diamètre des polypières, 25 à 30 mill. ; 28 cloisons subégales et lobées au centre. — Dévonien : Barton, près Torquay.

4. A. GOLDFUSSI, de Verneuil et Haime, *Bull. de la Soc. géol. de France*, 1850. — *Cyathophyllum ananas*, Goldfuss, pl. 19, fig. 4^a (non 4^b). — Hall, 1830. — Morren, 1832. — Milne-Edwards, 1836. — *Astrea basaltiformis*, Roemer, 1843. — *Lithostrotion ananas* (pars), d'Orbigny, 1850. = Grande diagonale des polypières, 7 ou 8 millim. ; diamètre de la muraille interne, 2 1/2 millim. ; 24 à 26 cloisons minces, droites et inégales. — Dévonien : Namur ; Grund ; Torquay ; Sabaro, etc.

5. A. INTERCELLULOSA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Astrea id.*, Phillips, 1841. — *Favastrea id.*, d'Orbigny, 1850. = Murailles polygonales en zig-zag ; polypières larges de 15 millim. ; diamètre de la muraille interne, 10 ; de 40 à 44 cloisons peu développées, minces et lobées au centre. — Dévonien : Torquay.

6. A. PENTAGONA, Michelin, *Icon.*, pl. 49, fig. 1. — Edwards et Haime, 1851. — *Cyathophyllum pentagonum*, Goldfuss, pl. 19, fig. 3. — Morren, 1832. — Milne-Edwards, 1836. — *Favastrea pentagona*, Blainville, 1830. — *Astrea id.*, Lonsdale, 1840. — Phillips, 1841. — *Acervularia ananas*, Michelin, pl. 47, fig. 1. — *Lithostrotion pentagonum*, d'Orbigny, 1850. = Polypières polygonaux, larges de 5 millim. ; diamètre de la muraille interne, 1 1/2 millim. ; 18 à 24 cloisons minces et droites. — Dévonien : Eifel ; Limbourg ; Chaude-Fontaine ; Torquay ; Oghwell : Namur ; Fergues, etc.

7. A. DAVIDSONI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 9, fig. 4, 1851. = Polypier subplane; polypières subégaux et larges de 10 à 12 millim.; diamètre de la muraille interne, 4 ou 5; 40 cloisons minces et droites, 20 seulement dépassent la muraille interne. — Dévonien : Ferques; Jeffersonville; Ohio-Falls.

8. A. LIMITATA, Edwards et Haime, *l. c.* — *Astrea pentagona (pars)*, Lonsdale, *Geol. trans.*, pl. 58, fig. 1^a (non 1), 1840. = Polypières larges de 7 à 8 mill.; diamètre de la muraille interne, 2 1/2; 26 cloisons minces, inégales et lobées au centre. Cette espèce n'est connue que par une coupe polie. — Dévonien : Torquay.

9. A. BATTERSBYI, Edwards et Haime, *l. c.* = Polypières larges de 15 à 20 millim.; diamètre des murailles internes, de 5 à 6; 36 cloisons inégales, minces et lobées au centre; espèce connue par une coupe polie. — Dévonien : Torquay; Newton.

10. A. HENNAHII. — *Astrea Hennahii*, Römer, *Versl. des Arz.*, pl. 2, fig. 13, 1843 (non Lonsdale.) — *Astrea parallela*, *ibid.*, pl. 3, fig. 1. ? — *Phyllipsastrea parallela*, d'Orbigny, 1850. — *Acercularia Römeri*, de Verneuil et Haime, 1850. — Edwards et Haime, 1851. = Polypier subplane; diamètre des polypières, 6 à 8 millim.; des murailles internes, 2; 26 à 28 cloisons minces, courbées et flexueuses. — Dévonien : Grund, dans le Hartz; Puerto de las Volcas; Torquay.

11. A. ANANAS, Edwards et Haime, *l. c.* — *Madrepora id.*, Linné, 1767. — *Madrepora composita*, Fougé, 1749. — *Acercularia ballica*, Schweigger, 1820. — Eichwald, 1829. — *Favastrea ballica*, Blainville, 1830. — Cette espèce, voisine du *A. luxurians*, n'en diffère que par ses cloisons plus nombreuses et le diamètre de ses polypières qui est de 12 millim. — Silurien : Gothland.

GENRE CCXXXI. — STROMBODES.

Strombodes (pars), Schweigger, *Hand. des nat.*, 1820.

— Goldfuss, *Petref. Germ.*, 1826.

Strombastrea, de Blainville, *Dict.*, 1830.

Acercularia, Lonsdale, *Sil. syst.*, 1839.

Lamellopora, Dale-Owen, *Rep. ont the geol.*, etc., 1844.

Arachnophyllum, Dana, *Expl. exped.*, 1846.

Cylicopora, Steining, *Verst. der Ueberg.*, 1849.

Actinocyathus et *Strombodes*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850.

Strombodes, Edwards et Haime, 1851.

Polypier massif; gemmation submarginale ou caliculaire; polypières constitués par des planchers infundibuliformes, unis par des trabicules vésiculaires; calices polygonaux; rayons septo-costaux nombreux; les deux murailles sont peu développées; point de columelle.

1. S. TYPUS, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 71, fig. 1. — *Arachnophyllum id.*, M'Coy, 1850-1851. — *Strombodes Labechei*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1850. = Polypier turbiné, à surface convexe; épithèque mince et plissée; environ 100 cloisons dont 30 arrivent seules au centre; diamètre des polypières, 20 mill.; des calices, 7 à 8. — Silurien : Wenlock-Edge.

2. S. MURCHISONI, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Acervularia baltica* (pars). Lonsdale in Murchison, *loc. cit.*, 1830. — *Actinocyathus balticus*, d'Orbigny, 1850. == Polypier subturbiné, à surface convexe; épithèque plissée; environ 100 cloisons dont la plupart n'arrivent pas au centre; 20 seulement semblent lobées au centre; diamètre des polypières, 25 millim.; des calices. 8. — Silurien : Dudley; Wenloch; Egool; comté de Mayo.

3. S. PHILLIPSI, Edwards et Haime, *l. c.* — *Acervularia baltica*, Phillips, 1841. — *Actinocyathus Phillipsii*, d'Orbigny, 1850, == Polypier convexe; 80 cloisons dont la moitié arrivent au centre et sont lobées; diamètre des polypières, 20 à 25 mill.; des calices, 10 à 13. — Silurien : Wenlock.

A. d'Orbigny place à tort cette espèce dans l'étage Dévonien.

4. S.? PENTAGONUS, Goldfuss, *Petref. Germ.*, pl. 21, fig. 2, 1826. — Hall, 1830. — Bronn, 1835-37. — D'Orbigny, 1850. — Edwards et Haime, 1851. — *Strombastrea quinquangulosa*, Blainville, 1830. — *Cyathophyllum strombodes*, Bronn, 1848. == Polypier turbiné; 50 cloisons très-inégales; polypières réguliers, larges de 14 à 15 millim. — Silurien : Quebec (lac Huron); Beargrass.

5. S.? STRIATUS, Edwards et Haime, *l. c.* — *Favastrea striata*, d'Orbigny, 1850. == Cloisons nombreuses et minces (50 à 60); diamètre des polypières, 28 à 30 mill. — Silurien : Ohio; lac Huron.

6. S.? STELLARIS, Schweigger, 1820. — Eichwald, 1829. — Edwards et Haime, 1851. — *Madrepora stellaris*, Linné, 1767. — *Madreporites id.*, Wahlenberg, 1821. — *Strombastrea id.*, de Blainville, 1830. — *Cyathophyllum stellare*, Bronn, 1848. == 50 à 69 rayons septo-costaux; diamètre des polypières, 15 millim.; calices plus larges que ceux du *S. pentagonus*. — Silurien : Gothlandie.

7. S. DIFFLUENS, Edwards et Haime, *l. c.* — *Acervularia baltica*, Lonsdale, *l. c.*, pl. 16, fig. 8 et 8a, 1839. == Polyp. gibbeux; épithèque forte; calices saillants en bourrelets et larges de 6 à 7 millim.; 35 à 40 rayons septo-costaux confluent, géniculés et minces au centre. — Silurien : Much-Wenlock.

8. S.? INFUNDIBULARIUS, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Lamellopora infundibularia*, Dale-Owen, 1844. — *Astrea mamillaris*, *ibid.* — Silurien : Iowa; Wisconsin.

9. S.? FASCICULATUS. — *Cylicopora fasciculata*, Steininger, 1849. — Dévonien : Gerolstein.

LIV^e Famille. — Stylaxiniens.

AXOPHYLLINÆ (pars) et CYATHOPHYLLINÆ (pars), Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Appareil septal assez régulièrement radiaire; planchers plus ou moins bien développés; columelle styloforme, lamellaire ou fasciculaire.

GENRE CCXXXII. — LITHOSTROTION.

Lithostrotion (pars), Fleming, *Brit. anim.*, 1828.

— Edwards et Haime, *l. c.*, 1851.

Stylastrea, Lonsdale, Verneuil et Keyserling, 1845.

Columnaria, Dana, 1846.

Lasmocyathus, d'Orbigny, 1850.

Polypier massif, astréiforme; polypières soudées par les murailles qui sont polygonales et couvertes d'une épithèque complète; chambres remplies par un tissu vésiculaire; planchers bien développés au centre de la loge et traversés par une columelle styloïde.

Contrairement à ce que pensaient MM. Edwards et Haime, nous sommes assurés que leur genre *Lithostrotion* renfermait des espèces fasciculées et des espèces massives que nous avons dû séparer, les premières, sous le nom générique de *diphyphyllum*, et, les secondes, sous celui de *lithostrotion*. Il arrive, il est vrai, que les espèces fasciculées par suite du resserrement des individus, présentent quelquefois l'aspect astréiforme; mais cette réunion des polypières est toujours fortuite dans ce cas et diffère essentiellement de l'organisation des espèces massives.

1. L. MAMILLARE. — *L. mamillare* (pars), Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 13, fig. 1 (non fig. 1^a, 1^b). — *Astrea mamillaris*, Castelnau, 1843. = Calices polygonaux, à bords simples et minces et larges de 20 mill.; 44 à 46 cloisons principales dans les grands calices; elles sont minces, droites et subégales et alternent avec un nombre égal de petites. — Carboniférien : Monts Flecher; Cabell-Cey; Etat d'Indiana, etc.

2. L. BASALTIFORME, Edwards et Haime, *l. c.* — *Astrea basaltiformis*, Conybeare et Phillips, 1822. — *Astrea arachnoides*, DeFrance, 1826. — *Lithostrotion striatum*, Fleming, 1828. — Woodward, 1830. — M'Coy, 1844. — *Columnaria striata*, Blainville, 1830. — Edwards, 1836. — *Cyathophyllum basaltiforme*, Phillips, 1836. — *Astrea hexagona et basaltiformis*, Portlock, 1843. — *Lithostrotion microphyllum*, Keiserling, 1846. — *Nemaphyllum minus*, M'Coy, 1849. = Calices polygonaux, larges de 12 à 15 millim.; de 40 à 50 cloisons serrées, minces, flexueuses et inégales; columelle petite et comprimée. — Carboniférien : Bristol; Kedal; Tyrone, etc.

3. L. ENSIFER, Edwards et Haime, *l. c.*, 1851. = Polypier subplane; calices polygonaux, larges de 8 à 10 millim.; 30 cloisons minces et droites et autant de rudimentaires; columelle forte et comprimée; calices peu délimités. — Carboniférien : Clifton.

4. L. ARANEA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 39, fig. 1. — *Astrea hexagona* (pars), Portlock, 1843. — *Astrea aranea*, M'Coy, 1844. — *Nemaphyllum id.*, M'Coy, 1849. — *Lasmocyathus id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypier massif; calices polygonaux, irréguliers et larges de 10 à 13 mill.; de 22 à 24 cloisons principales, minces et un peu flexueuses; autant de petites. — Carboniférien : Armagh; Tyrone; Clonoe; Tobercurry; Magheramore.

5. L. PORTLOCKI, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 42, fig. 1 — *Astrea irregularis*, Portlock, 1843 (non DeFrance). — M'Coy, 1844. — *Astrea Portlocki*, Bronn, *Index pal.*, 1848. — *Nemaphyllum clisioides*, M'Coy, 1849. = Polypières inégaux, polygonaux et larges de 5 à 7 millim.; de 22 à 36 cloisons inégales, peu serrées, minces et flexueuses; columelle grosse, comprimée et saillante. — Carboniférien : Bristol; Wellington; Corwin, etc.

6. L. COYL. — *L. Coganum*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 42, fig. 2. = Calices polygonaux, larges de 3 à 4 millim.; 20 ou 24 cloisons assez épaisses et inégales; murailles bien marquées; columelle saillante. — Carboniférien : Oswestry ; Marlock.

7. L.? SEPTOSUM, Edwards et Haime, *l. c.* — *Nemaphyllum id.*, M'Coy, 1849. = Calices polygonaux, larges de 5 lignes (anglaises); columelle mince, large de 3 lignes; 48 cloisons minces dont 24 arrivent seules au centre (d'après M'Coy). — Carboniférien : Armagh ; Sullyard.

Cette espèce est peut-être un *stylaxis*; les espèces suivantes sont encore moins connues.

7. L.? LÆVE, Bronn, 1848. — Edwards et Haime, 1850. — *Columnaria lævis*, Goldfuss, pl. 24, fig. 8. = Calices larges de 10 à 12 millim.; 16 ou 18 cloisons minces, droites et autant de rudimentaires. — Naples ? (Goldfuss). — Carboniférien ? (Edwards et Haime).

8. L. INCONFERTUM, Edwards et Haime, *loc. cit.*, 1850. — D'Orbigny, *Prod.*, 1850. — *Stylastrea inconforta*, Lonsdale, 1845. — Carboniférien : Monts Oural.

9. L.? DERBYENSE, Edwards et Haime, 1850. — *Stylastrea irregularis*, M'Coy, 1849. — Carboniférien : Derbyshire.

GENRE CCXXXIII. — PHILLIPSASTRÆA.

Phillipsastrea (pars), d'Orbigny, *Note sur les pol. foss.*, 1849.

— Edwards et Haime, *Pol. foss.*, 1850.

Sarcinula, M'Coy, *Ann. and Mag.*, 1849.

Tubipora (pars), Woodward, *Syn. table of Brit.*, p. 5, 1830.

Erismatholithus, Martin, 1809.

Polypier astréiforme, se multipliant par gemmation submarginale; polypières unis par des rayons septo-costaux confluent; murailles épithécales rudimentaires; murailles internes cylindriques et assez développées; planchers peu marqués et traversés par une columelle styliforme.

1. P. VERNEUILI, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 10, fig. 5. = Polypier subplane; rayons septo-costaux tout à fait confluent; calices indiqués par un bourrelet circulaire et larges de 5 à 6 millim.; 28 à 32 cloisons fortes, saillantes et granulees. — Dévonien : Wisconsin.

2. P. RADIATA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 37, fig. 2. — *Tubipora id.*, Woodward, 1830. — *Erismatholithus tubiporites (radiatus)*, Martin, 1809. — *Astrea Hennokii (pars)*, Phillips, 1841. — *Sarcinula placenta* et *Phillipsi*, M'Coy, 1849. — *Phillipsastrea Hennahii*, d'Orbigny, 1850. = Polypier subplane; calices espacés, à bords peu saillants, creux et larges de 2 à 3 mill.; 24 ou 30 rayons septo-costaux, minces, inégaux et très-confluent. — Carboniférien : Corwen; Derbyshire.

3. P. TUBEROSA, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Sarcinula id.*, M'Coy, *Ann. and Mag.*, 1849. = Polypier à surface plane; calices en forme de mamelons larges de 4 millim.; 32 rayons septo-costaux, minces et flexueux en dehors. — Carboniférien : Derbyshire.

GENRE CCXXXIV. — SYRINGOPHYLLUM.

Syringophyllum, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, 1850.

Sarcinula, Dana, *Expl. Exp. Zooph.*, 1846 (non Lamarck).

Polypier astréiforme se multipliant par gemmation latérale; polypières unies par des côtes très-développées et par une exothèque abondante; calices ronds et saillants; cloisons bien développées et débordantes; columelle styliforme; planchers petits.

Ce genre, voisin du *Phillipsastrea*, se rapproche encore davantage des Stylines, dont il ne diffère que par ses planchers.

1. S. ORGANUM, Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Madrepora id.*, Linné, 1767. — *Sarcinula organon*, Schweigger, 1820. — Eichwald, 1829. — *Sarcinula organum*, Goldfuss, 1826. — Hall, 1830. — Blainville, 1830. — Morren, 1832. — Hisinger, 1837. — Eichwald, 1840. — *Astreopora id.*, d'Orbigny, 1850. = Polypier convexe; calices saillants, espacés et larges de 3 millim.; 24 à 26 cloisons débordantes, assez épaisses et inégales. — Silurien : Dudley; Gothland; Wilna; Reval; Coniston, etc.

2. S.? CANTABRICUM, Edwards et Haime, *l. c.* — *Phillipsastrea cantabrica*, de Verneuil et Haime, *Bull. de la Soc. géol.*, 1850. = Polypier subplane; calices assez saillants et larges de 3 à 4 millim.; côtes flexueuses, minces et égales; 15 à 16 grandes cloisons débordantes et autant de petites. — Dévonien : Pont de Vaclas (Léon); Teignmouth (Angleterre).

3. S.? TORREANUM, Edwards et Haime, *l. c.* — *Phillipsastrea torreana*, de Verneuil et Haime; *l. c.* = Polypier subplane; calices saillants, distants et larges de 2 1/2 millim.; 10 ou 12 grandes cloisons et autant de petites; 20 à 22 côtes fines et écartées. — Dévonien : Sabero.

GENRE CCXXXV. — STYLIDOPHYLLUM.

Polypier astréiforme; gemmation submarginale; deux murailles bien distinctes et renfermant entre elles un tissu vésiculaire abondant; cloisons lamellaires bien développées; columelle fasciculaire formée de tigelles tordues sur elles-mêmes. Ce genre ne se distingue des *Lonsdalia* que par la soudure intime des polypières.

1. S. FLORIFORME. — *Erismatolithus madreporites (floriformis)*, Martin, 1809. — *Astrea florida*, DeFrance, 1826. — *Lithostrotion floriforme*, Fleming, 1828. — Woodward, 1830. — *Columnaria floriformis*, Blainville, 1830. — *Cyathophyllum floriforme*, Phillips, 1836. — *Astrea emarciata, pentagona et mamillaris*, Fischer, 1837. — *Cyathophyllum expansum*, Fischer, id. — *Lithostrotion mamillare et astroides*, Lonsdale, 1845. — *Cyathophyllum astrea*, Bronn, 1848. — *Lithostrotion mamillare*, d'Orbigny, 1850. — *Lithostrotion floriforme*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Lonsdalia floriformis*, id., *ibid.*, *Brit. foss. corals*, pl. 43, fig. 1. = Polypières prismatiques et larges de 15 à 20 mill.; murailles fortes et saillantes; 24 grandes cloisons et autant de petites; columelle forte, saillante et comprimée au sommet; diamètre de la muraille interne, 7 ou 8 mill. — Carboniférien : Bristol; Mold; Oswestry; Whitehaven, etc.

2. S. PAPILLATUM. — *Cyathophyllum id.*, Fischer, 1837. — *Columnaria Troostii*, Castelnau, 1843. — *Lithostrotion floriforme et emarcium*, Lonsdale, 1845. — *Lithostrotion floriforme*, Keyserling, 1846. — d'Orbigny, 1850. — *Strombodes emarcium*, McCoy, 1849. — *Lonsdalia papillata*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 11, fig. 2, 1851. = Polypières polygonaux, souvent quadrangulaires, larges de 15 mill.; 22 ou 24 grandes cloisons et autant de petites; columelle peu saillante; diamètre

de la muraille interne, 7 ou 8 millim. — *Carboniférien* : Petschora; Tver; Valdaï; Derbyshire; Miatchkova.

GENRE CCXXXVI. — CHONAXIS.

Chonaxis, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Polypier massif; polypiérites unis au moyen d'un tissu vésiculaire qui remplit aussi les chambres; murailles internes bien marquées; cloisons lamellaires et étroites; planchers bien développés, lisses et bombés au centre et traversés par une columelle aplatie; les polypiérites périphériques ont de la tendance à s'isoler.

C. VERNEULI, Edwards et Haime, *l. c.*, pl. 11, fig. 3. = Polypiérites plus ou moins serrés et restant presque toujours cylindriques; aire extérieure remplie de vésicules fines et régulières; 44 cloisons minces et étroites; planchers bombés; columelle sublamellaire; diamètre des polypiérites, 25 millim.; de la muraille interne, 12. — *Carboniférien* : Tver (Russie).

GENRE CCXXXVII. — STYLAXIS.

Stylaxis, M'Coy, *Ann. and Magas. of nat. hist.*, p. 119, 1849.

Nemaphyllum, id., *ibid.*

Nemaphyllum, *Stylaxis*, *Petalaxis* et *Lithostrotion* (pars), Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Brit. foss. corals*, p. LXXI et 204, 1852.

Polypier astréiforme; polypiérites entièrement soudés par les murailles extérieures; chambres remplies par des vésicules dans lesquelles les rayons septo-costaux ne se prolongent pas; cloisons lamellaires, minces et bien développées; columelle essentielle et lamellaire; planchers peu développés et horizontaux.

1. S. COYI. — *S. M'Coyana*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, pl. 12, fig. 5, 1851. = Polypiérites intimement unis, prismatiques et larges de 6 millim. : muraille interne ronde et large de 4 millim.; de 16 à 18 grandes cloisons subégales, droites et larges et autant de petites. — *Carboniférien* : Colonna (Russie).

2. S. PORTLOCKI. Edwards et Haime, *loc. cit.* — *Petalaxis*, id., *ibid.*, *Brit. foss. corals*, pl. 38, fig. 4, 1852. = Cette espèce, qui n'est connue que par un polypiérite détaché d'une masse, diffère de l'espèce précédente par ses grandes cloisons plus minces et ses petites plus étroites; il est possible que ce ne soit qu'une variété du *S. Coyi*. — *Carboniférien* : Galles.

3. S. MAJOR, M'Coy, *l. c.*, 1849. — *Lithostrotion id.*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, 1852. = Calices larges de 6 lignes (anglaises) et polygonaux; 63 cloisons minces; columelle large; vésicules petites et abondantes. — *Carboniférien* : Derbyshire.

4. S. ARACHNOIDEA, Edwards et Haime, *Pol. foss.*, 1851. — *Nemaphyllum arachnoideum*, M'Coy, *l. c.* — *Lithostrotion id.*, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, 1852. = Calices polygonaux, larges de 6 à 9 lignes (anglaises); de 50 à 55 cloisons minces et inégales; columelle très-mince; planchers peu développés. — *Carboniférien* : Derbyshire.

5. S. FLEMINGI, M'Coy, *l. c.* — *Stylaxis* et *Lithostroton* *id.*, Edwards et Haime, *l. c.*, 1851, 1852. = Calices hexagonaux et larges de 3 lignes (anglaises); 43 cloisons minces et inégales; columelle très-aplatie. — *Carboniférien*: Derbyshire.

SOUS-ORDRE VI. — ZOANTHAIRES TUBULÉS.

Polypier essentiellement composé par une muraille compacte, bien développée et non poreuse; point de cloisons; point de planchers; point de columelle; on remarque seulement des stries costales le long de la paroi interne de la muraille.

Monastrées tubulés.

LV^e Famille. — Pyrgiens.

AULOPORIDÆ (*pars*), Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 150, 1851.

Polypier simple.

GENRE CCXXXVIII. — PYRGIA.

Pyrgia, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 310, 1851.

Polypier ayant la forme d'un cornet, libre et pédicellé; épithèque forte; calice profond; stries cloisonnaires peu marquées.

1. P. MICHELINI, Edwards et Haime, *l. c.*, pl. 17, fig. 8. = Polypier ayant la forme d'une pipe; pédicelle allongé et droit; environ 20 stries costales; diamètre du calice, 4 à 5 millim. — *Carboniférien*: Tournay.

2. P. LABECHEI, Edwards et Haime, *loc. cit.* = Polypier turbiné et courbé; épithèque forte et plissée; 30 ou 40 stries cloisonnaires; diamètre du calice, 5 millim. — *Carboniférien*: Frome.

Disastrées tubulés.

LVI^e Famille. — Auloporiens.

AULOPORIDÆ (*pars*), Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 150, 1851.

Polypier composé.

GENRE CCXXXIX. — AULOPORA.

Aulopora, Goldfuss, *Petref. Germ.*, p. 32, 1826.

Stomatopora, Bronn, *Leth. Geogn.*, p. 54, 1835.

Polypier rampant; gemmation latérale; polypiérites en forme de cornets et communiquant entre eux; épithèque forte et plissée.

1. *A. REPENS*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 312, 1851. — *Milleporites id.*, Knorr et Walch, 1775. — *Tubiporites serpens*, Schlotheim, 1820. — *Autopora id.*, Goldfuss, 1829. — Hall, 1830. — Morren, 1832. — Keyserling, 1846. — D'Orbigny, 1850. — De Verneuil et Haime, 1850. — *Alecto id.*, Steininger, 1831. — *Stomatopora id.*, Bronn, 1835. = Polypier rampant; gemmation subcalicinaie; longueur des polypiérites, 3 à 5 mill.; diamètre des calices, 1 à 1 1/2 millim. — *Dévonien*: Bensberg; Eifel; Fèrques; Ferrones; la rivière Uchta (Russie).

2. *A. TUBÆFORMIS*, Goldfuss, *l. c.*, pl. 29, fig. 2, 1829. — *Alecto id.*, Steininger, 1831. = Cette espèce, voisine de la précédente, paraît en différer par sa forme plus turbinée, ses calices ovales et ses polypiérites un peu plus allongés (6 à 8 millim.). — *Dévonien*: Eifel.

3. *A. CUCULLINA*, Michelin, *Icon.*, pl. 48, fig. 5. — *A. tubæformis id.*, ibid., pl. 48, fig. 4. = Polypiérites plus espacés et encore plus turbinés que dans l'espèce précédente; diamètre des calices, 1 à 2 mill. — *Dévonien*: Ferques; Nehou; Viré.

4. *A. CONGLOMERATA*, Goldfuss, *l. c.*, pl. 29, fig. 4. — Morren, 1832. — D'Orbigny, 1850. — *A. spicata*, Goldfuss, pl. 29, fig. 3. = Polypiérites resserrés, longs, cylindriques et très-relevés; calices circulaires, larges de 1 millim.; 12 côtes cachées par une épithèque forte. — *Dévonien*: Eifel; Bensberg; Ferques; Nehou.

MM. Edwards et Haime rapportent encore à l'ordre des Zoanthaires les fossiles suivants, dont la place n'a pas pu être déterminée et dont la nature est assez douteuse :

MORTIERA VERTEBRALIS, de Koninck, 1842. — Michelin, pl. 50, fig. 1, 1846. = Disque bi-concave et bien strié sur les bords; diamètre, 4 à 6 centim.; hauteur, de 6 à 40 mill. — *Carboniférien*: Tournay.

CYCLOCRINITES SPASKI, Eichwald, 1840-1842. = Polypier en masse sphérique; calices polygonaux et superficiels; 18 cloisons inégaux et minces; largeur des calices, 1 1/2 millim. — *Silurien*: St-Pétersbourg.

Cette espèce appartient probablement au genre *Polyphyllum*.

RHYSMOTES PETIOLATUS, Fischer, 1832. = Polypier globiforme ou fongiforme; calices à cloisons dentées et larges; côtes confluentes. — Ce fossile appartient peut-être à une espèce usée du genre *Phyllisastrea*.

HETEROPHYLLIA GRANDIS, M'Coy, 1849. = « Tige légèrement flexueuse » d'environ 5 lignes de diamètre, longitudinalement marquée de sillons » inégaux et d'un petit nombre de côtes saillantes, larges, qui donnent à » la tige une forme très-irrégulièrement anguleuse dans une section » horizontale; surface lisse. » — *Carboniférien*: Derbyshire.

HETEROPHYLLIA ORNATA, M'Coy, 1849. = « Tiges cylindriques, longues et flexueuses, larges de 1 ligne 1/2 (angl.), avec environ 16 arêtes » longitudinales, étroites, subégales, séparées par des espaces planes » plus larges que les côtes elles-mêmes qui sont ornées de petits tubercules ronds; surface finement granuleuse dans une section horizontale; » environ 14 cloisons près de la muraille. » (M'Coy in Edwards et Haime, 1851.) — *Carboniférien*: Derbyshire.

CYATHOPORA IOWENSIS, Dale-Owen, 1844. = « Tige simple ou ramifiée, cellulaire; cellules divergeant de l'axe à la circonférence et s'ou-

» vrant à la surface en couches cupuliformes distinctes et à bord élevé ;
» longueur, 1 pouce 1/2 ; diamètre, 1/7 de pouce (angl.). » — *Carboniférien* : Iowa.

DISTICHOPORA ANTIQUA, DeFrance, 1830. — Michelin, *Icon.*, pl. 45, fig. 11. = Polypier rameux, comprimé, à surface lisse ; pores situés dans un sillon latéral. — *Parisien* : Chaumont ; Valmondois.

ORDRE II. — ALCYONAIRES.

Polypes ornés de huit tentacules bipinnés ; cavité viscérale munie de 8 lamelles périgastriques contenant les organes reproducteurs. Lorsque les Alcyonaires possèdent un polypier, celui-ci est essentiellement épidermique, comme nous l'avons déjà dit en parlant de l'épithèque, et les cavités, s'il s'en trouve dans le sclérenchyme, ne sont jamais divisées par des cloisons rayonnantes.

Les Alcyonaires se divisent en trois sous-ordres : 1° les A. ALCYONIDES ; 2° les A. GORGONIDES ; 3° les A. PENNATULIDES (1).

Les premiers ont un polypiéroïde adhérent, mais sans axe épithélique ; les seconds ont un polypiéroïde adhérent, mais ils possèdent un axe épithélique corné ou calcaire ; enfin les troisièmes ont un polypiéroïde libre, creusé d'une cavité centrale qui renferme ordinairement un axe formé d'un tissu épithélique.

MM. Edwards et Haime ne reconnaissent point de représentant fossile du sous-ordre des A. *Alcyonides*, mais M. Pictet y fait rentrer le fossile suivant dont la nature est excessivement douteuse :

ALCYONUM CIRCUMVESTENS, Wood, *Ann. and Mag. of nat. hist.*, p. 21, t. XIII. — *Corallien* : Sutton.

Il y place aussi le *Distichopora antiqua*, que nous avons signalé plus haut.

SOUS-ORDRE DES A. GORGONIDES.

LVII^e Famille. — Isidiens.

ISIDIENS, Edwards et Haime, *Hist. nat. des corals*, p. 192, 1857.

Sclérobase dendroïde formé de cylindres calcaires alternant avec des rondelles de tissu corné ou subéreux.

(1) M. Pictet fait encore rentrer dans l'ordre des Alcyonaires les *Graptolites*, dont les affinités avec les polypes sont fort douteuses, et qui nous semblent plutôt devoir faire partie des Sertulariens, comme le pensent MM. Edwards et Haime, Portlock, etc.

GENRE CCXL. — ISIS.

Isis, Lamouroux. *Hist. nat. des pol. flex.*, p. 468, 1816.

— Blainville, 1830.

Corallum, Seba, *Thesaurus*, p. 202, t. III.

Sertularia, Linné, 1737.

— Cuvier, 1717, etc., etc.

Isis, Edwards et Haime, *Hist. nat. des corall.*, 1857.

Polypiéroïde dont les cylindres calcaires donnent naissance aux branches latérales, qui ne se développent jamais sur les disques élastiques.

1. *I. MELITENSIS*, Goldfuss, pl. 7, fig. 17. — *Corallium articulatum* (1), Scilla, *De corp. mar. Lapid.*, pl. 21, fig. 1, 1759. — Knorr et Walch, 1775. — *I. melitensis*, Blainville. — Michelin, pl. 15, fig. 10. = Articles calcaires allongés; surface finement striée; parties articulaires un peu élargies. — *Subapennin*: Milazzo, Lipari (Piémont).

2. *I. SPIRALIS*, Morren, *Desc. coral. in Belg.*, 1832. = Articles calcaires très-longs et couverts de stries en spirale. — *Danien*: Ciply (Belgique).

3. *I. CORALLINA*, Morren, *l. c.*, pl. 4, fig. 1, 1832. = Articles calcaires gros et courts; sillons verticaux assez écartés. — *Terrains de transition*: Groningue.

GENRE CCXLI. — MOPSEA.

Mopsea, Lamouroux, *Hist. des pol. flex.*, 1816.

— Ehrenberg, *Corralleuth*.

— Dana, *Zooph.*

— Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851.

Isis, Pallas, *Elench. Zooph.*

— Linné, *Syst. nat.*

— Lamarck, *Hist. des anim. sans vert.*

Polypiéroïde dont les branches naissent sur les disques ou entre-nœuds élastiques et cornés de l'axe sclérobasique.

M. COSTATA, Edwards et Haime, *Brit. foss. corals*, pl. 7, fig. 3. = Polypiéroïde grêle et arborescent; articles calcaires allongés et finement striés; entre-nœuds très-étroits. — Hallovay (Londres).

LVIII^e Famille. — Coralliens.

CORALLIENS. Edwards et Haime, *Hist. nat. des coral.*, t. II, p. 201, 1857.

Axe sclérobasique composé d'un tissu épidermique homogène et lithoïde.

(1) Nous n'avons pas admis ce nom, quoique plus ancien, parce que c'est un adjectif qui désigne un état commun à tous les Isis.

GENRE CCXLII. — CORALLIUM.

Corallium, Lamarck, 1816, etc.

Axe sclérobasique dendroïde; branches s'atténuant vers le bout; surface striée en long.

1. *C. BECKI*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, 1851. — *Coral allied to Isis*, Beck in Lyell, 1837. = Branches coalescentes et grosses, arrondies au bout en forme de mamelons, mais n'étant pas atténuées. — *Danien* : Faxöë.

2. *C. PALLIDUM*, Michelin, *Icon.*, pl. 15, fig. 9. — *C. rubrum*, Michelotti, *Spec. Zooph. diluv.*, 1838. = Cette espèce ne diffère du corail rouge que par ses stries beaucoup plus fines. — *Falunien* : Turin.

3. *C. ALTERNANS*. = Nous avons trouvé dans l'étage Portlandien des environs de Gray des empreintes assez bien conservées et qui ne peuvent se rapporter qu'à une espèce du genre *Corallium*; les tiges sont rondes de 12 à 15 millim; les branches sont opposées deux à deux et naissent sur la tige première à 5 ou 7 centim. de distance et dans une direction opposée à la paire inférieure; les stries costales sont fortes, profondes et larges environ d'un millim. — *Portlandien* : Gray-la-Ville; Arc.

Cette empreinte a déjà été figurée en 1856 dans la notice de M. Perron, sur l'Etage Portlandien des environs de Gray, pl. 2, fig. 1.

SOUS-ORDRE DES PENNATULIDES.

LIX^e Famille. — Pennatulien.

PENNATULAIRES, Edwards et Haime, *l. c.*, p. 207, 1857.

Tige commune libre, pouvant s'enfoncer dans la vase ou le sable, et soutenue à l'intérieur par un axe sclérobasique styloforme bien développé.

GENRE CCXLIII. — VIRGULARIA.

Virgularia, Lamarck, 1816, etc.

Axe sclérobasique calcaire, long, grêle, pointu et présentant une structure radiaire; pinnules en forme de croissant ou de stries transversales.

V. ? *ALPINA*, d'Orbigny, *Prod.*, t. II, p. 335. = Tige sclérobasique comprimée, quadrangulaire et presque canaliculée. — *Suessonien* : Vit, près Castellane.

GENRE CCXLIV. — PAVONARIA.

Pavonaria, Cuvier, 1817, etc.

Polypierioïde en forme de baguette, ne portant des polypes que d'un seul côté; stylet sclérobasique quadrangulaire, long et aigu.

P. *DELANOUEI*, Edwards et Haime, *Pol. foss. des terr. pal.*, p. 189, 1851. = Tige subtéragonale, à arêtes mousses; une des faces bombées; sa correspondante concave; surface lisse; structure intérieure radiée. — *Danien* : Ciply.

ADDENDA.

Syrrastrées Apores.— Famille des Comosériniens, p. 170.

GENRE PACHYSERIS, Edwards et Haime, 1849. = Polypier foliacé et polymorphe; calices en séries séparées par des collines inégales; columelle bien distincte et tuberculeuse; plateau nu et strié.

P. MURCHISONI, d'Archiac et Haime, *Anim. foss. de l'Inde*, 1853. — *Agaricia id.*, J. Haime, 1851 (*in d'Archiac*). = Séries larges de 1 cent.; collines peu élevées; cloisons minces et inégales; on en compte 16 dans une longueur de 1 centim.; columelles allongées et espacées. — *Falunien*: Sinde; St-Bonnet.

GENRE AGARICIA, Lamarck, 1801. — Edwards et Haime, 1851. — *Undaria*, Oken, 1815. — *Pavonia*, Lamarck, 1816. = Polypier foliacé; calices à centres distincts et disposés en séries circulaires séparées par des collines peu développées. Ce genre diffère du précédent par ses calices à centre distinct, ce qui n'existe pas chez les Pachyséris.

A. FORSKALI, Edwards et Haime, 1851. = Polypier en lame mince; côtes inégales; calices en séries circulaires; collines peu marquées; les calices sont circonscrits et larges de 5 à 6 millim.; on y compte 20 ou 22 cloisons. — Dépôts récents de la mer Rouge.

A. ATACIANA, Edwards et Haime, 1851. — *Meandrina id.*, Michelin, *Icon.*, pl. 69, fig. 1. — *Mycrophyllia id.*, d'Orbigny, *Prod.*, 1850. = Polypier épais; cloisons confluentes et fines; collines bien développées; centres calicinaux peu distincts; vallées profondes, larges de 7 à 8 mill. — *Turonien*: Corbières.

Polyastrées tabulés. — Famille des Chætétiniens, p. 270.

GENRE STYLOPHYLLUM, Reuss, *Bett. zur. charact.*, etc., 1854. = Polypier massif; polypiérites soudés par des murailles épaisses et imperforées; calices superficiels; columelle nulle; cloisons poutrelles, spiniformes et irrégulières; planchers irréguliers, obliques ou droits; cœnenchyme nulle.

Ce genre devrait peut-être former une division particulière, car plusieurs caractères l'éloignent des Chætétiniens.

S. POLYACANTHUM, Reuss, *loc. cit.*, pl. 21, fig. 1-3. = Polypier en masse hémisphérique; calices polygonaux assez creux et larges de 7 à 11 millim.; murailles épaisses et séparées par des lignes épithécales; cloisons spiniformes très-irrégulières. — *Turonien*: Gosau.



TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

PRÉFACE	Page 1	POLYASTRÉES	48
COUP D'ŒIL HISTORIQUE	5	DISTRIBUTION MÉTHODIQUE	
1 ^{re} époque	5	DES POLYPIERS FOSSILES	53
2 ^e époque	9	TABLEAU DICHOTOMIQUE	54
ANATOMIE DES POLYPIERS	14	ORDRE I. — ZOANTHAIRÉS	76
ORGANE MIXTE	16	SOUS-ORDRE I. — Z. CAULICULÉS.	76
Muraille	16	1 ^{re} Famille. — Antipathiens	76
ORGANES INTERNES	18	<i>Genre</i> <i>Leipathes</i>	76
Cloisons	18	SOUS-ORDRE II. — Z. APORES	76
Espace columellaire	19	Monastrées Apores	77
Cloisons primaires	20	1 ^{re} Tribu. — <i>Turbinoliacées</i>	77
Cycles	22	II ^e Famille. — Dasmien	77
Columelle	27	<i>Genre</i> <i>Dasmia</i>	77
Columelle vraie	27	III ^e Famille. — <i>Caryophylliens</i>	77
Columelle fasciculaire	27	<i>Genre</i> <i>Conocyathus</i>	77
Columelle styliforme	27	— <i>Brachycyathus</i>	78
Columelle lamellaire	28	— <i>Bathycyathus</i>	78
Fausse columelle	28	— <i>Caryophyllia</i>	78
Columelle tortile	28	— <i>Acanthocyathus</i>	79
Columelle cloisonnaire	28	— <i>Discocyathus</i>	80
Columelle pariétale	28	— <i>Cyclocyathus</i>	80
Palis	29	— <i>Stylocyathus</i>	80
Synapticules	31	— <i>Leptocyathus</i>	80
Traverses	32	— <i>Deltocyathus</i>	81
Planchers	32	— <i>Thecocyathus</i>	81
Endothèque	33	— <i>Trochocyathus</i>	81
ORGANES EXTERNES	33	— <i>Paracyathus</i>	87
Côtes	33	IV ^e Famille. — <i>Turbinoliens</i>	88
Rayons septo-costaux	34	<i>Genre</i> <i>Flabellum</i>	88
Exothèque	35	— <i>Turbinolia</i>	91
Traverses exothécales	35	— <i>Sphenotrochus</i>	92
Cœnenchyme	35	— <i>Discotrochus</i>	93
Périthèque	35	— <i>Platitrochus</i>	93
Epithèque	35	— <i>Ceratotrochus</i>	94
Stolons	37	— <i>Smitotrochus</i>	94
REPRODUCTION ET MULTI-		— <i>Desmophyllum</i>	95
PLICATION DES POLYPIERS	37	2 ^e Tribu. — <i>Trochosmiliacées</i>	95
OVIPARITÉ	37	V ^e Famille. — <i>Trochosmiliens</i>	95
BOURGEONNEMENT	38	<i>Genre</i> <i>Diploctenium</i>	95
Bourgeoisement basilaire	39	— <i>Trochosmilia</i>	95
— latéral	39	— <i>Cylicosmilia</i>	100
— calicinal	40	— <i>Placosmilia</i>	100
FISSIPARITÉ	40	— <i>Cœlosmilia</i>	101
DÉVELOPPEMENT PAR SUPERPO-		— <i>Parasmilia</i>	102
SITION	42	— <i>Lophosmilia</i>	103
HABITUDES EXTÉRIEURES DES			
POLYPIERS	43		
MONASTRÉES	43		
DISASTRÉES	45		
SYRRASTRÉES	47		

VI^e Famille. — Pleurosmiliens	104
Genre Epismilia	104
— Pleurosmilia	105
— Trismilia	106
— Peplosmilia	106
— Blastosmilia	107
— Axosmilia	108
VII^e Famille. — Lithophylliens	108
Genre Montlivaultia	108
— Leptophyllia	120
— Lithophyllia	122
— Circophyllia	122
3 ^e Tribu. — <i>Fongidées</i>	123
VIII^e Famille. — Anabaciens	123
Genre Micrabacia	123
— Anabacia	123
IX^e Famille. — Cyclosériniens	124
Genre Cyclolites	124
— Paleocycclus	125
— Cycloseris	126
— Trochoseris	126
— Gyroseris	129
Disastrées Apores	129
X^e Famille. — Euhéliens	129
Genre Euhelia	129
— Enallohelia	129
— Diplohelia	131
— Lophohelia	131
XI^e Famille. — Aplosmiliens	132
Genre Aplosmilia	132
— Barysmilia	133
XII^e Famille. — Calamophylliens	134
Genre Dasyphyllia	134
— Aplophyllia	134
— Calamophyllia	135
— Dactylosmilia	137
— Rhabdophyllia	147
— Baryphyllia	139
— Pleurophyllia	140
— Hymenophyllia	141
— Thecosmilia	141
— Cladophyllia	144
XIII^e Famille. — Stylosmiliens	146
Genre Donacosmilia	146
— Dendrosmlia	147
— Stylosmilia	147
— Placophyllia	147
XIV^e Famille. — Cladocoriens	148
Genre Goniocora	148
— Cladocora	149
— Pleurocora	151
XV^e Famille. — Ryzangiens	152
Genre Cryptangia	152
— Rizangia	152

Syrastrées Apores	153
XVI^e Famille. — Eugyriens	153
Genre Stenogyra	153
— Eugyra	154
— Rhipidogyra	154
— Phytogyra	156
— Pachygyra	156
— Dendrogyra	157
XVII^e Famille. — Latiméandriens	158
Genre Latimæandra	158
— Chorisastræa	163
XVIII^e Famille. — Symphylliens	164
Genre Stibastræa	164
— Latiphyllia	164
— Mæandrastræa	164
— Synphyllia	165
— Ulophyllia	165
— Aspidiscus	166
— Mycetophyllia	166
— Leptoria	167
— Mæandrina	167
— Diploria	168
— Stelloria	169
— Hydnochora	169
XIX^e Famille. — Comosériniens	170
Genre Comoseris	170
— Oroseris	170
— Pachyseris	323
— Agaricia	323
Polyastrées Apores	171
XX^e Famille. — Faviens	171
Genre Favia	171
— Goniastræa	174
— Septastræa	174
XXI^e Famille. — Oculiniens	175
Genre Oculina	176
— Synhelix	176
— Psammohelia	176
— Prohelia	177
— Astrohelia	178
— Baryhelix	178
XXII^e Famille. — Stylophoriens	179
Genre Stylophora	179
— Stylohelix	180
— Aræacis	181
— Heterocœnia	181
— Elasmocœnia	182
XXIII^e Famille. — Diplocéniens	183
Genre Diplocœnia	183
XXIV^e Famille. — Styliniens	184
Genre Placocœnia	184
— Styliua	185
— — <i>octostyliuæ</i>	189
— — <i>decastyliuæ</i>	191
— Columnastræa	193

<i>Genre</i> Pentacœnia	194	Syrastées perforés	247
— Convexastræa	195	XXXII^e Famille. — Latiméandraréens	247
— Phyllocœnia	196	<i>Genre</i> Latiméandraræa	247
— Cryptocœnia	197	Polyastées perforés	248
— Holocœnia	199	XXXIII^e Famille. — Madréporiens	248
— Dimorphocœnia	200	<i>Genre</i> Madrepora	248
— Pleurostyliina	201	XXXIV^e Famille. — Turbinariens	249
— Aplocœnia	201	<i>Genre</i> Turbinaria	249
— Stephanocœnia	202	— Actinacis	249
— Stylocœnia	203	— Astreopora	250
XXV^e Famille. — Astréens	204	— Dendracis	250
<i>Genre</i> Plesiastrea	205	XXXV^e Famille. — Poritiniens	250
— Solenastrea	205	<i>Genre</i> Holaræa	250
— Heliastrea	206	— Porites	251
— Brachyphyllia	209	— Rhodaræa	251
— Confusastrea	210	— Protaræa	251
— Thamnastrea	211	— Microsolena	252
— — <i>Centrastræa</i>	215	— Dimorpharæa	254
— — <i>Synastrea</i>	218	— Litharæa	255
— Stylastrea	223	— Pseudodictyum	256
— Dimorphastrea	223	— Dictyophyllia	256
— Prionastrea	225	SOUS-ORDRE IV. — Z. TABULÉS	256
— Isastrea	226	Monastées tabulés	256
— Amphiastrea	231	Disastées tabulés	257
— Astrocœnia	232	XXXVI^e Famille. — Syringoporiens	257
— Enallastrea	235	<i>Genre</i> Syringopora	257
— Astræa	235	— Fletcheria	259
— Plerastrea	236	Syrastées tabulés.	259
— Astreomorpha	236	XXXVII^e Famille. — Halysitiniens	259
XXVI^e Famille. — Astrangiens	237	<i>Genre</i> Halysites	259
<i>Genre</i> Astrangia	237	Polyastées tabulés	260
— Phyllangia	238	XXXVIII^e Famille. — Milleporiens	268
— Cladangia	238	<i>Genre</i> Axopora	260
— Pleurocœnia	239	— Heliolites	261
XXVII^e Famille. — Génabaciens	239	— Polytremacis	262
<i>Genre</i> Genabacia	239	— Plasmopora	263
XXVIII^e Famille. — Cyathosériniens	239	— Propora	263
<i>Genre</i> Polyphyloseris	240	— Battersbyia	264
— Cyathoseris	240	— Fistulipora	264
— Protoseris	241	— Lyellia	264
— Thamnoseris	241	XXXIX^e Famille. — Dendroporiens	264
SOUS-ORDRE III. — Z. PERFORÉS	241	<i>Genre</i> Rhabdopora	265
Monastées perforés	241	— Dendropora	265
XXIX^e Famille. — Eupsammiens	241	— Trachypora	265
<i>Genre</i> Stephanophyllia	242	XI^e Famille. — Favositiniens	265
— Endopachys	242	<i>Genre</i> Alveolites	265
— Eupsammia	243	— Roëmeria	267
— Balanophyllia	243	— Favosites	267
Disastées perforés	245	— Koninckia	270
XXX^e Famille. — Disaréens	245	— Emmonsia	270
<i>Genre</i> Disaræa	245	— Michelinia	270
XXXI^e Famille. — Dendrophylliens	246	XII^e Famille. — Chœtétiniens	272
<i>Genre</i> Lobopsammia	246	<i>Genre</i> Constellaria	272
— Dendrophyllia	246	— Baumontia	272
— Stereopsammia	247		

<i>Genre</i> Dania	273	<i>Genre</i> Disphyllum	302
— Chætetes	273	— Eridophyllum	304
— Deakyia	276	— Diphyphyllum	304
— Stylophyllum	323		
— Labechia	276	Lle Famille. — Lonsdaliens	306
XLIIe Famille. — Pocilloporiens	276	<i>Genre</i> Lonsdaleia	306
<i>Genre</i> Pocillopora	276	Syrtrastrées rugueux	307
— Cœnites	277	Polyastrées rugueux	307
XLIIIe Famille. — Thécostégitiens	277	LIIe Famille. — Stauriens	307
<i>Genre</i> Chonostegites	277	<i>Genre</i> Stauria	307
— Thecostegites	278	— Holocystis	307
— Cyathophora	278		
XLIVe Famille. — Théciens	279	LIIIe Famille. — Acervulariens	308
<i>Genre</i> Columnaria	280	<i>Genre</i> Smithia	308
— Thecia	280	— Polyphyllum	308
— Clausastræa	280	— Spongophyllum	310
SOUS-ORDRE V. — Z. RUGUEUX	282	— Endophyllum	310
Monastrées rugueux	282	— Acervularia	311
XLVe Famille. — Cystiphylliens	282	— Strombodes	312
<i>Genre</i> Cystiphyllum	282	LIVe Famille. — Stylaxiniens	313
XLVIe Famille. — Axophylliens	283	<i>Genre</i> Lithostrotion	313
<i>Genre</i> Oxophyllum	283	— Phillipsastræa	315
XLVIIe Famille. — Polycœliens	283	— Syringophyllum	315
<i>Genre</i> Polycœlia	284	— Styliodophyllum	316
— Metriophyllum	284	— Chonaxis	317
XLVIIIe Famille. — Zaphrentinens	284	— Stylaxis	317
<i>Genre</i> Combophyllum	284	SOUS-ORDRE VI. — Z. TUBULÉS	318
— Amplexus	285	Monastrées tubulés	318
— Zaphrentis	286	LVe Famille. — Pyrgiens	318
— Aulacophyllum	289	<i>Genre</i> Pyrgia	318
— Baryphyllum	290		
— Anisophyllum	290	Disastrées tubulés	318
— Lophophyllum	290	LVIe Famille. — Auloporiens	318
— Hallia	291	<i>Genre</i> Aulopora	318
— Trochophyllum	291	ZOANTHARIA INCERTÆ SEDIS	319
— Menophyllum	292		
— Hadrophyllum	292		
XLIXe Famille. — Cyathophylliens	292	ORDRE II. — ALCYONAIRES.	
<i>Genre</i> Anlophyllum	292	SOUS-ORDRE DES GORGONIDES	320
— Goniophyllum	293	LVIe Famille. — Isidiens	320
— Omphyma	293	<i>Genre</i> Isis	321
— Cyathophyllum	294	— Mopsea	321
— Clisiophyllum	298		
— Heliophyllum	299	LVIIIe Famille. — Coralliens	321
— Campophyllum	299	<i>Genre</i> Corallium	322
— Streptelasma	300	SOUS-ORDRE DES PENNATULIDES	322
— Ptychophyllum	300	LIXe Famille. — Pennatulieus	322
— Chonophyllum	301	<i>Genre</i> Virgularia	322
Disastrées rugueux	301	— Pavonaria	322
Le Famille. — Eridophylliens	301		
<i>Genre</i> Pachyphyllum	301		

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES ESPÈCES DÉCRITES OU CITÉES DANS CET OUVRAGE.

Les noms écrits en caractères romains sont ceux que nous avons adoptés dans cet ouvrage; ceux en *italique* sont cités en synonymie.

A.			ADELASTRÆ <i>leptophyllia</i>	211
ACANTHOCYATHUS	Hastingsæ	P. 79	ADELOCENIA <i>castellum</i>	189
ACERVULARIA	<i>ananas</i>	311	— <i>corallina</i>	192
—	<i>ananas</i>	312	— <i>Lanceloti</i>	192
—	<i>Baltica</i>	312	— <i>Moreana</i>	186
—	<i>Baltica</i>	313	— <i>tubulosa</i>	187
—	<i>Battersbyi</i>	312	AGARICIA <i>agaricites</i>	213
—	<i>coronata</i>	311	— <i>Apennina</i>	170
—	<i>Davidsoni</i>	312	— <i>ataciana</i>	223
—	<i>Goldfussi</i>	311	— <i>boletiformis</i>	213
—	<i>Hennahii</i>	312	— <i>circularis</i>	165
—	<i>intercellulosa</i>	311	— <i>convexa</i>	171
—	<i>limitata</i>	312	— <i>crassa</i>	227
—	<i>luxurians</i>	311	— <i>elegantula</i>	214
—	<i>pentagona</i>	311	— <i>elegantula</i>	171
—	<i>Rœmeri</i>	312	— <i>foliacea</i>	219
—	<i>Troscheli</i>	311	— <i>Forskali</i>	223
ACROSMILIA	<i>acaulis</i>	114	— <i>granulata</i>	171
—	<i>cenomana</i>	121	— <i>granulata</i>	253
—	<i>cernua</i>	99	— <i>granulata</i>	254
—	<i>conica</i>	100	— <i>infundibuliformis</i>	240
—	<i>corallina</i>	99	— <i>irregularis</i>	271
—	<i>elongata</i>	100	— <i>lobata</i>	216
—	<i>granulata</i>	145	— <i>lobata</i>	191
—	<i>varusensis</i>	100	— <i>lobata</i>	215
—	<i>vasiformis</i>	110	— <i>Ludovicana</i>	225
ACTINACIS	<i>elegans</i>	249	— <i>Murchisoni</i>	223
—	<i>Haueri</i>	250	— <i>Neocomiensis</i>	171
—	<i>Martini</i>	249	— <i>plana</i>	171
ACTINASTREA	<i>Goldfussi</i>	235	— <i>ramosa</i>	222
ACTINOCENIA	<i>Dumasiana</i>	196	— <i>rolata</i>	229
—	<i>clathrata</i>	184	— <i>Sæmmeringi</i>	171
—	<i>compressa</i>	197	— <i>spælea</i>	170
—	<i>lobata</i>	184	— <i>Sulcata</i>	171
—	<i>minima</i>	184	— <i>Swindernana</i>	280
—	<i>stellata</i>	184	ALCYONUM <i>circumvestens</i>	328
ACTINOCYATHUS	<i>Balticus</i>	313	ALECTO <i>serpens</i>	319
—	<i>crenularis</i>	309	— <i>tubæformis</i>	319
—	<i>Phillipsii</i>	313	ALLOECENIA <i>furcata</i>	203
ACTINORÆA	<i>granulata</i>	254	ALVEOLITES <i>Battersbyi</i>	266
ACTINOSERIS	<i>cnomanensis</i>	127	— <i>Buchiana</i>	276
—	<i>provincialis</i>	127	— <i>celleporatus</i>	269
ACTINOSMILIA	<i>cenomana</i>	104	— <i>cervicornis</i>	269

ALVEOLITES	<i>cervicornis</i>	269	ANTHOPHYLLUM	<i>bicostatum</i>	291
—	<i>confertus</i>	258	—	<i>Brauni</i>	152
—	<i>denticulata</i>	266	—	<i>decipiens</i>	114
—	<i>depressa</i>	266	—	<i>denticulatum</i>	288
—	<i>dubia</i>	269	—	<i>detritum</i>	119
—	<i>escharoides</i>	266	—	<i>dispar</i>	117
—	<i>fibrosus</i>	269	—	<i>distortum</i>	128
—	<i>Fungii</i>	266	—	<i>Erguelense</i>	113
—	<i>Grayi</i>	266	—	<i>excavatum</i>	120
—	<i>hemispherica</i>	270	—	<i>excavatatum</i>	149
—	<i>infundibultifera</i>	267	—	<i>explanatum</i>	114
—	<i>Labechei</i>	276	—	<i>incrustans</i>	264
—	<i>Lonsdalei</i>	269	—	<i>inaequale</i>	119
—	<i>madreporacea</i>	276	—	<i>obconicum</i>	111
—	<i>megastomus</i>	267	—	<i>obconicum</i>	146
—	<i>Parisiensis</i>	251	—	<i>patellatum</i>	113
—	<i>polymorpha</i>	269	—	<i>pateriforme</i>	119
—	<i>ramosus</i>	267	—	<i>prolapsum</i>	293
—	<i>repens</i>	266	—	<i>rude</i>	103
—	<i>reticulata</i>	266	—	<i>sessile</i>	113
—	<i>reticulata</i>	269	—	<i>sulcatum</i>	169
—	<i>scabra</i>	274	—	<i>truncatum</i>	122
—	<i>septosa</i>	266	—	<i>truncatum</i>	118
—	<i>seriatopora</i>	267	—	<i>turbinatum</i>	111
—	<i>squammosus</i>	267	ANTIPATHES	<i>vetusta</i>	76
—	<i>subæqualis</i>	266	APLOCYATHUS	<i>cyclolitoides</i>	84
—	<i>suborbicularis</i>	266	—	<i>conulus</i>	83
—	<i>tuberosa</i>	266	—	<i>Harveyanus</i>	83
—	<i>vermicularis</i>	266	—	<i>Magnevilleanus</i>	83
ALVEOPORA	<i>elegans</i>	202	—	<i>obesus</i>	86
—	<i>grandis</i>	263	—	<i>armatus</i>	86
—	<i>incrustata</i>	254	—	<i>pyramidatus</i>	86
—	<i>Lonsdalei</i>	263	—	<i>Sismondai</i>	82
—	<i>microsolena</i>	253	—	<i>sublævis</i>	86
—	<i>racemosa</i>	254	—	<i>undatus</i>	85
—	<i>tuberosa</i>	254	APLOPHYLLIA	<i>crassa</i>	135
—	<i>tabulata</i>	263	—	<i>dichotoma</i>	135
AMBLOCYATHUS	<i>Bowerbanki</i>	79	—	<i>Guettardi</i>	135
—	<i>conicus</i>	146	—	<i>Orbigny</i>	135
AMBLOPHYLLIA	<i>cretacea</i>	144	APLOCÆNIA	<i>Yerofeyewi</i>	201
—	<i>obtusa</i>	144	APLOSASTREA	<i>elegans</i>	192
—	<i>rupellensis</i>	144	—	<i>geminata</i>	181
AMPHIASTRÆA	<i>basaltiformis</i>	232	—	<i>neptuni</i>	192
AMPLEXUS	<i>annulatus</i>	285	—	<i>stylophora</i>	204
—	<i>coralloides</i>	285	APLOSMILIA	<i>aspera</i>	132
—	<i>cornu-bovis</i>	285	—	<i>crassa</i>	132
—	<i>decoratus</i>	286	—	<i>dumosa</i>	132
—	<i>Henslowi</i>	285	—	<i>elegans</i>	133
—	<i>nodulosus</i>	285	—	<i>gregaria</i>	132
—	<i>ornatus</i>	286	—	<i>magnifica</i>	133
—	<i>serpuloides</i>	285	—	<i>nuda</i>	133
—	<i>spinosus</i>	285	—	<i>semisulcata</i>	132
—	<i>tortuosus</i>	286	—	<i>spatula</i>	133
—	<i>Yandelli</i>	285	ARACHNOPHYLLUM	<i>typus</i>	312
ANABACIA	<i>Bajociana</i>	123	AREACIS	<i>auvertiaca</i>	181
—	<i>Bouchardi</i>	124	—	<i>Michelini</i>	181
—	<i>Normaniana</i>	124	ASPIDISCUS	<i>cristatus</i>	166
—	<i>orbulites</i>	123	—	<i>Shawis</i>	166
ANISOPHYLLUM	<i>Agassizi</i>	290	ASTREA	<i>acropora</i>	207
ANOMOPHYLLUM	<i>Munsteri</i>	255	—	<i>agaricites</i>	213

ASTREA	<i>agaricites</i>	221	ASTREA	<i>digitata</i>	220
—	<i>agaricites</i>	221	—	<i>dissimilis</i>	230
—	<i>agaricites</i>	216	—	<i>diversiformis</i>	225
—	<i>alveolata</i>	309	—	<i>elegans</i>	307
—	<i>Ameliana</i>	255	—	<i>Ellisiana</i>	208
—	<i>ananas</i>	309	—	<i>emarciata</i>	204
—	<i>ananas</i>	311	—	<i>emarciata</i>	316
—	<i>arachnoides</i>	206	—	<i>escharoides</i>	225
—	<i>arachnoides</i>	314	—	<i>explanata</i>	228
—	<i>arachnoides</i>	219	—	<i>explanulata</i>	229
—	<i>aranea</i>	314	—	<i>exsculpta</i>	209
—	<i>aranea</i>	225	—	<i>favosa</i>	208
—	<i>araneola</i>	215	—	<i>flexuosa</i>	218
—	<i>argus</i>	207	—	<i>florida</i>	316
—	<i>astroites</i>	208	—	<i>formosa</i>	282
—	<i>auvertiaca</i>	181	—	<i>formosa</i>	233
—	<i>basaltiformis</i>	314	—	<i>formosissima</i>	202
—	<i>basaltiformis</i>	311	—	<i>formosissima</i>	174
—	<i>Beaudouini</i>	206	—	<i>formosissima</i>	230
—	<i>bella</i>	237	—	<i>formosissima</i>	233
—	<i>bellula</i>	255	—	<i>Frählichana</i>	235
—	<i>Bertrandiana</i>	236	—	<i>funesta</i>	235
—	<i>Bourgeti</i>	279	—	<i>gulazea</i>	236
—	<i>brevissima</i>	153	—	<i>geminata</i>	234
—	<i>Burgundiae</i>	210	—	<i>geminata</i>	190
—	<i>Cadomensis</i>	214	—	<i>geminata</i>	188
—	<i>Carllaudi</i>	234	—	<i>Genevensis</i>	213
—	<i>Calipso</i>	209	—	<i>geometrica</i>	212
—	<i>Caryophylloides</i>	173	—	<i>Goldfussi</i>	215
—	<i>castellum</i>	189	—	<i>gracilis</i>	217
—	<i>cavernosa</i>	188	—	<i>grandis</i>	206
—	<i>cistella</i>	216	—	<i>Guettardi</i>	206
—	<i>composita</i>	221	—	<i>gyrosa</i>	173
—	<i>compressa</i>	197	—	<i>helianthoides</i>	227
—	<i>concinna</i>	217	—	<i>helianthoides</i>	230
—	<i>conica</i>	216	—	<i>helianthoides</i>	229
—	<i>coniformis</i>	216	—	<i>Hennahi</i>	308
—	<i>contorta</i>	179	—	<i>Hennahii</i>	315
—	<i>Cornuelana</i>	235	—	<i>Hennahii</i>	308
—	<i>corollaris</i>	206	—	<i>Hennahii</i>	312
—	<i>coronata</i>	193	—	<i>Hebertana</i>	209
—	<i>coronata</i>	209	—	<i>hexagona</i>	314
—	<i>corsica</i>	209	—	<i>hirtolamellata</i>	175
—	<i>crasso-ramosa</i>	233	—	<i>hystrix</i>	204
—	<i>crenularis</i>	309	—	<i>incrustans</i>	251
—	<i>crenulata</i>	235	—	<i>intercellulosa</i>	311
—	<i>crenulata</i>	235	—	<i>intercepta</i>	235
—	<i>cribraria</i>	206	—	<i>irregularis</i>	314
—	<i>crispa</i>	256	—	<i>irregularis</i>	225
—	<i>cristata</i>	213	—	<i>Italica</i>	236
—	<i>cylindrica</i>	204	—	<i>laganum</i>	216
—	<i>decaphyllia</i>	232	—	<i>lamellistrata</i>	214
—	<i>decemradiata</i>	191	—	<i>lamellosissima</i>	226
—	<i>decipiens</i>	221	—	<i>Lamourouxii</i>	214
—	<i>decorata</i>	204	—	<i>Lapeyrouseana</i>	204
—	<i>deformis</i>	225	—	<i>Lennisii</i>	220
—	<i>Delcrosana</i>	209	—	<i>septida</i>	208
—	<i>dendroidea</i>	214	—	<i>lifoliana</i>	307
—	<i>depravata</i>	193	—	<i>limitata</i>	229
—	<i>Desportesiana</i>	202	—	<i>limbata</i>	193

ASTREA	<i>limbata</i>	190	ASTREA	<i>sculpta</i>	197
—	<i>limbata</i>	188	—	<i>semispherica</i>	238
—	<i>lobato-rotundata</i>	204	—	<i>sexradiata</i>	195
—	<i>macrocona</i>	206	—	<i>sparsa</i>	197
—	<i>macrophthalma</i>	185	—	<i>sphaerica</i>	279
—	<i>macandrinoides</i>	160	—	<i>spheroidalis</i>	250
—	<i>mamillaris</i>	314	—	<i>sphaeroidalis</i>	181
—	<i>mamillaris</i>	316	—	<i>striata</i>	194
—	<i>mamillaris</i>	313	—	<i>stricta</i>	209
—	<i>Marylandica</i>	237	—	<i>stylophora</i>	204
—	<i>meandrites</i>	173	—	<i>sulcato-lamellosa</i>	208
—	<i>media</i>	220	—	<i>taurinensis</i>	204
—	<i>media</i>	219	—	<i>tenera</i>	230
—	<i>micrantha</i>	200	—	<i>tenuistriata</i>	226
—	<i>micraxona</i>	216	—	<i>tessellata</i>	236
—	<i>microconos</i>	219	—	<i>terminaria</i>	208
—	<i>microphyllia</i>	209	—	<i>textilis</i>	228
—	<i>multilateralis</i>	175	—	<i>thyrsiformis</i>	208
—	<i>muricata</i>	255	—	<i>thyrsiformis</i>	180
—	<i>numisma</i>	232	—	<i>tisburienensis</i>	229
—	<i>octolamellosa</i>	233	—	<i>trochiformis</i>	202
—	<i>oculata</i>	229	—	<i>truncata</i>	311
—	<i>ornata</i>	233	—	<i>tubulifera</i>	191
—	<i>panicea</i>	250	—	<i>tubulosa</i>	191
—	<i>parallela</i>	312	—	<i>tubulosa</i>	190
—	<i>Parisiensis</i>	236	—	<i>tubulosa</i>	187
—	<i>pediculata</i>	196	—	<i>tubulosa</i>	186
—	<i>pentagona</i>	311	—	<i>tumularis</i>	192
—	<i>pentagona</i>	316	—	<i>turonensis</i>	205
—	<i>pentagona</i>	312	—	<i>varians</i>	217
—	<i>pentagonalis</i>	234	—	<i>varians</i>	206
—	<i>pentagonalis</i>	173	—	<i>variolaris</i>	194
—	<i>perforata</i>	238	—	<i>velamentosa</i>	221
—	<i>perforata</i>	206	—	<i>venusta</i>	230
—	<i>plana</i>	208	—	<i>vesiculosa</i>	207
—	<i>polygonalis</i>	227	—	<i>resparia</i>	208
—	<i>porosa</i>	262	—	<i>Websteri</i>	255
—	<i>Portlocki</i>	314	ASTRÆOMORPHA	<i>crassisepta</i>	237
—	<i>pseudomeandrina</i>	165	—	<i>Goldfussi</i>	237
—	<i>putealis</i>	208	ASTRANGIA	<i>Americana</i>	237
—	<i>quincuncialis</i>	209	—	<i>bella</i>	237
—	<i>radiata</i>	196	—	<i>Marylandica</i>	237
—	<i>ramosa</i>	233	ASTRELIA	<i>crassi-ramosa</i>	238
—	<i>raristellata</i>	179	—	<i>semispherica</i>	238
—	<i>regularis</i>	195	—	<i>virginica</i>	131
—	<i>Renauxii</i>	208	ASTREOPORA	<i>antiqua</i>	264
—	<i>Requieni</i>	215	—	<i>asperima</i>	250
—	<i>reticulata</i>	232	—	<i>auvertiaca</i>	181
—	<i>reticulata</i>	233	—	<i>expaliata</i>	280
—	<i>reticulata</i>	202	—	<i>organum</i>	316
—	<i>Rochettina</i>	207	—	<i>panicea</i>	250
—	<i>rosacea</i>	236	—	<i>spheroidalis</i>	258
—	<i>rolata</i>	213	—	<i>vetusta</i>	251
—	<i>rotula</i>	209	ASTROGENIA	<i>Caillaudi</i>	234
—	<i>Royanensis</i>	209	—	<i>Carantonensis</i>	235
—	<i>rugosa</i>	310	—	<i>compressa</i>	232
—	<i>rustica</i>	210	—	<i>Cornuelli</i>	235
—	<i>Santi-Mihieli</i>	234	—	<i>Cotteau</i>	234
—	<i>Savignyana</i>	236	—	<i>crasso-ramosa</i>	234
—	<i>Savignyi</i>	236	—	<i>excavata</i>	233

CALAMOPHYLLIA subgracilis	137	CARYOPHYLLIA dilatata	116
— undata	183	— duplicata	303
— undulata	136	— duplicata	307
CALAMOPORA alveolaris	267	— elongata	120
— basaltica	268	— elongata	112
— dentifera	269	— extincitorium	108
— favosa	267	— fasciculata	305
— fibrosa	268	— flexuosa	303
— fibrosa	266	— geniculata	244
— Gothlandica	267	— gigantea	286
— imbricata	266	— globosa	99
— incrustans	269	— Guadulpensis	79
— infundibulifera	277	— Italica	244
— Mackrothii	276	— Juncea	304
— mamillaris	268	— Konincki	79
— megastoma	271	— liasica	100
— minutissima	268	— Maureausiaca	112
— polymorpha	269	— quadrifiga	284
— polymorpha	268	— retorta	113
— spongites	273	— Sismondai	79
— spongites	269	— speudoturbinolia	78
— spongites	266	— striatulata	114
— squamosa	266	— subcylindrica	117
— suborbicularis	266	— truncata	118
— tenuisepta	271	— truncata	115
— tumida	274	— turbinata	293
CALCEOLA pyramidalis	293	— vasisformis	110
CALOPHYLLUM Donatianum	284	CATENIPORA approximatica	260
CAMPOPHYLLUM Duchateli	300	— communicans	260
— flexuosum	380	— compressa	260
— Murchisoni	300	— distans	260
— priscum	300	— escaroides	260
CANINIA cornu-horis	285	— gracilis	260
— flexuosa	288	— labyrinthica	260
— gigantea	286	— tubulosa	260
— ibicina	288	CELLASTREA irregularis	225
— patula	286	CENTRASTREA araneola	215
— punctata	287	— arborescens	216
— sulcata	289	— Bayardi	216
CARYOPHYLLIA affinis	305	— cenomana	221
— altavillensis	100	— cistella	215
— annularis	142	— collinaria	200
— arcuata	79	— communis	217
— articulosa	136	— concinna	217
— Basteroti	122	— conica	216
— Bowerbancki	79	— Ermanni	218
— Bredai	79	— excavata	200
— calicularis	303	— frondescens	218
— Calvimontis	115	— gibbosa	218
— cenomana	104	— Goldfussi	215
— centralis	103	— Dumosa	216
— clavus	112	— gracilis	217
— clavus	78	— granulata	263
— cæspitosa	305	— Haimei	217
— cornicula	287	— Haueri	218
— cornuta	120	— index	217
— cylindracea	79	— irregularis	222
— cylindrica	79	— lamellosa	216
— Deshayésiaca	156	— mammosa	218
— Debeyana	79	— michelinia	215

CENTRASTREA	M'Coyi	217	CHÆTETES	<i>subfibrosus</i>	275
—	<i>microconos</i>	219	—	Tasmaniensis	275
—	<i>microphyllia</i>	222	—	Torrubiæ	273
—	<i>microphyllia</i>	200	—	Trigeri	275
—	<i>minima</i>	218	—	tuberculatus	275
—	Meriana	216	—	tumidus	274
—	<i>oculata</i>	230	CHONAXIS	Verneuli	317
—	portlandica	218	CHONOPHYLLUM	elongatum	301
—	punctata	216	—	perfoliatum	301
—	radiata	222	CHORISASTREA	alpina	164
—	Waltoni	217	—	Bertrandi	163
CERATOTROCHUS	duodecim costatus	94	—	corallina	163
—	exaratus	94	—	plicata	163
—	multiserialis	94	CIRCOPHYLLIA	truncata	322
—	multispinosus	94	—	vertebralis	123
CERIOPORA	<i>affinis</i>	273	CLADANGIA	crassi-ramosa	322
—	<i>Boloniensis</i>	273	—	perforata	823
—	<i>dubia</i>	275	—	semispherica	882
—	<i>Goldfussi</i>	273	—	Turonensis	238
—	<i>inflata</i>	274	—	<i>antiqua</i>	305
—	<i>irregularis</i>	247	—	<i>cæspitosa</i>	305
—	<i>tumida</i>	274	—	<i>cæspitosa</i>	150
CHÆTETES	Bowerbancki	274	—	<i>duplicata</i>	307
—	<i>capillaris</i>	266	—	<i>fasciculata</i>	305
—	crassus	274	—	<i>Goldfussi</i>	303
—	crinitus	275	—	granulosa	150
—	<i>cylindricus</i>	274	—	humilis	150
—	Dalii	273	—	intricata	150
—	<i>dilatatus</i>	274	—	<i>irregularis</i>	305
—	dubius	275	—	manipulata	150
—	<i>excentricus</i>	274	—	Michelottii	150
—	filiata	275	—	multicaulis	150
—	Fletcheri	274	—	Prevostana	150
—	frondosus	274	—	Reussi	150
—	Goldfussi	273	—	<i>sexdecimalis</i>	304
—	hemisphericus	275	—	Simonyi	150
—	Heterosolen	275	—	<i>sulcata</i>	302
—	informis	275	—	tenuis	150
—	jubatus	274	CLADOCORA	manipulata	137
—	Koninkii	274	CLADOPHYLLIA	articulata	145
—	lycoperdon	296	—	<i>Babeauana</i>	
—	<i>lycoperdon</i>	295	—	Babeaui	145
—	mammulatus	274	—	Clemencia	146
—	milleporaceus	274	—	Conybearei	145
—	ovata	274	—	dichotoma	145
—	ovatus	275	—	funiculus	145
—	Panderi	275	—	furcata	145
—	pavonia	274	—	gracilis	145
—	petropolitanus	275	—	Humberti	146
—	polymorpha	275	—	Klipsteini	145
—	pulchellus	274	—	lævis	145
—	<i>radians</i>	274	—	lombricalis	146
—	<i>radians</i>	274	—	nana	146
—	ramosus	273	—	Picteti	145
—	<i>repens</i>	266	—	<i>stellariæformis</i>	149
—	<i>rugosus</i>	275	—	sublævis	145
—	rugosus	273	CLAUSASTREA	consobrina	281
—	septosus	266	—	costata	281
—	subantiqua	276	—	dubia	281
			—	Edwardsi	381

CLAUSASTREA limitata	281	CONFUSASTREA Cottellana	210
— parva	281	— Cotteaui	210
— Savignyi	336	— crassa	227
— tessellata	236	— cupulina	210
— tessellata	281	— excavata	231
CLISIOPHYLLUM Danaanum	299	— inæqualis	210
— Danai	299	— leptophyllia	210
— coniseptum	298	— Mosensis	229
— costatum	299	— rustica	210
— fungites	268	— subburgundiæ	210
— Hisingeri	298	— Thevenini	211
— Keyserlingi	299	CONOCYATHUS sulcatus	77
— Konincki	298	CONOPHYLLIA pygmea	113
— striatum	299	CONOSTEGITES Clappi	278
— turbinatum	298	CONSTELLARIA antheloidea	272
— bipartitum	299	CONVEXASTREA dendroidea	195
— Bowerbancki	299	— ornata	195
CÆLOSMILIA atlantica	102	— portlandica	195
— Edwardsi	102	— regularis	195
— excavata	102	— sexradiata	195
— Faujasi	102	— Waltoni	195
— laxa	102	CORAL ALLIED TO ISIS	322
— radicata	102	CORALLIUM alternans	322
— sulcata	169	— articulatum	321
— punctata	102	— Becki	322
CÆNITES clathratus	277	— Gothlandicum	267
— escharoides	277	— pallidum	322
— fruticosus	277	— rubrum	322
— intertextus	277	COSCINOPORA placenta	262
— Juniperinus	277	CRYPTANGIA cariosa	152
— labrosus	277	— parasita	152
— linearis	277	— Woodi	152
— punctatus	277	CRYPTOCGENIA alveolata	279
COLUMELLASTREA striata	194	— antiqua	199
COLUMNARIA alveolata	280	— antiqua	279
— floriformis	316	— Arcensis	199
— Gothlandica	280	— arduennensis	192
— laxa	272	— Baugieri	192
— lævis	315	— brevis	199
— stellaris	306	— Carantoniana	192
— striata	314	— Claudiensis	198
— sulcata	309	— decupla	222
— sulcata	307	— excavata	279
— Troostii	316	— Fleuriensis	192
COLUMNASTREA Prevostana	194	— hexaphyllia	188
— sexradiata	237	— Icaunensis	199
— similis	194	— limbata	193
— striata	194	— limbata	188
COMBOPHYLLUM Leonense	285	— Lucensis	199
— Osismorum	285	— neocomiensis	199
COMOPHYLLIA Cottaldina	163	— ornata	195
— Meriani	163	— Pratti	199
COMOSERIS Bajociensis	170	— radicensis	187
— irradians	170	— rustica	192
— mæandrinoides	170	— sparsa	197
COMPUND madreporite	261	— subregularis	192
COMPLEXASTREA Burgundiæ	210	CYATHINA Bowerbancki	19
CONFUSASTREA Burgundiæ	210	— cyathus	78
— corallina	210	— cylindricea	79
— Cottaldina	210	— Guadualpensis	79

CYATHINA	<i>Konincki</i>	79	CYATHOPHYLLUM	<i>expansum</i>	297
—	<i>lævigata</i>	79	—	<i>fasciculus</i>	303
—	<i>spendoturbinolia</i>	78	—	<i>flexuosum</i>	303
—	<i>turbinata</i>	78	—	<i>flexuosum</i>	300
—	<i>vertebrata</i>	122	—	<i>flexuosum</i>	295
CYATHOPHORA	<i>alveolata</i>	279	—	<i>floriforme</i>	316
—	<i>antiqua</i>	199	—	<i>fungiles</i>	298
—	<i>antiqua</i>	279	—	<i>fungiles</i>	293
—	<i>Bourgeti</i>	279	—	<i>galea</i>	298
—	<i>Claudiensis</i>	198	—	<i>Goldfussi</i>	295
—	<i>corallina</i>	279	—	<i>gracile</i>	145
—	<i>elegans</i>	307	—	<i>grande</i>	294
—	<i>excavata</i>	279	—	<i>granulatum</i>	145
—	<i>icaunensis</i>	199	—	<i>granulatum</i>	120
—	<i>Lucensis</i>	199	—	<i>Haimei</i>	297
—	<i>neocomiensis</i>	199	—	<i>helianthoides</i>	309
—	<i>Pratti</i>	199	—	<i>helianthoides</i>	297
—	<i>Richardi</i>	279	—	<i>Hennahi</i>	308
CYATHOPHYLLUM	<i>acuminatum</i>	298	—	<i>heterophyllum</i>	296
—	<i>Ammonis</i>	287	—	<i>hexagonum</i>	309
—	<i>ananas</i>	311	—	<i>hypocrateriforme</i>	309
—	<i>angustum</i>	295	—	<i>hypocrateriforme</i>	297
—	<i>arietinum</i>	298	—	<i>ibicinum</i>	298
—	<i>articulatum</i>	302	—	<i>incrustatum</i>	298
—	<i>astrea</i>	316	—	<i>Kulorga</i>	298
—	<i>basaltiforme</i>	314	—	<i>Kutorgai</i>	298
—	<i>binum</i>	297	—	<i>Lacazii</i>	303
—	<i>Boloniense</i>	309	—	<i>lamellosum</i>	282
—	<i>Bouchardi</i>	295	—	<i>Lesueri</i>	296
—	<i>Bucklandi</i>	298	—	<i>lituoides</i>	298
—	<i>Burtini</i>	303	—	<i>Lærsi</i>	303
—	<i>celticum</i>	297	—	<i>Loveni</i>	295
—	<i>ceratites</i>	294	—	<i>maetra</i>	81
—	<i>ceratites</i>	289	—	<i>marginatum</i>	296
—	<i>ceratites</i>	285	—	<i>Marmini</i>	310
—	<i>ceratites</i>	296	—	<i>Marmini</i>	303
—	<i>cæspitosum</i>	303	—	<i>Michelini</i>	295
—	<i>cæspitosum</i>	302	—	<i>mitratum</i>	290
—	<i>conicum</i>	287	—	<i>mitratum</i>	288
—	<i>compositum</i>	214	—	<i>mitratum</i>	285
—	<i>coniseptum</i>	298	—	<i>mitratum</i>	284
—	<i>corniculum</i>	298	—	<i>multiplex</i>	296
—	<i>crenulare</i>	309	—	<i>Murchisoni</i>	296
—	<i>cylindricum</i>	282	—	<i>æquisseptatum</i>	303
—	<i>Damnoniense</i>	296	—	<i>obsoletum</i>	298
—	<i>Davidsoni</i>	310	—	<i>obtortum</i>	295
—	<i>Decheni</i>	295	—	<i>papillatum</i>	316
—	<i>Dianthoides</i>	303	—	<i>pauciradiatum</i>	297
—	<i>Dianthus</i>	311	—	<i>paracida</i>	301
—	<i>Dianthus</i>	310	—	<i>pentagonum</i>	313
—	<i>Dianthus</i>	302	—	<i>placentiforme</i>	282
—	<i>Dianthus</i>	295	—	<i>plicatum</i>	298
—	<i>dilatatum</i>	287	—	<i>plicatum</i>	288
—	<i>discus</i>	298	—	<i>primævum</i>	298
—	<i>distortum</i>	297	—	<i>priscum</i>	300
—	<i>Eifeliense</i>	289	—	<i>profundum</i>	309
—	<i>Englypticum</i>	310	—	<i>profundum</i>	203
—	<i>excentricum</i>	295	—	<i>profundum</i>	284
—	<i>expansum</i>	316	—	<i>prolapsum</i>	293
—	<i>explanatum</i>	298	—	<i>pseudo-ceratites</i>	296

CYATHOPHYLLUM <i>quadrigenum</i>	309	CYCLOLITES <i>gigantea</i>	126
— <i>radicans</i>	303	— <i>granulatus</i>	109
— <i>radicatum</i>	283	— <i>Guettardi</i>	125
— <i>radiciforme</i>	113	— <i>Haueri</i>	125
— <i>rectum</i>	296	— <i>Hauerana</i>	125
— <i>regium</i>	309	— <i>hemispherica</i>	124
— <i>Rœmeri</i>	295	— <i>lavis</i>	124
— <i>rugosum</i>	310	— <i>Langi</i>	120
— <i>Shumardi</i>	296	— <i>Ligeriensis</i>	126
— <i>Sedwicki</i>	310	— <i>macrostoma</i>	125
— <i>simplex</i>	297	— <i>Martiniana</i>	126
— <i>Stutchburyi</i>	207	— <i>Niciensis</i>	127
— <i>spseudovermiculare</i>	303	— <i>numismalis</i>	125
— <i>Steiningeri</i>	302	— <i>numulus</i>	126
— <i>stellare</i>	313	— <i>orbitolites</i>	110
— <i>strombodes</i>	313	— <i>placenta</i>	124
— <i>subdianthus</i>	302	— <i>polymorpha</i>	125
— <i>sublave</i>	145	— <i>praecula</i>	126
— <i>subturbatum</i>	294	— <i>rugosa</i>	125
— <i>tintinnabulum</i>	81	— <i>scutellum</i>	125
— <i>truncatum</i>	302	— <i>semiglobosa</i>	127
— <i>turbatum</i>	294	— <i>semiradiata</i>	125
— <i>turbatum</i>	294	— <i>stelliferus</i>	239
— <i>turbatum</i>	293	— <i>undulata</i>	125
— <i>Vanuxemi</i>	298	— <i>variolata</i>	126
— <i>vermiculare</i>	302	CYCLOSERIS <i>andianensis</i>	127
— <i>vermiculare</i>	295	— <i>cenomanensis</i>	127
— <i>vesiculosum</i>	282	— <i>filamentosa</i>	127
— <i>Wrighti</i>	296	— <i>lenticularis</i>	127
— <i>zig-zag</i>	298	— <i>Niciensis</i>	127
CYATHOPORA <i>Iowensis</i>	319	— <i>Pezei</i>	127
CYATOPSIS <i>cornu-bovis</i>	285	— <i>provincialis</i>	127
CYATHOSERIS <i>Haidingeri</i>	240	— <i>semiglobosa</i>	127
— <i>infundibuliformis</i>	240	CYCLOSMILIA <i>atlantica</i>	102
— <i>raristellata</i>	241	— <i>elongata</i>	103
— <i>Valmondoisiaca</i>	240	— <i>Fanjasi</i>	102
CYATHOXONIA <i>conisepta</i>	298	— <i>Gravesii</i>	103
— <i>costata</i>	299	— <i>punctata</i>	102
— <i>plicata</i>	701	— <i>rudis</i>	103
— <i>spinosa</i>	285	CYLICOPORA <i>fasciculata</i>	213
— <i>striata</i>	299	CYLICOSMILIA <i>Altavillensis</i>	100
CYCLOCÆNIA <i>explanata</i>	183	CYSTIPHYLLUM <i>americanum</i>	282
— <i>rustica</i>	182	— <i>cylindricum</i>	282
CYCLOCYATHUS <i>Fittoni</i>	80	— <i>excavatum</i>	296
CYCLOLITES <i>andianensis</i>	127	— <i>excavatum</i>	283
— <i>assilina</i>	126	— <i>Grayi</i>	282
— <i>Borsoni</i>	126	— <i>impunctum</i>	283
— <i>Borsonis</i>	187	— <i>obliquum</i>	296
— <i>cancellata</i>	125	— <i>secundum</i>	282
— <i>carcarensis</i>	109	— <i>siluriense</i>	294
— <i>Corbieraca</i>	124	— <i>siluriense</i>	283
— <i>crisata</i>	166	— <i>vermiculare</i>	295
— <i>deformis</i>	112	— <i>vesiculosum</i>	282
— <i>depressa</i>	125		
— <i>discoidea</i>	125	D.	
— <i>discoidea</i>	125	DACTILASTREA <i>subramosa</i>	214
— <i>elegans</i>	126	— <i>subramosa</i>	254
— <i>elliptica</i>	124	DACTYLOCÆNIA <i>digitata</i>	220
— <i>Eturbensis</i>	126	DACTYLOSMILIA <i>Carantonensis</i>	137
— <i>Eudesii</i>	80	— <i>cenomanensis</i>	137

DANIA Huronica	273	DIMORPHASTRÆA stricta	224
DASMIA neocomiensis	77	— sulcosa	225
— Sowerbyi	77	DIMORPHOCÆNIA corallina	201
DASYPHYLLIA Michelotti	134	— crassisepta	200
— Taurinensis	134	DIPHYPHYLLUM affine	305
DECACÆNIA <i>magnifica</i>	191	— annulatum	306
DEKAYA aspera	276	— antiquum	305
DELTOCYATHUS italicus	81	— <i>cæspitosum</i>	303
DENDRACIS Gervillii	250	— concameratum	306
DENDRAREA racemosa	254	— concinnum	306
DENDRASTREA dissimilis	230	— decipiens	306
— <i>Langrunensis</i>	238	— Edwardsi	304
DENDROCÆNIA corallina	193	— fasciculatum	305
— <i>sertifera</i>	187	— flexuosum	303
DENDROGYRA Arcensis	158	— Harmodites	305
— <i>elegans</i>	158	— irregulare	305
— <i>æquicostata</i>	158	— Junceum	304
— <i>rastellina</i>	157	— <i>latiseptatum</i>	306
DENDROPHYLLIA amica	246	— <i>longiconicum</i>	305
— <i>coringera</i>	246	— pauciradiale	305
— <i>dendrophylloides</i>	246	— Phillipsi	305
— <i>digitalis</i>	246	— <i>sexdecimale</i>	304
— <i>irregularis</i>	247	— <i>sociale</i>	305
— <i>irregularis</i>	246	— stellare	306
— <i>Parisiensis</i>	246	— Stokesi	305
— <i>romea</i>	246	DIPLOCÆNIA clathrata	184
— <i>Taurinensis</i>	246	— corallina	183
— <i>Theotoldovensis</i>	247	— lobata	184
DENDROPORA explicata	265	— minima	184
— <i>megastoma</i>	265	— mirabilis	183
DENDROSMILIA Duvalana	147	— stellata	184
DENTIPORA coalescens	192	DIPLOCTENIUM contortum	96
— <i>glomerata</i>	191	— cordatum	96
DESMOPHYLLUM	77	— <i>cordatum</i>	95
— <i>Taurinense</i>	95	— conjungens	96
DIANULITES <i>pyriformis</i>	275	— ferrum equinum	96
DIBLASTUS Grevenensis	176	— <i>Goldfussanum</i>	95
DICHOCÆNIA distans	182	— Haidingeri	96
DACTYLACIS provincialis	263	— lamellosum	96
— <i>ramosa</i>	262	— lunatum	95
— <i>subramosa</i>	263	— Matheroni	96
DICTYOPHYLLIA antiqua	271	— pavonium	96
— <i>reticulata</i>	256	— pluma	95
DIMORPHARÆA convexa	254	— subcirculare	96
— <i>Kœchlini</i>	254	DIPLOHELIA multistellata	131
DIMORPHASTRÆA alternata	225	— papillosa	131
— bellula	224	— raristellata	131
— corallina	244	— reflexa	131
— <i>crassi-septa</i>	200	DIPLORIA crassi-lamellosa	168
— <i>cupuliformis</i>	223	— <i>Neptuni</i>	169
— dubia	224	DISARÆA Cotteaui	245
— escharoides	225	— <i>gracilis</i>	245
— excavata	224	DISCOCYATHUS Eudesi	80
— excelsa	224	DISCOPHYLLUM <i>helianthoides</i>	297
— explanata	224	— <i>lenticulatum</i>	126
— <i>fungiformis</i>	213	— <i>Leonense</i>	285
— <i>glomerata</i>	221	— <i>præacutum</i>	126
— grandiflora	224	— <i>pellatum</i>	298
— <i>Haueri</i>	218	DISCOPORA squammata	274
— Ludovicana	225	DISCOSPAMMIA Boverbanki	242

DISCOSPAMMIA <i>suecica</i>	242	ENALLOHELIA <i>gracilis</i>	130
DISCOTROCHUS <i>Michelottii</i>	93	— <i>gracilis</i>	130
— <i>Orbignyianus</i>	93	— <i>jurensis</i>	130
DISPHYLLUM <i>articulatum</i>	302	— <i>minima</i>	130
— <i>caliculare</i>	383	— <i>Rathieri</i>	130
— <i>cæspitosum</i>	302	ENALLOCCENIA <i>crasso-ramosa</i>	234
— <i>dianthoides</i>	303	ENDOPACHYS	93
— <i>dianthus</i>	302	— <i>Maclurii</i>	243
— <i>duplicatum</i>	303	ENDOPHYLLUM <i>abditum</i>	310
— <i>fasciculus</i>	303	— <i>Bowerbancki</i>	310
— <i>flexuosum</i>	303	— <i>rugosum</i>	304
— <i>Lacazii</i>	303	— <i>strictum</i>	304
— <i>Michelini</i>	303	— <i>Verneuianum</i>	304
— <i>æquiseptatum</i>	303	— <i>Verneuili</i>	304
— <i>paracida</i>	303	EPISERIS <i>macrostoma</i>	125
— <i>profundum</i>	303	EPISMILIA <i>excavata</i>	105
— <i>radicans</i>	303	— <i>excelsa</i>	185
— <i>speudovermiculare</i>	303	— <i>Haimei</i>	105
— <i>Steiningeri</i>	302	ERISMATOLITHUS <i>madreporites</i>	316
— <i>truncatum</i>	302	— <i>madreporites</i>	
DISTICOPORA <i>antiqua</i>	320	— <i>duplicatus</i>	307
DONACOSMILIA <i>corallina</i>	146	— <i>tubiporites</i>	315
— <i>Cotteaui</i>	147	EUGYRA <i>Cotteaui</i>	154
E.			
ELASMOCCENIA <i>explanata</i>	183	— <i>neocomiensis</i>	154
— <i>Michelini</i>	183	EUHELIA <i>Claudiensis</i>	129
ELLIPSOXYATHUS <i>bicostatus</i>	291	— <i>gemmata</i>	129
ELLIPSOSMILIA <i>arcotensis</i>	99	EUNOMIA <i>Babeana</i>	144
— <i>Boissiana</i>	99	— <i>confluens</i>	163
— <i>Bourgeoisii</i>	100	— <i>Cottaldina</i>	137
— <i>carantonensis</i>	100	— <i>dichotoma</i>	145
— <i>cuneolus</i>	97	— <i>flabella</i>	136
— <i>excavata</i>	105	— <i>gracilis</i>	145
— <i>excelsa</i>	105	— <i>nodosa</i>	139
— <i>humilis</i>	120	— <i>plicata</i>	163
— <i>inæqualis</i>	174	— <i>radiata</i>	136
— <i>inæqualis</i>	119	— <i>rugosa</i>	145
— <i>Mendonensis</i>	100	— <i>sublævis</i>	145
— <i>obliqua</i>	100	EUPHYLLIA <i>sinuosa</i>	164
— <i>ornata</i>	174	EUPSAMMIA <i>Bayliana</i>	243
— <i>plicata</i>	117	— <i>Brongnarti</i>	243
— <i>regularis</i>	174	— <i>Brongnartina</i>	243
— <i>Saltzburgiana</i>	97	— <i>Burtini</i>	243
— <i>subrudis</i>	99	— <i>Haleana</i>	243
— <i>supracretacea</i>	100	— <i>Sismondiana</i>	243
— <i>uricornis</i>	98	— <i>Sismondii</i>	243
EMMONSIA <i>alternans</i>	270	— <i>trochiformis</i>	243
— <i>cylindrica</i>	270	EXPLANARIA <i>alveolaris</i>	239
— <i>hemispherica</i>	270	— <i>astroites</i>	208
ENALLHELIA <i>compressa</i>	129	— <i>crassa</i>	288
— <i>gemmata</i>	129	— <i>fleurosa</i>	219
ENALLOHELIA <i>compressa</i>	129	— <i>lobata</i>	191
— <i>corallina</i>	130	— <i>tenera</i>	208
— <i>crassa</i>	130	F.	
— <i>cutigera</i>	130	FAVASTREA <i>alveolata</i>	309
— <i>decaphyllia</i>	130	— <i>aranea</i>	225
— <i>elegans</i>	130	— <i>baltica</i>	312
— <i>elongata</i>	130	— <i>Helianthoidea</i>	309
		— <i>helianthoides</i>	230
		— <i>hexagona</i>	309

FAVASTREA <i>hypocrateriformis</i>	309	FAVOSITES <i>petropolitanus</i>	275
— <i>intercellulosa</i>	311	— <i>polymorpha</i>	268
— <i>pentagona</i>	311	— <i>polymorpha</i>	275
— <i>quadrigemina</i>	309	— <i>quadrigeminata</i>	309
— <i>regia</i>	309	— <i>reticulata</i>	269
— <i>rugosa</i>	310	— <i>semiglobosa</i>	269
— <i>striata</i>	313	— <i>septosus</i>	266
— <i>sulcata</i>	309	— <i>subbasaltica</i>	267
FAVIA <i>abbreviata</i>	172	— <i>suborbicularis</i>	266
— <i>caryophylloides</i>	173	— <i>tenuisepta</i>	271
— <i>Claudiensis</i>	173	— <i>triangularis</i>	269
— <i>conferta</i>	173	— <i>Troosti</i>	268
— <i>corallina</i>	172	— <i>tumidis</i>	274
— <i>Cotteaui</i>	172	— <i>uncinata</i>	269
— <i>flexuosa</i>	174	FISTULIPORA <i>Lonsdalei</i>	264
— <i>Gervillei</i>	173	— <i>major</i>	264
— <i>gratissima</i>	173	— <i>minor</i>	264
— <i>gyrosa</i>	173	FLABELLUM <i>acutum</i>	89
— <i>Haimei</i>	172	— <i>alata</i>	88
— <i>hemispherica</i>	172	— <i>appendiculatum</i>	90
— <i>irregularis</i>	173	— <i>appendiculatum</i>	89
— <i>jurensis</i>	174	— <i>asperum</i>	90
— <i>kimmeridgiensis</i>	172	— <i>avicula</i>	88
— <i>Michellini</i>	173	— <i>Basteroti</i>	88
— <i>plana</i>	172	— <i>Bellardi</i>	89
— <i>Nantuacensis</i>	173	— <i>costatum</i>	89
— <i>stricta</i>	173	— <i>cuneatum</i>	90
— <i>turbinata</i>	172	— <i>cuneatum</i>	89
— <i>Valfinensis</i>	173	— <i>cuneiforme</i>	89
FAVOSITES <i>alcyon</i>	268	— <i>cristatum</i>	00
— <i>alveolaris</i>	268	— <i>Dufrenoyi</i>	89
— <i>alveolaris</i>	267	— <i>extensum</i>	88
— <i>alveolata</i>	271	— <i>Gallapagense</i>	90
— <i>aspera</i>	268	— <i>Hohei</i>	89
— <i>basaltica</i>	268	— <i>inornatum</i>	90
— <i>capillaris</i>	266	— <i>intermedium</i>	88
— <i>celleporatus</i>	269	— <i>laciniatum</i>	90
— <i>cervicornis</i>	269	— <i>majus</i>	90
— <i>cristata</i>	269	— <i>Michellini</i>	90
— <i>cronigera</i>	269	— <i>pyrenaicum</i>	84
— <i>cylindrica</i>	270	— <i>Rœmeri</i>	91
— <i>dentifera</i>	269	— <i>Roissyanum</i>	89
— <i>depressa</i>	266	— <i>Siciliense</i>	89
— <i>dubia</i>	269	— <i>sinense</i>	90
— <i>favosa</i>	267	— <i>stellatissima</i>	88
— <i>fibrosa</i>	268	— <i>striatum</i>	136
— <i>Forbesi</i>	268	— <i>subturbinatum</i>	90
— <i>Goldfussi</i>	268	— <i>turgidum</i>	90
— <i>Gothlandica</i>	267	— <i>vaginale</i>	89
— <i>Gothlandica</i>	268	— <i>Woodi</i>	90
— <i>grandis</i>	271	FLETCHERIA <i>annulata</i>	259
— <i>hemispherica</i>	270	— <i>tubulifera</i>	259
— <i>Hisingeri</i>	268	FLOSCULARIA <i>luxurians</i>	311
— <i>incrustans</i>	269	FUNGIA <i>agaricoides</i>	242
— <i>mamillaris</i>	268	— <i>cancellata</i>	125
— <i>megastoma</i>	271	— <i>coranula</i>	123
— <i>mitralis</i>	269	— <i>discoidea</i>	125
— <i>multipora</i>	268	— <i>elegans</i>	242
— <i>Orbignyana</i>	269	— <i>filamentosa</i>	127
— <i>parasitica</i>	269	— <i>Japheti</i>	118

FUNGIA <i>lævis</i>	123-124	HALYSITES <i>agglomerata</i>	260
— <i>lunata</i>	95	— <i>attenuata</i>	260
— <i>orbulites</i>	124	— <i>catenularia</i>	260
— <i>orbulites</i>	123	— <i>dirhotoma</i>	260
— <i>polymorpha</i>	125	— <i>labyrinthica</i>	260
— <i>radiata</i>	125	— <i>macrostoma</i>	260
— <i>semilunata</i>	95	— <i>stenostoma</i>	260
— <i>semilunata</i>	90	HARMODITES <i>bifurcata</i>	257
— <i>stellifera</i>	239	— <i>Bouchardi</i>	278
— <i>undulata</i>	125	— <i>cancellatus</i>	257
FUNGINELLA <i>assilina</i>	126	— <i>catenatus</i>	257
— <i>discoidea</i>	125	— <i>cæspitosa</i>	258
— <i>elegans</i>	126	— <i>confertus</i>	258
— <i>flavescens</i>	125	— <i>confusa</i>	257
— <i>hemispherica</i>	124	— <i>distans</i>	257
— <i>Martiniana</i>	126	— <i>elegans</i>	257
— <i>Niciensis</i>	127	— <i>fascicularis</i>	258
— <i>numismalis</i>	126	— <i>geniculata</i>	258
— <i>Perezi</i>	127	— <i>parallela</i>	257
— <i>semiglobosa</i>	127	— <i>parallelus</i>	257
— <i>patellatus</i>	300	— <i>radians</i>	257
G.		— <i>ramosa</i>	257
GEMMIPORA <i>asprima</i>	250	— <i>ramulosus</i>	257
— <i>cyathiformis</i>	249	— <i>rugosa</i>	259
GENABACIA <i>Sancti-Mihieli</i>	239	— <i>stolonifera</i>	257
— <i>stellifera</i>	239	— <i>strues</i>	258
GEODIA <i>pyriformis</i>	261	— <i>verticillata</i>	258
GEOPORITES <i>Americana</i>	278	HELIASTREA <i>Barandei</i>	206
— <i>Boloniensis</i>	278	— <i>Beaudouini</i>	206
— <i>intermedia</i>	261	— <i>corallina</i>	207
— <i>interstincta</i>	261	— <i>corollaris</i>	206
— <i>Lonsdalei</i>	261	— <i>cribraria</i>	206
— <i>Phillipsi</i>	262	— <i>Defrancei</i>	207
— <i>placenta</i>	262	— <i>Delerosana</i>	209
— <i>porosa</i>	262	— <i>Edwardsi</i>	208
— <i>pyriforme</i>	261	— <i>Ellisana</i>	208
GONIASTREA <i>formosissima</i>	174	— <i>Ellisi</i>	208
— <i>numisma</i>	232	— <i>exsculpta</i>	209
— <i>Sedgwickana</i>	174	— <i>Francqana</i>	207
GONIOCORA <i>crassa</i>	149	— <i>Guetardi</i>	206
— <i>elongata</i>	149	— <i>lepida</i>	208
— <i>gemmata</i>	148	— <i>Lifolensis</i>	207
— <i>Haimeii</i>	149	— <i>Lævicostata</i>	207
— <i>kimmeridgiensis</i>	149	— <i>Neocomiensis</i>	207
— <i>socialis</i>	148	— <i>Pereziana</i>	209
— <i>stellariæformis</i>	149	— <i>plana</i>	208
— <i>verticillata</i>	149	— <i>Prevostana</i>	209
GONOPHYLLUM <i>Fletcheri</i>	293	— <i>Prevosti</i>	209
— <i>pyramidale</i>	293	— <i>putealis</i>	208
GYROPHYLLIA <i>cerebriiformis</i>	165	— <i>Raulini</i>	208
GYROSERIS <i>patellaris</i>	129	— <i>Reussana</i>	208
GYROSMILIA <i>Edwardsi</i>	143	— <i>Reussi</i>	208
H.		— <i>Riemsdycki</i>	206
HADROPHYLLUM <i>Orbigny</i>	292	— <i>Rochetteana</i>	207
— <i>pauciradiatum</i>	292	— <i>Rochettei</i>	207
HALLIA <i>insignis</i>	291	— <i>rotulata</i>	209
— <i>Pengillyi</i>	291	— <i>Royanensis</i>	209
— <i>plicata</i>	291	— <i>Salisburgiensis</i>	209
		— <i>Simonyi</i>	207
		— <i>stylinoides</i>	209

HELIASTREA	sulcati-lamellosa	208	ISASTREA	crassa	227
—	terminaria	208	—	Burgundiæ	231
—	vesiculosa	207	—	dictyophora	229
—	vesparia	208	—	dispar	175
HELIOCÆNIA	dendroidea	193	—	dissimilis	230
—	Humberti	193	—	Eturbensis	228
—	Thiollieri	193	—	explanata	228
—	variabilis	193	—	explanulata	229
HELIOLITES	Grayi	261	—	foliacea	230
—	inordinata	261	—	Greenoughi	227
—	interstincta	261	—	Goldfussana	227
—	magastoma	261	—	Gourdani	228
—	Murchisoni	261	—	Guettardana	230
—	placenta	262	—	Guettardi	230
—	porosa	262	—	Haidingeri	226
—	vermiculosa	262	—	helianthoides	229
HELIOPHYLLUM	Halli	299	—	Hencœquei	228
HELIOPORA	Blainvilliana	262	—	Hærnesi	227
—	deformis	249	—	jurensis	228
—	pyriformis	262	—	Kœchlini	226
HETEROCÆNIA	conferta	181	—	lamellosissima	226
—	crassa	182	—	Langruncensis	230
—	crassi-lamellata	181	—	latistellata	227
—	dendroides	182	—	limitata	229
—	distans	182	—	Lonsdalei	227
—	exigua	181	—	Lotharinga	162
—	grandis	181	—	Luciensis	229
—	humilis	182	—	magna	227
—	minima	182	—	Martini	231
—	provincialis	182	—	Michelini	230
—	Reussi	182	—	microcoma	234
—	verrucosa	182	—	moneta	229
HETEROPHYLLIA	grandis	319	—	mosensis	229
—	ornata	319	—	morchella	226
HIPPURITES	mitratus	269	—	Munsterana	227
HOLARÆA	Pariensis	251	—	Munsteri	227
Holocænia	arachnoides	200	—	neocomiensis	228
—	collinaria	200	—	oblonga	229
—	dendroidea	200	—	Orbigny	229
—	explanata	200	—	ornata	229
—	micrantha	200	—	parva	228
HOLOCYSTIS	Dupini	308	—	perforata	228
—	elegans	307	—	polygonalis	227
HYDNOPHORA	ataciana	170	—	Portlandica	230
—	Bronni	169	—	profunda	226
—	cyclostoma	263	—	punctata	235
—	mæandrinoides	169	—	Reussana	227
—	multilamellosa	168	—	Reussi	227
—	styriaca	169	—	Richardsoni	230
HYMENOPHYLLIA	corallina	141	—	salinaria	231
—	Haueri	141	—	serialis	227
			—	tenera	230
			—	tenuistriata	226
			—	venusta	230
I.			ISIS	corallina	321
ISASTREA	alimena	229	—	melitensis	321
—	angulosa	228	—	spiralis	321
—	Bernardana	227			
—	Bernardi	227			
—	condeana	229			
—	Conybearei	228			
			K.		
			KONINCKIA	fragilis	270

L.		LATIMEANDRA	
LABECHIA	conferta 276	—	<i>pticata</i> 162
LAMELLOPORA	<i>infundibularia</i> 313	—	<i>Rastelliniiformis</i> 163
LASMOCYATHUS	<i>aranea</i> 314	—	<i>Raulini</i> 160
LASMOGYRA	<i>occitanica</i> 155	—	<i>sequana</i> 162
LASMOPHYLLIA	<i>corniculum</i> 97	—	<i>Sæmmeringi</i> 159
—	<i>dilatata</i> 116	—	<i>stellata</i> 159
—	<i>dispar</i> 117	—	<i>sulcata</i> 160
—	<i>icaunensis</i> 120	—	<i>tenuisepta</i> 160
—	<i>lobata</i> 143	—	<i>undans</i> 161
—	<i>Maureausiaca</i> 112	—	<i>variabilis</i> 161
—	<i>paleriformis</i> 119	LATIMEANDRAREA	<i>cerebriformis</i> 248
—	<i>patula</i> 99	—	<i>corallina</i> 247
—	<i>radicensis</i> 116	—	<i>Cotteaui</i> 248
—	<i>radicensis</i> 111	—	<i>Marconana</i> 248
—	<i>retorta</i> 113	—	<i>sulcata</i> 248
—	<i>subexcavata</i> 119	LATIPHYLLIA	<i>insignis</i> 164
—	<i>subrugosa</i> 117	LATUSASTREA	<i>alveolaris</i> 239
—	<i>subcylindrica</i> 117	LEIOPATHES	<i>vetusta</i> 76
—	<i>subtruncata</i> 118	LEPTOCYATHUS	<i>Atalayensis</i> 80
—	<i>truncata</i> 115	—	<i>elegans</i> 80
—	<i>venusta</i> 117	LEPTOPHYLLIA	<i>Calloviensis</i> 121
LASMOSMILIA	<i>Bajocina</i> 141	—	<i>cenomana</i> 121
—	<i>gracilis</i> 144	—	<i>clavata</i> 121
—	<i>mæandra</i> 164	—	<i>compressa</i> 121
LATIMEANDRA	<i>alpina</i> 164	—	<i>crassa</i> 122
—	<i>angulosa</i> 226	—	<i>depressa</i> 121
—	<i>asperima</i> 160	—	<i>Fromenteli</i> 121
—	<i>astreoides</i> 220	—	<i>irregularis</i> 121
—	<i>ataciana</i> 160	—	<i>Montis</i> 121
—	<i>Bertrandi</i> 163	—	<i>Sæmanni</i> 121
—	<i>Bonjourii</i> 161	—	<i>strangulata</i> 121
—	<i>Brachygyra</i> 160	LEPTORIA	<i>antiqua</i> 167
—	<i>Bronni</i> 161	—	<i>delicatula</i> 167
—	<i>caryophyllata</i> 160	—	<i>Konincki</i> 167
—	<i>celina</i> 161	—	<i>radiata</i> 167
—	<i>circularis</i> 161	—	<i>patellaris</i> 167
—	<i>concentrica</i> 160	—	<i>tenella</i> 167
—	<i>contorta</i> 161	LIMARIA	<i>angularis</i> 277
—	<i>corrugata</i> 159	—	<i>clathrata</i> 277
—	<i>Davidsoni</i> 161	—	<i>escharoides</i> 277
—	<i>dubia</i> 163	—	<i>fruticosa</i> 277
—	<i>Etalloni</i> 161	—	<i>Lonsdalei</i> 272
—	<i>Flemingi</i> 159	—	<i>punctata</i> 277
—	<i>flexuosa</i> 162	LITHARÆA	<i>Ameliana</i> 255
—	<i>flosculus</i> 160	—	<i>bellula</i> 255
—	<i>Gastaldii</i> 159	—	<i>Deshayesi</i> 255
—	<i>gracilis</i> 162	—	<i>Desnoyersi</i> 256
—	<i>Klipsteini</i> 162	—	<i>Gravesi</i> 256
—	<i>lamelli-dentata</i> 161	—	<i>Heberti</i> 255
—	<i>linearis</i> 161	—	<i>ramosa</i> 256
—	<i>Lotharinga</i> 162	—	<i>Websteri</i> 255
—	<i>magnifica</i> 159	LITHODENDRON	<i>annulatum</i> 306
—	<i>mæandra</i> 161	—	<i>articulatum</i> 145
—	<i>mæandrinoïdes</i> 160	—	<i>cariosum</i> 246
—	<i>Michelotii</i> 159	—	<i>coarctatum</i> 304
—	<i>morchella</i> 226	—	<i>cæspitosum</i> 305
—	<i>Pelissieri</i> 160	—	<i>compressum</i> 129
—	<i>Perroni</i> 162	—	<i>concameratum</i> 306
		—	<i>Dianthus</i> 148
		—	<i>dicholomum</i> 145

LITHODENDRON	<i>dichotomum</i>	135	LITHOSTROTION	<i>irregulare</i>	305
—	<i>Edwardsi</i>	138	—	<i>junceum</i>	304
—	<i>elegans</i>	130	—	<i>læve</i>	325
—	<i>eunomia</i>	136	—	<i>Lonsdalei</i>	311
—	<i>exiguum</i>	181	—	<i>major</i>	317
—	<i>fasciculatum</i>	305	—	<i>mamillare</i>	316
—	<i>fiabellum</i>	136	—	<i>mamillare</i>	304
—	<i>flezuosum</i>	150	—	<i>Martini</i>	305
—	<i>funiculus</i>	145	—	<i>microphyllum</i>	314
—	<i>gemmans</i>	151	—	<i>oblongum</i>	229
—	<i>gibbosum</i>	176	—	<i>pauciradiale</i>	305
—	<i>humile</i>	181	—	<i>pentagonum</i>	311
—	<i>humile</i>	150	—	<i>Phillipsi</i>	305
—	<i>intricatum</i>	150	—	<i>Portlocki</i>	314
—	<i>irregulare</i>	305	—	<i>profundum</i>	310
—	<i>irregulare</i>	196	—	<i>quadrigeminum</i>	309
—	<i>junceum</i>	304	—	<i>septosum</i>	315
—	<i>læve</i>	145	—	<i>stellare</i>	306
—	<i>longiconicum</i>	305	—	<i>Stokesi</i>	305
—	<i>manipulatum</i>	150	—	<i>stratum</i>	314
—	<i>Moreausiacum</i>	138	LOBOCENIA	<i>corallina</i>	192
—	<i>Meyeri</i>	176	LOBOPHYLLIA	<i>aspera</i>	132
—	<i>multicaule</i>	150	—	<i>Burignieri</i>	143
—	<i>multistellatum</i>	131	—	<i>contorta</i>	134
—	<i>nanum</i>	146	—	<i>cylindrica</i>	144
—	<i>parasitum</i>	152	—	<i>depressa</i>	143
—	<i>pauciradiale</i>	305	—	<i>Deshayesiaca</i>	156
—	<i>ramulosum</i>	151	—	<i>fiabellum</i>	155
—	<i>sexdecimale</i>	304	—	<i>glomerata</i>	144
—	<i>sociale</i>	305	—	<i>granulosa</i>	210
—	<i>sociale</i>	148	—	<i>incubans</i>	111
—	<i>speudostylina</i>	136	—	<i>labyrinthica</i>	157
—	<i>speudostylina</i>	135	—	<i>lobata</i>	143
—	<i>stellariaciformis</i>	149	—	<i>meandrinoides</i>	166
—	<i>subdichotomum</i>	139	—	<i>Martiniana</i>	155
—	<i>trichotomum</i>	142	—	<i>occitanica</i>	155
—	<i>verticillatum</i>	139	—	<i>Parisiensis</i>	246
—	<i>virgineum</i>	131	—	<i>radicata</i>	102
LITHOPHYLLIA	<i>Basteroti</i>	122	—	<i>coarctata</i>	102
LITHOSTROTION	<i>affine</i>	305	—	<i>semisulcata</i>	132
—	<i>ananas</i>	311	—	<i>turbinata</i>	142
—	<i>antiquum</i>	305	LOBOPSAMMIA	<i>cariosa</i>	246
—	<i>arachnoides</i>	300	LONSDALEIA	<i>Bronni</i>	306
—	<i>arachnoideum</i>	317	—	<i>crassiconis</i>	307
—	<i>aranea</i>	314	—	<i>floriformis</i>	316
—	<i>astroides</i>	316	—	<i>inordinata</i>	261
—	<i>basaltiforme</i>	314	—	<i>papillata</i>	316
—	<i>concameratum</i>	306	—	<i>rugosa</i>	306
—	<i>concinnum</i>	306	LOPHOHELIA	<i>Defrancei</i>	131
—	<i>Coyanum</i>	315	LOPHOPHYLLUM	<i>bicostatum</i>	291
—	<i>Coyi</i>	315	—	<i>Dumonti</i>	290
—	<i>decipiens</i>	306	—	<i>Konincki</i>	290
—	<i>Derbyense</i>	315	LOPHOSMILIA	<i>cenomana</i>	104
—	<i>emarciatum</i>	316	LYELLIA	<i>Americana</i>	264
—	<i>Ensifer</i>	314	—	<i>glabra</i>	264
—	<i>Flemingi</i>	318			
—	<i>floriforme</i>	316			
—	<i>Harmodites</i>	304			
—	<i>Hennahi</i>	308			
—	<i>inconfertum</i>	315			

M.

MADREPORA	<i>aggregata</i>	307
—	<i>ananas</i>	312
—	<i>ananas</i>	310

MADREPORA	<i>arachnoides</i>	219	MEANDRINA	<i>pyrenaica</i>	166
—	<i>coalescens</i>	192	—	<i>radiata</i>	168
—	<i>composita</i>	312	—	<i>rastellina</i>	158
—	<i>composita</i>	311	—	<i>Renauxana</i>	178
—	<i>deformis</i>	249	—	<i>Raulini</i>	160
—	<i>excavata</i>	248	—	<i>Salisburgensis</i>	168
—	<i>flexuosa</i>	303	—	<i>salisburgiana</i>	168
—	<i>Gervilii</i>	250	—	<i>Sæmmeringi</i>	159
—	<i>glabra</i>	276	—	<i>stellifera</i>	167
—	<i>interstincta</i>	261	—	<i>tenella</i>	168
—	<i>lavandulina</i>	248	—	<i>tenella</i>	167
—	<i>limbata</i>	193	—	<i>Valmondoisiaca</i>	240
—	<i>organum</i>	316	—	<i>venusta</i>	168
—	<i>ornata</i>	249	—	<i>Lotharinga</i>	162
—	<i>palmata</i>	178	MENOPHYLLUM	<i>tenuimarginatum</i>	292
—	<i>porpita</i>	126	METRIOPHYLLUM	<i>Battersbyi</i>	284
—	<i>simplex</i>	296	—	<i>Bouchardi</i>	284
—	<i>simplex</i>	293	MICRABACIA	<i>coronula</i>	123
—	<i>Solanderi</i>	249	MICHELINIA	<i>antiqua</i>	271
—	<i>stellaris</i>	313	—	<i>compressa</i>	271
—	<i>sublævis</i>	193	—	<i>concinna</i>	271
—	<i>trochiformis</i>	243	—	<i>convexa</i>	271
—	<i>truncata</i>	302	—	<i>corallina</i>	271
—	<i>turbinata</i>	293	—	<i>excelsa</i>	271
MADREPORITES	<i>cristatus</i>	269	—	<i>favosa</i>	271
—	<i>stellaris</i>	313	—	<i>geometrica</i>	271
MANON	<i>farosum</i>	271	—	<i>megastoma</i>	271
MEANDRARÆA	<i>Marcouana</i>	248	—	<i>tenuisepta</i>	271
—	<i>sulcata</i>	248	MICROPHYLLIA	<i>ataciana</i>	160
—	<i>cerebriformis</i>	248	—	<i>contorta</i>	161
MEANDRASTRÆA	<i>arausica</i>	165	—	<i>corrugata</i>	159
—	<i>crassi-septa</i>	165	—	<i>flexuosa</i>	162
—	<i>macroreina</i>	165	—	<i>rastelliniiformis</i>	162
—	<i>reticulata</i>	165	—	<i>Raulini</i>	160
—	<i>circularis</i>	165	—	<i>Sæmmeringi</i>	159
—	<i>speudomeandrina</i>	165	—	<i>undans</i>	161
MEANDRINA	<i>agaricites</i>	169	—	<i>variabilis</i>	161
—	<i>angustata</i>	158	MICROSOLENA	<i>agariciformis</i>	252
—	<i>ambihua</i>	213	—	<i>catenata</i>	253
—	<i>antiqua</i>	167	—	<i>conica</i>	253
—	<i>arausica</i>	165	—	<i>corallina</i>	533
—	<i>ataciana</i>	223	—	<i>excavata</i>	255
—	<i>ataciana</i>	160	—	<i>excelsa</i>	254
—	<i>Bernardana</i>	168	—	<i>expansa</i>	253
—	<i>Bellardii</i>	168	—	<i>gibbosa</i>	231
—	<i>bisinuosa</i>	165	—	<i>grandiflora</i>	252
—	<i>Cotteauana</i>	168	—	<i>granulata</i>	225
—	<i>Edwardsi</i>	170	—	<i>irregularis</i>	225
—	<i>elegans</i>	158	—	<i>irregularis</i>	222
—	<i>Konincki</i>	167	—	<i>pavonia</i>	253
—	<i>labyrinthica</i>	162	—	<i>porosa</i>	252
—	<i>lamello-dentata</i>	161	—	<i>portlandica</i>	253
—	<i>Lotharinga</i>	162	—	<i>pulvinata</i>	252
—	<i>macrocina</i>	165	—	<i>racemosa</i>	254
—	<i>Michelini</i>	168	—	<i>rotata</i>	253
—	<i>montana</i>	166	—	<i>subramosa</i>	254
—	<i>neocomiensis</i>	168	—	<i>tenuiradiata</i>	253
—	<i>Oceani</i>	168	—	<i>tenuistriata</i>	252
—	<i>Phrygia</i>	168	MILLEPORA	<i>Groningana</i>	276
—	<i>profunda</i>	166	—	<i>ramis</i>	267

MILLEPORA repens	266	MONTLIVALTIA gracilis	110
MILLEPORITES repens	319	— gradata	112
— vermiculosa	262	— grandis	119
MONOCARYA centralis	102	— Granti	110
— centralis	103	— granulosa	114
MONTASTREA adamantina	309	— gregaria	144
— Boloniensis	309	— Guerangeri	117
— coniformis	309	— Guettardi	112
— Michelini	230	— Gyensis	115
MONTICULARIA conferta	276	— Haimei	109
— hexagona	309	— hippuritiformis	116
— styriaca	169	— inæqualis	119
— meandrinoides	169	— incubans	111
MONTICULIPORA filiosa	275	— inflata	118
— frondosa	274	— infundibulum	111
— mammulata	274	— irregularis	117
— ramosa	273	— Jacquemonti	115
MONTLIVALTIA acaulis	114	— Japheti	118
— Baumonti	115	— Labechei	109
— bilobata	115	— lens	110
— boletiformis	110	— Lesueuri	118
— Bormidensis	109	— Lotharinga	111
— Bonjouri	118	— Lucensis	112
— brevissima	112	— Matheroni	120
— Brogniartana	110	— Maurcausiaca	116
— capitata	111	— Melania	116
— carcarenensis	109	— minor	109
— caryophyllata	117	— Montisclari	109
— caryophyllata	110	— Morellana	112
— cellulosa	112	— obconica	116
— Champlittensis	111	— obconica	110
— Charcennensis	117	— obliqua	117
— compressa	118	— orbitolites	110
— convexa	111	— patellata	113
— Coquandi	120	— pateriformis	119
— corallina	117	— plicata	117
— crassisepta	119	— ponderosa	116
— crenata	110	— pupoides	111
— capuliformis	119	— pygmea	113
— capuliformis	115	— radiceiformis	113
— cyclolitoides	115	— retorta	113
— cytinus	116	— Reussi	115
— decipiens	114	— Ricordeana	120
— decipiens	109	— rudis	115
— deformis	112	— rugosa	110
— deltoides	115	— Sarthacensis	111
— depressa	110	— sessilis	113
— detrita	119	— sinemuriensis	114
— dilata	116	— striatulata	114
— disciformis	109	— stricta	120
— dispar	116	— Stutchburyi	112
— Dufrenoyi	120	— subcylindrica	117
— subdispar	110	— subexcavata	119
— elongata	112	— subtruncata	118
— Erguelensis	113	— sycodes	112
— Eugenia	117	— tenuilamellosa	116
— excelsa	116	— Tessoni	120
— explanata	114	— tortuosa	118
— Gigas	117	— trochoides	110
— Goldfussana	119	— Trouvillensis	110

MONTLIVAUTIA <i>truncata</i>	118	OROSERIS <i>spælea</i>	170
— <i>truncata</i>	115	— <i>sulcata</i>	171
— <i>tuba</i>	111	OULOPHYLLIA <i>ataciana</i>	160
— <i>turbinata</i>	111	— <i>Bronni</i>	161
— <i>undata</i>	118	— <i>corallina</i>	163
— <i>Valfinensis</i>	119	— <i>corrugata</i>	159
— <i>vasiformis</i>	110	— <i>disjuncta</i>	163
— <i>Waterhousei</i>	114	— <i>elegans</i>	163
— <i>Wrighti</i>	112	— <i>excavata</i>	163
MOPSEA <i>costata</i>	321	— <i>labyrinthica</i>	162
MORPHASTRÆA <i>Ludovicana</i>	225	— <i>lamelli-dentata</i>	161
MORTIERA <i>vertebralis</i>	319	— <i>macropora</i>	163
MUSSA <i>abbreviata</i>	172	— <i>mæandra</i>	161
MYCETOPHYLLIA <i>antiqua</i>	166	— <i>Martiniana</i>	163
— <i>stellifera</i>	166	— <i>Michelini</i>	166
MICROPHYLLIA <i>ataciana</i>	160	— <i>turbinata</i>	163
		— <i>Valmondoisiaca</i>	240
N.		P.	
NEMAPHYLLUM <i>arachnoideum</i>	317	PACHYGIRA <i>caudata</i>	157
— <i>aranea</i>	314	— <i>Cotteaui</i>	157
— <i>clisioides</i>	314	— <i>Cottellana</i>	157
— <i>decipiens</i>	306	— <i>Cotteauana</i>	157
— <i>minus</i>	311	— <i>Deluci</i>	157
— <i>septosum</i>	315	— <i>excelsa</i>	157
O.		— <i>Knorri</i>	157
OCTOCÆNIA <i>Lugdunensis</i>	192	— <i>ornata</i>	157
OCULINA <i>Americana</i>	176	— <i>labyrinthica</i>	157
— <i>coalescens</i>	192	— <i>tuberosa</i>	157
— <i>compressa</i>	131	PACHYSERIS <i>Murchisoni</i>	223
— <i>compressa</i>	129	PALÆOCYCLUS <i>Fletcheri</i>	126
— <i>conferta</i>	176	— <i>porpita</i>	126
— <i>crassi-ramosa</i>	238	— <i>præacutus</i>	126
— <i>explanata</i>	183	— <i>rugosus</i>	126
— <i>gemmata</i>	129	PALÆOSMILIA <i>Murchisoni</i>	296
— <i>incerta</i>	131	PALMIPORA <i>Solanderi</i>	261
— <i>Meyeri</i>	176	PARACYATHUS <i>brevis</i>	87
— <i>ravistellata</i>	131	— <i>caryophyllus</i>	87
— <i>reflexa</i>	131	— <i>Pedemontanus</i>	87
— <i>Solanderi</i>	131	— <i>procumbens</i>	87
— <i>virginea</i>	131	— <i>Turonensis</i>	88
OMPHYMA <i>grandis</i>	294	PARASMILIA <i>Bonei</i>	103
— <i>Murchisoni</i>	294	— <i>centralis</i>	103
— <i>subturbinata</i>	293	— <i>cylindrica</i>	103
— <i>turbinata</i>	293	— <i>elongata</i>	103
— <i>verrucosa</i>	294	— <i>Faujasi</i>	102
ORBITOLITES <i>antiqua</i>	276	— <i>Fittoni</i>	103
— <i>apiculatus</i>	275	— <i>Gravesana</i>	103
— <i>hemisphericus</i>	275	— <i>Mantelli</i>	103
GROSERIS <i>apennina</i>	170	— <i>rudis</i>	103
— <i>convexa</i>	171	— <i>serpentina</i>	103
— <i>elegantula</i>	171	PARASTRÆA <i>grandiflora</i>	227
— <i>explanata</i>	171	PAVONARIA <i>Delanoueï</i>	322
— <i>graciosa</i>	171	PAVONIA <i>hemisphærica</i>	215
— <i>irregularis</i>	171	— <i>infundibuliformis</i>	240
— <i>neocomiensis</i>	171	— <i>meandrinoides</i>	170
— <i>plana</i>	171	— <i>tuberosa</i>	215
— <i>regularis</i>	171	PENTACÆNIA <i>elegantula</i>	194
— <i>Sancti-Mihieli</i>	253	— <i>microtrema</i>	194
— <i>Santi-Mihieli</i>	171	— <i>pulchella</i>	194

PENTACÆNIA Tombecki	194	PLACOPHYLLIA Dianthus	148
PEPLOSMILIA austeni	107	— Schimperii	148
— corallina	107	— angusta	101
— portlandica	107	— arcuata	101
PERIPEDIUM heliops	309	— carusensis	101
PERISMILIA bilobata	115	— consobrina	101
— elongata	120	— corallina	101
— hippuritiformis	116	— cuneiformis	101
— Martinana	120	— cymbula	101
PETALAXIS Portlocki	317	— elongata	101
PETRAIA bina	297	— Nysti	101
— cellica	297	— Parkinsoni	101
— dentatis	284	— rudis	101
— Gigas	268	PLASMOPORA follis	263
— quadrata	293	— macropora	263
— zig-zag	298	— petaliformis	263
PHILLIPSASTRÆA cantabrica	316	— scita	263
— Hennahii	315	PLATITROCHUS Goldfussi	93
— Hennahi	308	— Stokesi	93
— parallela	312	PLERASTRÆA Pratti	236
— radiata	315	— rosacea	236
— torreana	316	— Savignyi	236
— tuberosa	315	— tessellata	236
— Verneuli	315	PLESIASTRÆA Desmoulinsi	205
PHYLLANGIA conferta	238	PLEUROCÆNIA alveolaris	239
PHYLLOCÆNIA arachnoides	206	— provincialis	239
— Archiaci	196	PLEUROCORA alternans	151
— compressa	197	— explanata	151
— Corbarica	197	— gemmans	151
— Cottaldina	197	— Haueri	151
— Cotteaui	197	— Konincki	151
— decussata	197	— Pailletteana	152
— dubia	196	— ramulosa	151
— Doublieri	197	— Reussi	151
— glomerata	197	— rudis	151
— Icaunensis	197	PLEURODICTUM problematicum	256
— intermedia	197	PLEUROPHYLLIA trichotoma	141
— irradians	296	PLEUROSMILIA compressa	106
— irregularis	196	— corallina	105
— Lucasana	197	— cylindrica	105
— Macrocona	206	— elongata	106
— Marticensis	197	— graciosa	106
— neocomiensis	196	— grandis	105
— Neptuni	197	— irradians	106
— Oceani	197	— Marcou	106
— pediculata	196	— portlandica	106
— regularis	197	— scaphium	106
— Renauxi	197	— stylifera	106
— sculpta	197	PLEUROSTYLINA corallina	201
— Vallis-clausæ	197	— frondescens	201
— varians	196	POCILLOPORA approximata	265
— variolaris	194	— madreporacea	276
PHYLLODES laciniatum	80	— raristellata	179
PHYTOGYRA Deshayesi	156	— Solanderi	261
— Deshayesiaca	156	— sertifera	187
— Fromenteli	156	POLYCÆLIA Donatiana	284
— magnifica	156	— profunda	284
PLACOCÆNIA irregularis	173	POLYPHYLLASTREA convexa	240
— macrophthalma	185	— Icaunensis	240
— Perroni	185	— plana	213

POLYPHYLLIA <i>explanata</i>	114	PRIONASTREA <i>Guettardana</i>	230
— <i>patellata</i>	113	— <i>Hærnesi</i>	227
— <i>Toncasana</i>	222	— <i>icaunensis</i>	231
POLYPHYLLOSERIS <i>convexa</i>	240	— <i>infundibulum</i>	231
— <i>Icaunensis</i>	240	— <i>irregularis</i>	225
POLYPHYLLUM <i>rugosura</i>	310	— <i>Ligeriensis</i>	231
— <i>Boloniense</i>	309	— <i>lobata</i>	215
— <i>Davidsoni</i>	310	— <i>magna</i>	227
— <i>helianthoides</i>	309	— <i>microcoma</i>	234
— <i>hexagonum</i>	309	— <i>Munsterana</i>	227
— <i>hypocrateriforme</i>	309	— <i>mutabilis</i>	231
— <i>profundum</i>	309	— <i>ornata</i>	229
— <i>quadrigeminum</i>	309	— <i>polygonalis</i>	227
— <i>regium</i>	309	— <i>punctata</i>	235
— <i>Sedwicki</i>	310	— <i>Rathieri</i>	230
PACHYPHYLLUM <i>Devoniense</i>	302	— <i>striata</i>	231
— <i>Bouchardi</i>	381	— <i>supracretacea</i>	231
POLYTREMACIS <i>Blainvillei</i>	262	— <i>Tombekiana</i>	231
— <i>bulbosa</i>	262	— <i>vesparia</i>	208
— <i>complanata</i>	262	PROHELIA <i>corallina</i>	178
— <i>glomerata</i>	262	— <i>neocomiensis</i>	178
— <i>macrostoma</i>	262	PROPORA <i>acerosa</i>	263
— <i>micropora</i>	262	— <i>conferta</i>	263
— <i>Preschi</i>	262	— <i>cyclostoma</i>	263
— <i>provincialis</i>	263	— <i>tabulata</i>	263
— <i>ramosa</i>	262	PROTARÆA <i>Verneuili</i>	252
— <i>Reussi</i>	262	— <i>vetusta</i>	251
— <i>subramosa</i>	263	PROTOSERIS <i>Valtoni</i>	241
— <i>supercretacea</i>	262	PSAMMOGENIA <i>Kœklini</i>	183
PORITES <i>acerosus</i>	263	PSAMMOHELIA <i>aspera</i>	177
— <i>aculeata</i>	202	— <i>dendroidea</i>	177
— <i>astreiformis</i>	311	— <i>gibbosa</i>	177
— <i>cellulosa</i>	271	— <i>scquana</i>	177
— <i>Deshayesana</i>	255	PSEUDOCGENIA <i>Bernardina</i>	191
— <i>elegans</i>	234	— <i>elegans</i>	191
— <i>elegans</i>	202	— <i>elegans</i>	186
— <i>incrustans</i>	251	— <i>octonaria</i>	190
— <i>inordinata</i>	261	— <i>ramosa</i>	190
— <i>interstincta</i>	261	— <i>suboctoris</i>	192
— <i>mamillata</i>	251	PTILODICTYA <i>pavonia</i>	274
— <i>megastoma</i>	261	PTYCHOPHYLLUM <i>expansum</i>	301
— <i>petaliformis</i>	263	— <i>patellatum</i>	300
— <i>pyriformis</i>	262	— <i>Stokesi</i>	301
— <i>stellulata</i>	251	PYRGIA <i>Labechei</i>	318
— <i>vetusta</i>	251	— <i>Michelini</i>	218
PORPITAL <i>madrepore</i>	261		
PRIONASTREA <i>ambigua</i>	213		
— <i>explanata</i>	228	R.	
— <i>Goldfussana</i>	227	RHABDASTREA <i>flexuosa</i>	174
— <i>Blandina</i>	231	— <i>jurensis</i>	174
— <i>cabanetiana</i>	231	RHABDOPHYLLIA <i>Bernardana</i>	139
— <i>corallina</i>	231	— <i>Edwardi</i>	138
— <i>diversiformis</i>	225	— <i>elegans</i>	138
— <i>dubia</i>	231	— <i>Faxensis</i>	139
— <i>angustata</i>	231	— <i>gracilis</i>	138
— <i>aranæa</i>	225	— <i>grandis</i>	137
— <i>Bernardina</i>	227	— <i>kimmeridgiensis</i>	138
— <i>gracilis</i>	231	— <i>Micheloti</i>	139
— <i>grandiflora</i>	231	— <i>Moreauana</i>	138
— <i>grandis</i>	231	— <i>nodosa</i>	139
		— <i>Phillipsi</i>	138

RHABDOPHYLLIA	portlandica	138	SIPHONOPHYLLIA	cylindrica	286
—	Reussi	139	SMILOTROCHUS	Austeni	94
—	salsensis	138	—	Hagenowi	95
—	simplex	139	—	tuberosus	94
—	solitaria	139	SMITHIA	Boloniensis	308
—	subdichotoma	139	—	Bowerbancki	308
—	tenuicosta	139	—	Hennahi	308
—	trichotoma	139	—	Pengilyi	308
—	undata	138	SOLENASTRÆA	gibbosa	205
—	Valfinensis	138	—	tenuilamellosa	205
RHABDOPORA	approximata	265	—	turonensis	205
—	megastoma	265	—	Verhelsti	205
RHODARÆA	Raulini	251	SPHENOTROCHUS	granulosus	92
RHIPIDOGYRA	crassa	155	—	intermedius	93
—	dædalea	157	—	Milletanus	93
—	Deshayesana	156	—	mixtus	92
—	flabellum	155	—	nanus	93
—	insignis	155	—	pulchellus	92
—	Martinana	155	—	Rœmeri	93
—	Martini	155	—	semigranosus	92
—	occitanica	155	—	crispus	92
—	princeps	157	SPONGOPHYLLUM	Sedgwicki	310
—	undulata	155	STAURIA	astreiformis	307
RHYSMOTES	petiolatus	319	STELLIPORA	antheloidea	272
RIZANGIA	Brauni	152	STELLORIA	agaricites	169
—	brevissima	153	—	elegans	169
—	Martini	153	—	rustica	169
—	Michelini	153	—	sulcata	169
—	Sedgwicki	153	STEPHANOCÆNIA	alpina	202
RÆMERIA	infundibulifera	267	—	angulosa	228
S.			—	Bernardina	202
SARCINULA	acropora	207	—	carantonensis	203
—	astroites	208	—	conciuna	217
—	gratissima	173	—	coniacensis	203
—	microphthalma	187	—	Cottaldina	234
—	organon	316	—	Desportesana	202
—	organum	316	—	digitata	220
—	Phillipsi	315	—	elegans	202
—	placenta	315	—	excavata	203
—	plana	207	—	fleuriausa	203
—	punctata	261	—	florida	203
—	tuberosa	315	—	formosa	202
SEPTASTRÆA	dispar	175	—	formosissima	202
—	excavata	175	—	furcata	203
—	explanata	175	—	grandipora	203
—	Forbesi	195	—	Haimei	202
—	hirtolamellata	175	—	intermedia	203
—	multilateralis	175	—	irregularis	203
—	ramosa	174	—	littoralis	203
SIDERASTRÆA	agariciformis	219	—	sinemuriensis	203
—	crenulata	235	—	subornata	234
—	explanata	228	—	trochiformis	202
—	funesta	235	—	tuberosa	234
—	incrustedata	253	—	agaricoides	242
—	italica	236	—	Boverbanki	242
—	Lamoureauxi	221	—	discoïdes	242
—	Parisiensis	236	—	elegans	242
—	Websteri	255	—	imperialis	242
SIPHONODENDRON	pauciradiale	305	—	italica	81
			—	Nysti	242

STEPHANOCORA <i>Meyeri</i>	176	STYLINA <i>antiqua</i>	199
STEPHANOPHYLLIA <i>suecica</i>	242	— <i>arduennensis</i>	193
STENOgyRA <i>corallina</i>	153	— <i>arduennensis</i>	192
— <i>Perroni</i>	154	— <i>aspera</i>	192
— <i>plicata</i>	154	— <i>Babeana</i>	187
STENOPORA <i>columnaris</i>	276	— <i>Bernardina</i>	191
— <i>crassa</i>	274	— <i>Bourgueti</i>	279
— <i>crinita</i>	275	— <i>Bucheti</i>	187
— <i>informis</i>	275	— <i>bullata</i>	192
— <i>ovata</i>	274	— <i>cœspitosa</i>	188
— <i>Tasmaniensis</i>	275	— <i>castellum</i>	189
STEREOSPAMMIA <i>humilis</i>	247	— <i>Charcennensis</i>	186
STIBASTREA <i>Edwardsi</i>	164	— <i>coalescens</i>	192
STOMATOPORA <i>serpens</i>	319	— <i>communis</i>	189
STREPHODES <i>gracilis</i>	298	— <i>conifera</i>	188
— <i>multilamellatum</i>	296	— <i>constricta</i>	191
STREPTELASMA <i>bina</i>	297	— <i>Coquandi</i>	186
— <i>corniculum</i>	300	— <i>coronata</i>	193
— <i>crassa</i>	300	— <i>crassi-lamellata</i>	181
— <i>expansa</i>	300	— <i>Cotteaui</i>	186
— <i>multilamellosa</i>	300	— <i>Delabechei</i>	190
— <i>parvula</i>	300	— <i>dendroidea</i>	193
— <i>pluriradialis</i>	297	— <i>depravata</i>	163
— <i>profunda</i>	300	— <i>digitata</i>	190
STROMBASTREA <i>quinquangulosa</i>	313	— <i>Dufrenoyi</i>	187
— <i>stellaris</i>	313	— <i>echinulata</i>	187
— <i>truncata</i>	302	— <i>Etalloni</i>	187
STROMBODES <i>diffluens</i>	313	— <i>excavata</i>	279
— <i>distortus</i>	297	— <i>excelsa</i>	191
— <i>emarciatum</i>	316	— <i>excentrica</i>	190
— <i>fasciculatus</i>	313	— <i>explanata</i>	191
— <i>helianthoides</i>	299	— <i>Faugasi</i>	190
— <i>infundibularius</i>	313	— <i>Flottei</i>	188
— <i>Labechei</i>	312	— <i>Gaulardi</i>	187
— <i>Murchisoni</i>	313	— <i>geminata</i>	188
— <i>pentagonus</i>	313	— <i>gemmaans</i>	186
— <i>Phillipsi</i>	313	— <i>Gireaudi</i>	187
— <i>plicatus</i>	301	— <i>gracilis</i>	188
— <i>rectus</i>	296	— <i>grandiflora</i>	186
— <i>simplex</i>	297	— <i>granulata</i>	189
— <i>stellaris</i>	313	— <i>Grayensis</i>	189
— <i>striatus</i>	333	— <i>hexaphyllia</i>	188
— <i>truncatus</i>	302	— <i>hirta</i>	192
— <i>typus</i>	312	— <i>Humberti</i>	193
— <i>vermicularis</i>	295	— <i>icaunensis</i>	199
STYLANGIA <i>neocomiensis</i>	178	— <i>inflata</i>	188
STYLASTREA <i>sinemuriensis</i>	223	— <i>insignis</i>	189
— <i>inconferta</i>	315	— <i>intricata</i>	189
— <i>irregularis</i>	315	— <i>kimmeridgiensis</i>	187
STYLAXIS <i>arachnoidea</i>	317	— <i>Labechei</i>	190
— <i>Coyi</i>	317	— <i>Leymeriana</i>	193
— <i>Flemingi</i>	318	— <i>limbata</i>	188
— <i>major</i>	317	— <i>lobata</i>	191
— <i>M'Coyana</i>	317	— <i>magnifica</i>	191
— <i>Portlocki</i>	317	— <i>Maillei</i>	188
STYLIDOPHYLLUM <i>floriforme</i>	316	— <i>microcœnia</i>	189
— <i>papillatum</i>	316	— <i>microcoma</i>	188
STYLINA <i>alveolata</i>	279	— <i>Moreaui</i>	186
— <i>alveolata</i>	186	— <i>nantuacensis</i>	192
— <i>antiqua</i>	279	— <i>neocomiensis</i>	199

STYLINA	nodosa	188	SYNASTRÆA	arachnoides	219
—	octonaria	190	—	Arduennensis	220
—	ornata	195	—	astræoides	220
—	pereziana	209	—	ataxensis	222
—	Perroni	188	—	Babeana	214
—	pistellum	190	—	Belgica	221
—	Ploti	191	—	bellula	222
—	provincialis	182	—	Bouri	221
—	radicensis	187	—	Cadomensis	214
—	ramosa	190	—	complanata	222
—	sertifera	187	—	conferta	219
—	sexradiata	195	—	confusa	222
—	solida	187	—	consobrina	281
—	speciosa	187	—	constricta	220
—	splendens	189	—	contorta	220
—	striata	218	—	corbarica	219
—	sublævis	193	—	crenulata	214
—	sublimbata	193	—	cristata	213
—	sulcata	186	—	decipiens	221
—	Thevenini	190	—	digitata	220
—	Thiollieri	193	—	dubia	219
—	Thurmani	193	—	Dumonti	219
—	tubulosa	191	—	flexuosa	219
—	tubulosa	186	—	frondescens	218
—	tubulifera	191	—	geometrica	212
—	tumularis	192	—	hemispherica	215
—	Valfinensis	187	—	icaunensis	222
—	variabilis	193	—	jurensis	222
STYLOCÆNIA	emarciata	204	—	Langrunensis	221
—	Lapeyrouseana	204	—	Lennisi	220
—	lobato-rotundata	204	—	Lucensis	222
—	monticularia	204	—	Lyelli	221
—	portlandica	230	—	mæandra	221
—	taurinensis	204	—	magna	222
—	Vicaryi	204	—	magnifica	218
STYLOCYATHUS	dentalinus	80	—	Martini	223
—	dentalina	80	—	media	220
STYLOGYRA	flabellum	155	—	micontha	200
STYLOHELIA	conferta	180	—	moreana	215
—	dendroidea	181	—	multiradiata	219
—	mamillata	180	—	neocomiensis	222
STYLOPHORA	contorta	179	—	Neptuni	222
—	corallina	180	—	Oceani	222
—	costulata	180	—	pediculata	221
—	monticularia	204	—	pinna	222
—	raristellata	179	—	pulchella	222
—	regularis	180	—	ramosa	222
—	rugosa	180	—	rotata	213
—	solida	187	—	Simonellana	222
—	thyrsiformis	180	—	stellata	220
STYLOPHYLLUM	polyacanthum	223	—	stricta	220
STYLOSMILIA	brevis	147	—	subexcavata	222
—	Cotteauana	147	—	tenuissima	221
—	gracilis	147	—	textilis	220
—	Michelini	147	—	Tombeckiana	222
—	neocomiensis	147	—	undulata	222
—	organizans	147	—	velamentosa	221
SYMPHYLLIA	bisinuosa	165	SYNHILIA	Grevensis	176
—	Tiedemani	165	—	gibbosa	176
SYNASTRÆA	agaricites	221	—	Meyeri	176

SYNHELIA Sharpeana	176	THAMNASTREA digitata	217
SYRINGOPHYLLUM cantabricum	316	— dimorphastræa	213
— organum	316	— discoides	214
— torreanum	316	— Dumonti	219
SYRINGOPORA abdita	258	— dumosa	216
— bifurcata	257	— Ermani	218
— cancellata	257	— exaltata	220
— calenata	258	— excavata	200
— cespitosa	258	— exigua	214
— Cleviana	259	— fasciculata	215
— conferta	258	— Firmasana	212
— distans	257	— Firmasiana	212
— exilis	258	— Firmasi	212
— fascicularis	258	— flexuosa	219
— filiformis	258	— frondescens	218
— geniculata	258	— fungiformis	212
— laxa	259	— Genevensis	213
— parallela	257	— Genivallensis	212
— ramulosa	257	— geometrica	212
— reticulata	258	— gigantea	214
— reticulata	257	— Goldfussi	215
— rugosa	259	— gracilis	217
— serpens	258	— grandiflora	212
— tubiporides	258	— Haueri	218
— tabulata	257	— hemispherica	215
— Troosti	259	— Henocquei	228
— Verneuili	257	— insignis	215
— verticillata	258	— lamellistriata	214
— Yandeli	259	— lamellosa	216
T.		— Lamourouxii	214
TETRACÆNIA Dupiniana	308	— Langrumensis	221
THAMNASTREA acutidens	213	— Lennisii	221
— affinis	214	— Lennisii	220
— agaricites	221	— lobata	215
— agaricites	220	— Lorryana	216
— ambigua	213	— Lyelli	221
— arachnoides	219	— mæandra	221
— araneola	215	— mummosa	218
— arborescens	216	— M'Coyi	217
— Arduennensis	220	— media	220
— astracoides	220	— Mettensis	214
— Belgica	221	— Michelinia	215, 216
— boletiformis	213	— micrantha	200
— Bouri	221	— microconos	219
— Cadomensis	214	— microphyllia	200
— Champlittensis	212	— minima	218
— Charcennensis	212	— Moreanana	215
— Collinaria	200	— Morellana	215
— composita	213	— Moreau	215
— concinna	217	— multiradiata	219
— conferta	219	— Neptuni	222
— confusa	221	— pediculata	221
— conica	216	— Perroni	215
— constricta	220	— plana	213
— corbarica	219	— portlandica	218
— crenulata	214	— procera	212
— dendroidea	214	— provincialis	240
— Desori	214	— punctata	216
— digitata	220	— ramosa	222
		— Requièni	214

THAMNASTREA	rotata	213	THECOSMILIA	subeylindrica	144
—	scita	213	—	trichotoma	142
—	stricta	220	—	trilobata	142
—	tenuissima	221	—	turbinata	142
—	Tessierana	214	THECOSTEGITES	auloporoides	278
—	Tessieriana	214	—	Bouchardi	278
—	Tessieri	214	—	parvula	278
—	textilis	220	TRACHYPORA	Davidsoni	265
—	Toucasana	240	TREMOCÆNIA	pulchella	192
—	velamentosa	221	—	subornata	192
—	Waltoni	217	—	varians	217
THAMNOSERIS	incrustans	241	TRIPHYLLOCÆNIA	excavata	204
THECIA	Grayana	280	TRIPLASMA	æqualis	298
—	Lonsdalei	280	TRISMILIA	triangularis	106
—	Swindernana	280	TROCHOCYATHUS	alpinus	83
THECOCYATHUS	Grosogoeati	81	—	armatus	86
—	macra	81	—	atalayensis	80
—	Moorei	81	—	Bellardi	85
—	tintinnabulum	81	—	Bellingermanus	83
THECOPHYLLIA	arduennensis	416	—	brevis	86
—	arduennensis	111	—	Burnesi	83
—	boletiformis	110	—	conulus	83
—	capitata	111	—	cornucopia	84
—	elongata	120	—	cornutus	85
—	Lucensis	120	—	costulatus	82
—	numismalis	120	—	crassus	82
—	obliqua	117	—	cupula	82
—	rugosa	110	—	cyclolitoides	84
—	sarthacensis	111	—	Delemontanus	86
THECOSMILIA	annularis	142	—	Douglasi	84
—	Bajociensis	144	—	elongatus	82
—	Buvignieri	143	—	gracilis	83
—	Claudiensis	142	—	grandis	87
—	confluens	144	—	granulatus	82
—	connecta	143	—	Grenieri	86
—	costata	143	—	Haimei	85
—	crassa	144	—	Harveyanus	85
—	cretacea	144	—	hexagonalis	87
—	cylindrica	142	—	imparipartitus	83
—	deformis	164	—	irregularis	86
—	depressa	143	—	Konigi	86
—	Edwardsi	143	—	Konincki	82
—	elongata	142	—	latero-cristatus	85
—	glomerata	144	—	lineatus	83
—	gracilis	144	—	Magnevilleanus	83
—	Gregaria	144	—	Michelini	83
—	Konincki	143	—	mitratus	82
—	lævis	143	—	obesus	85
—	lobata	143	—	perarmatus	86
—	Martini	142	—	plicatus	82
—	multicincta	144	—	primus	87
—	neocomiensis	142	—	pyramidatus	86
—	obtusa	144	—	pyrenaicus	84
—	palmata	143	—	raricostatus	85
—	ramosa	142	—	revolutus	85
—	Requieni	164	—	Royanus	87
—	rudis	115	—	simplex	82
—	Rupellensis	144	—	Simosus	83
—	seminuda	142	—	Sismondai	82
—	socia	143	—	suberistatus	85

TROCHOCYATHUS	<i>sublævis</i>	86	TURBINARIA	<i>cyathiformis</i>	246
—	<i>subundosus</i>	84	TURBINOLIA	<i>acuminata</i>	298
—	<i>tenuistriata</i>	86	—	<i>alata</i>	97
—	<i>Terquemi</i>	83	—	<i>cornucopia</i>	84
—	<i>Thorenti</i>	87	—	<i>alpina</i>	83
—	<i>undulatus</i>	85	—	<i>appendiculata</i>	89
—	<i>latero-spinosus</i>	85	—	<i>arcolensis</i>	99
—	<i>Van-den-Hecke</i>	84	—	<i>arietina</i>	298
—	<i>verrucosus</i>	84	—	<i>armata</i>	86
—	<i>versicostatus</i>	85	—	<i>Atalayensis</i>	80
—	<i>Warburtoni</i>	87	—	<i>avicula</i>	88
TROCHOPHYLLUM	<i>Verneuili</i>	291	—	<i>Basochesi</i>	97
TROCHOSERIS	<i>clavus</i>	128	—	<i>Bellardii</i>	85
—	<i>corallina</i>	128	—	<i>Bellingeriana</i>	83
—	<i>distorta</i>	128	—	<i>bilobata</i>	115
—	<i>Eturbensis</i>	128	—	<i>bilobata</i>	84
—	<i>lobata</i>	128	—	<i>Boissyana</i>	99
—	<i>poculum</i>	128	—	<i>Bowerbanki</i>	91
—	<i>sessilis</i>	128	—	<i>brevis</i>	86
—	<i>sinuosa</i>	128	—	<i>calcar</i>	84
—	<i>tenuilamellosa</i>	128	—	<i>Calvimontis</i>	115
—	<i>Tombecki</i>	128	—	<i>caryophyllus</i>	87
TROCHOSMILIA	<i>Basochesi</i>	97	—	<i>cellica</i>	297
—	<i>bipartita</i>	99	—	<i>centralis</i>	103
—	<i>Boissyana</i>	99	—	<i>cernua</i>	99
—	<i>cernua</i>	98	—	<i>cernua</i>	98
—	<i>complanata</i>	97	—	<i>clavus</i>	90
—	<i>compressa</i>	97	—	<i>clavus</i>	79
—	<i>corniculum</i>	97	—	<i>complanata</i>	97
—	<i>crassa</i>	99	—	<i>compressa</i>	97
—	<i>cuneolus</i>	97	—	<i>compressa</i>	94
—	<i>didyma</i>	98	—	<i>conica</i>	298
—	<i>Dumortieri</i>	99	—	<i>conulus</i>	83
—	<i>elongata</i>	100	—	<i>corniculum</i>	97
—	<i>elongata</i>	100	—	<i>costata</i>	92
—	<i>Faujasi</i>	98	—	<i>crispa</i>	92
—	<i>fimbriata</i>	97	—	<i>cuneata</i>	90
—	<i>Gervillei</i>	98	—	<i>cuneata</i>	89
—	<i>granifera</i>	98	—	<i>cuneolus</i>	97
—	<i>inflexa</i>	99	—	<i>cupula</i>	82
—	<i>irregularis</i>	86	—	<i>cyclolites</i>	120
—	<i>Michelottii</i>	98	—	<i>cyclolithoides</i>	84
—	<i>multilobata</i>	99	—	<i>cylindrica</i>	244
—	<i>multisinuosa</i>	98	—	<i>cymbula</i>	101
—	<i>patula</i>	99	—	<i>Delemontana</i>	86
—	<i>poculum</i>	98	—	<i>dentalus</i>	79
—	<i>Reussi</i>	100	—	<i>Deucalionis</i>	116
—	<i>Saltzburgensis</i>	97	—	<i>didyma</i>	98
—	<i>subinduta</i>	99	—	<i>dispar</i>	92
—	<i>sulcata</i>	97	—	<i>Dixoni</i>	91
—	<i>tifauensis</i>	98	—	<i>Douglasi</i>	84
—	<i>uricornis</i>	98	—	<i>Dufrenoyi</i>	89
—	<i>varians</i>	100	—	<i>duodecimcostata</i>	94
—	<i>vertebralis</i>	122	—	<i>echinata</i>	293
TRYPLASMA	<i>articulata</i>	295	—	<i>elliptica</i>	243
TUBIPORA	<i>catenularia</i>	260	—	<i>exarata</i>	94
—	<i>catenulata</i>	260	—	<i>excavata</i>	103
—	<i>fascicularis</i>	258	—	<i>excavata</i>	102
—	<i>radiata</i>	315	—	<i>expansa</i>	297
TUBIPORITES	<i>serpens</i>	319	—	<i>fimbriata</i>	97

TURBINOLIA <i>firma</i>	91	TURBINOLIA <i>turbinata</i>	293
— <i>Fredericana</i>	91	— <i>turbinata</i>	84
— <i>fungites</i>	293	— <i>uneata</i>	88
— <i>fungites</i>	298	— <i>undata</i>	85
— <i>furcata</i>	289	— <i>uricornis</i>	98
— <i>Goldfussi</i>	93	— <i>verrucosa</i>	293
— <i>granulata</i>	82	— <i>versicostata</i>	85
— <i>granulosa</i>	92	TURBINOLOPSIS <i>bina</i>	297
— <i>Gravesi</i>	245	— <i>elongata</i>	296
— <i>Haimei</i>	85	— <i>elongata</i>	297
— <i>hippuritiformis</i>	116	— <i>pauciradialis</i>	297
— <i>humilis</i>	91	— <i>rugosa</i>	297
— <i>ibicina</i>	298	U.	
— <i>inauris</i>	100	ULASTREA <i>Edwardsi</i>	208
— <i>incrustedata</i>	298	ULOPHYLLIA <i>crispa</i>	227
— <i>intermedia</i>	93	— <i>meandrinoides</i>	166
— <i>irregularis</i>	86	— <i>Montana</i>	166
— <i>Japheti</i>	118	— <i>profunda</i>	166
— <i>Konigi</i>	86	V.	
— <i>lineata</i>	84	VERTICILLOPORA <i>dubia</i>	275
— <i>Maclurii</i>	243	VIRGULARIA <i>alpina</i>	322
— <i>Magnevilleana</i>	83	Z.	
— <i>Mentelli</i>	87	ZAPHRENTIS <i>Bowerbanki</i>	289
— <i>Michelottii</i>	98	— <i>centralis</i>	287
— <i>Milletiana</i>	93	— <i>Clappi</i>	286
— <i>minor</i>	92	— <i>Cliffordi</i>	287
— <i>mitrata</i>	289	— <i>cornicula</i>	287
— <i>mitrata</i>	298	— <i>cornu-copiae</i>	287
— <i>mitrata</i>	82	— <i>cyathophylloides</i>	288
— <i>mixta</i>	92	— <i>cylindrica</i>	286
— <i>multiserialis</i>	94	— <i>Dalii</i>	287
— <i>multisinuosa</i>	98	— <i>Delanoue</i>	288
— <i>multispinosa</i>	94	— <i>denticulata</i>	288
— <i>nana</i>	93	— <i>Desori</i>	288
— <i>Nystana</i>	92	— <i>Enniskilleni</i>	288
— <i>obconica</i>	116	— <i>excavata</i>	289
— <i>obesa</i>	85	— <i>gigantea</i>	286
— <i>obliqua</i>	289	— <i>Griffithi</i>	288
— <i>patula</i>	99	— <i>Gueraugeri</i>	288
— <i>perarmata</i>	86	— <i>Halli</i>	286
— <i>pharetra</i>	91	— <i>Konincki</i>	287
— <i>plicata</i>	82	— <i>Marcou</i>	289
— <i>prolonga</i>	244	— <i>Michelini</i>	287
— <i>Prestwichi</i>	91	— <i>Næggerathi</i>	289
— <i>pyramidalis</i>	293	— <i>Omaliusi</i>	289
— <i>pyramidata</i>	86	— <i>patula</i>	286
— <i>ravicostata</i>	85	— <i>Phillipsi</i>	288
— <i>rudis</i>	101	— <i>phrygia</i>	287
— <i>semigranosa</i>	92	— <i>Rafinesquei</i>	287
— <i>sinuosa</i>	84	— <i>Rœmeri</i>	286
— <i>Sismondiana</i>	243	— <i>spinulosa</i>	288
— <i>Stokesi</i>	93	— <i>Stokesi</i>	287
— <i>striata</i>	299	— <i>tortuosa</i>	288
— <i>sulcata</i>	91		
— <i>Taurinensis</i>	95		
— <i>lunistriata</i>	86		

ERRATA.

- Page 15, lignes 6 et 7, au lieu de Madreporaires, Apores, poreux, lisez : Zoanthaires Apores, Poreux.
- 18, ligne 11, au lieu de *Rhipidogyra*, lisez : *Rhipidogyra crassa*.
 - 24, ligne 4, au lieu de 1 + 4 — 5, lisez : 1 + 4 = 5.
 - 58, 6^e accolade, au lieu de 4, lisez : 3.
 - 59, 3^e accolade, au lieu de 2, lisez : 3.
 - 71, 9^e accolade, au lieu de 4, lisez : 3.
 - 72, ligne 2, au lieu de *Metrosphyllum*, lisez : *Metriophyllum*.
 - 73, ligne 28, au lieu de 2, lisez : 3.
 - 75, ligne 1, au lieu de *Stylophyllum*, lisez : *Stylidophyllum*.
 - 91, dernière ligne, au lieu de : ne diffère du T. surcata par ses 24, lisez : ne diffère du T. sulcata que par ses 24.
 - 186, ligne 37, au lieu de S. Moreavi, lisez : S. Moreau.
 - 209, ligne 24, supprimez l'alinéa commençant par ces mots : 31. H. Barandei, etc., qui fait double emploi.
 - 214, ligne 14, au lieu de 21. M., lisez : 21. T.
 - 217, ligne 10, au lieu de *Thamnastræa*, Edwards, lisez : *Thamnastrea* id., Edwards.
 - 220, ligne 10, au lieu de 11. C., lisez : 11. S.
 - 230, ligne 28, au lieu de *J. Guettardana*, lisez : *I. Guettardana*.
 - 241, ligne 37, au lieu de PERFORÉES, lisez : PERFORÉS.
 - 248, ligne 15, au lieu de Marconana, lisez : Marcouana.
 - 275, supprimez l'alinéa 26 qui fait double emploi.
 - 277, ligne 12, au lieu de Limerea, lisez : Limaria.
 - 278, ligne 20, au lieu de boloniensis, lisez : Boloniensis.
 - 278, ligne 27, au lieu de E. parvula, lisez : T. parvula.
 - 279, ligne 6, au lieu de Stylida, lisez : Stylina.
 - 303, ligne 47, au lieu de D. calicularis, lisez : D. caliculare.
 - 309, ligne 20, au lieu de Peripoedium, lisez : Peripedium.
 - 315, ligne 37, au lieu de Hennokii, lisez : Hennahii.
-